

CYLVII

METHOD







Pharmacopœi Parisienses

exDonoMagistri
Gillet
AntiquiPræfecti

1764

11288 1/288
METHODVS

MEDICAMENTA COM-

PONENDI, EX SIMPLICI-

bys iudicio summo delectis, & arte certa

paratis, quatuor libris


distributa,

*

AVTORE D. IACOBO SYL-

VIO MEDICO.

Indice adiecto copiosissimo.



LVGDVNI,

Apud Ioan. Tornæsum, & Guliel-
mum Gazeium.

1548.

275

Collection de 9 ans (1779)
F





PETRO CASTEL-
LANO, TVTELENSIVM EPI
SCOPO, IACOBVS SYL-
VIVS MEDICVS
S. P. D.

*



IVINAM ac memorabilem illam in nos
benignitatem cum studiosissimus quisque
hominem iuvando proximè imitari con-
tendat, nulla tamen ratione alia plenius ex-
primit, quàm morbis tutò profligatis sani-
tatem pristinam restituendo, idq; per usum causarum, quas
ob id salubres appellamus. Inter quas licet magni sint mo-
menti, aër, motus, cibus, potus, primas tamen medicamenta
tenere optimo iure videntur, ut quæ maxima vi sua morbos
etiã gravissimos plerunque tam celeriter propulsent, ut
horum opus miraculi loco habeatur. Quapropter ea Deo-
rum manus rectè uocavit Herophilus: & Apollo, Aescula-
pius, Hippocrates, aliq; non pauci celebres medici pro Dijs
sunt habiti. Et cum cunctis propè mortalibus insita sit per
medicamenta curandi cupiditas, ac tu præcipuo eorum co-
gnitionis studio incendaris, hæc me ratio una commouit, ut
amplitudinem tuam aliquo meorum laborum fructu recrea-
rem: nec ea tamen sola, sed honestam cogitationem hanc no-
stram uehementer auxit tum singularis tua, & cum omnium

a 2 rerum



rerum bonarum cognitione coniuncta eloquentia, tum incredibilis in omnes literarum studiosos benignitas: quibus raris & maximis uirtutibus nil mirum, si tam repente clarissimus euaseris, dum docti omnes certatim ore uno summa de te omnia, uti res habebat, prædicarent: teq; non modo studiorum præstantissimorum, sed etiam peregrinationum & longinquarum & multarum laboribus maximis tam feliciter perfunctum, honoribus amplissimis iam perfungi dignissimum, honorificentissimè apud omnes inclamarent. Rex uerò noster Franciscus, musarum omnium pater ac illustrator magnificentissimus, hac adductus fama, ultrò te in suorum primorum clientelam accersiuit, summamq; tuam in dicendo fecunditatem, perspicuitatem, felicitatem admiratus, summis uitæ ornamentis honestandum te & beandum nulla mora censuit: sicq; tua dicta amplexatur, sic fouet, sic præsentibus omnibus exosculatur, sic ex te recipit omnia, tanquàm ex tripode pronunciata: ut si quando uel te alijs, uel alios tibi (ut ferè in sermone fit) contradicendi cupiditas ceperit, quæ tibi libertas & modestia in resellendis, quæ facilitas in transmittendis aliorum sententijs parum probabilibus, quæ denique dignitas in ueritate asserenda? quem Lysiam, quem Platonem, quem Periclem, quem Demosthenem, te ceteris uelut ægide quadam cruditionis tuæ stupefactis audiendum exhibes? Quibus omnibus in quauis encyclopædia parte sic apud Regem flores, ut cum Rege summa sis in gratia. Quod si principibus uiris placuisse laus sit præcipua, ut ille dicebat, quis pro dignitate felicitatem omni humana laude maiorem satis commodè laudauerit? qui non principibus uiris tantum places, uerum etiam Regi Francisco perplaces, omnium qui iam sunt Regum gloriam, atque etiam ipsius antiquit

antiquitatis memoriam uirtute sua facile superanti, siue rei militaris scientiam, siue literarum omnium bonarum amorem, & honorem & cognitionem, siue autoritatem, siue felicitatem in eo summam spectare libet. Quæ rara & maxima Regis Francisci ornamenta quoniam plenius attingi tum poematio de memorabili ipsius & Henrici Anglorum Regis ad Ardeam conuentu, tum libello alio à me superioribus proximis mensibus conscripto de salubri ipsius uiuendi ratione: plura nunc dicere supersedebo, cum hoc tantum dixero, à Francisco Rege nostro uita longissima dignissimo Ptolemæum Philadelphum Aegypti regem, Attalumq; Pergæmi, & si quos alios publicæ hominum utilitati natos Reges idem studium tenuit, in bibliothecis omni genere librorum celebrium instruendis longè exuperari. Nam illi pecunia mediocri singulas singuli bibliothecas collocupletarunt: at noster Franciscus innumerabiles bibliothecas sumptu maximo ea ratione exornauit, & exornandas collocauit, ut nullo unquam æuo desitura uideantur. Nonne gloriosius est longè, ac multo magnificentius, libros omni genere disciplinarum bonarum refertissimos ex penitissima Græcia, & regionibus alijs pecunia grandissima cœmptos, in Galliamq; conuectos non in bibliothecas tantum regias coniecisse, sed manu fideli descriptos, typographia planè admirabili excusos, in omnium bibliothecas contulisse: qua magnificentia quid diuinius, quid Rege maximo potentissimoq; dignius dici aut fieri potest? Ad hæc tamen omnia, adiecit amplissima uirorum Latine, Græcè, Hebraicè doctissimorum salaria: perq; omnes literarum bonarum ordines statum Parrhisijs florentissimum sic tenent, ut nec melius, si Apollo ipse cum Musis adesset, tenerent. O te terq; qua-

terq; fortunatam Galliam, quæ Regem sortita es sapientem,
 & omni sapientiæ studio fauentem, quantum aliorum mor-
 talium fauit unquam nemo. Cùm uerò ad præclara hæc fa-
 cinora propensum maximè magnum & sanctum regem, &
 ad optima quæque natum regis animum consilio, opera, stu-
 dio incitare non desinas, Castellane undecunque absolutissi-
 me, docti omnes habent, cui plus quàm tibi debeant,
 neminem, tuisq; successibus prosperis gratulan-
 tur, amplioresq; exoptant, & obsecrant.

Vale, & in bonam partem accipe
 hoc nostrum magnarum
 in medicina rerum
 rudimen-
 tum.



DE MEDICA-

MENTORVM SIMPLI-
CIVM NATVRA, EX

DIOSCORIDE ET GALE-

NO, ET ALIIS,

LIBER I.

*



IMPLEX composto prius natura & doctrina esse, tum rerum omniū conditio, tum Galeni scripta ubiq; demonstrant. propterea nobis composita medicorum pharmaca in melius ad veterum methodos reformaturis, de Simplicium notis & viribus, quæ Dioscoridi præcipuè & Galeno scripta sunt, paucis agendum est: idque totum in quosdam communes locos reducendum, quod etiam Dioscoridi placuisse magis video, licet ubique id tam sollicitè non obseruarit. In singulis verò ipsis communibus locis ordinè alphabeti (quod & Galenus fecit) sequemur. Quoniam verò multæ plantarum quarūdam partes medicamentosæ sunt, ob idq; in locos plures incidere debent, eas tamen omnes vno in loco perstrinximus, quem index palem commonstrabit, ne res eadem aliquoties nobis repetere-tur. Porro locos ipsos sumemus à plantis, animalibus, metallicis & terreis corporibus, à quibus non medicamentorum modò, sed etiam alimentorum materiæ accipi consueuerunt. Sed ne locorum multitudo lectori memoriam turbet magis, quàm promoueat, & inuentionem quæsitæ rei etiam remoretur, quæ ad metalla & terrea corpora pertinent, loco vnico concludemus omnia: quæ item ad animalia tota, & ipsorum quorundam partes, tam similes quàm organicas, in vnum coniiciemus locum. Ipsas verò plantarum partes, quia numerosæ sunt, & in cuiusque genere ampla est ceu familia, in plures locos digeremus, ordinem quandam naturæ sequuturi: primùm radices, & folia molientis: deinde flores, fructus, semina, & alia permulta, quæ omnia sequens diuiso planiora

fecerit. Neque hîc expectes omnium simplicium naturam omnem audire. Id enim Dioscoridem, Galenum & aliorum de re simplici commentaria describere fuerit. Mihi verò propositum est, ea tantum simplicia leuiter attingere, quibus ad componenda libro quarto medicamenta est opus: eorumque simplicium eas præcipuè facultates explicare, quibus potissimum ad vires illorum compositorum pernoscendis egetur. Nec mireris Arabum quædam simplicia hîc à me adscripta: hæc enim inuentas ab his compositiones aliquot non negligendas magna parte complent: ob id ex illorum libris utcunque mihi perstringenda fuerunt. In hoc autem labore si meum studium doctis viris probari agnouero, ad alia his maiora, de simplicium medicamentorum materia inuitabor.

Quod si in hoc libro quædā desideret pharmacopœus, dicat non sibi scripta hæc, sed medicinæ studiosis potius: expectetq; librum sibi peculiarem de singulorum medicamentorum simplicium exacto delectu, illi maxime ad probas medicamentorum compositiones necessario: post hunc alium de his quæ ad conficiendam rectè quauis compositionem sunt vel utilia, vel etiam necessaria: ac tertium præter hos composita propè omnia complectentem, & in singulis componendi modum planissime explicantem.



Medicamen-
ta fumun-
tur à

Plantis, &
harū par-
tibus fini-
laribus et
dissimila-
ribus

Animali-
bus totis

Partibus
anima-
lium

Radice.
Floribus.
Stipite.
Ramis.
Surculis.
Foliis.
Fructibus.

Vulpe.
Hirundine.
Motacilla.
Galerita.
Limacibus.
Cicadis.
Cantharidibus.

Organicis

Capite mænidum
Hepate lupi.
Testibus fibri.
Renibus scincorum.
Corpore toto viperæ
excepta cauda, & ca-
pite, pelle, intera-
neis.

Similaribus

Pinguedine.
Adipe.
Cerebro leporis.
Medulla.
Osse.
Dente.
Coagulo.
Lacte & eius partibus.
Sanguine.
Tunica interna ventri-
culi.
Vnguibus caprarum, asi-
norum.
Cornu cerui, vnicornis.
Glutino tauri.
Senecta serpentis.

Seminibus.
Corticibus.
Succis.
Liquoribus
Refinis.
Gummis.

Cancris.
Ostreis.
Buccinis.
Purpuris.
Lumbricis.
Tinca.

Medicamēta
item fumun-
tur ab

Animaliū
excremē-
tis,

Cen ex-
cremētis,

Terreis
corpori-
bus,

Stercore canum, luporum, pue-
rorum, bubulo, caprino, co-
lumbino.

Felle.

Vrina.

Sorde.

Pilis.

Ovis.

Melle.

Cera.

Lacte.

Sudore.

Saliua

Lana fuccida.

Marinis, vt

Terra mul-
tiplici.

Lapidibus, vt

Metallicis, vt

Salibus, & eius partibus.

Adarce.

Spongia.

Nitro.

Asphalto.

Alcyoniæ.

Pumice.

Iaspide.

Iudaico.

Smaragdo.

Salibus, nitris fossitiis, auri-
pigmento, sandaracha, sul-
fure, cadmia, lithargyro,
chalciti, auro, argēto, &c.
& horum partibus.

Pyrite.

Sapphyro.

Gagate.

Hæmatite.



RADICIBVS plantæ omnes alimentum sibi familiare, dulces dulce, amarum amaræ, & reliquæ ad portionem, ex terra ipsa trahunt. Vnaquæq; suo tempore potissimum in solo & sub cœlo cuiusque naturæ magis propitio. Neque

enim omnis fert omnia tellus: neque cœlum quoduis est plantis omnibus amicum, sed trahit sua quamque tanquàm voluptas quædam, qua incitantur plantæ stata anni parte ad alimentum copiosius è terra trahendum: quo habitiores redditæ edunt surculos, folia, flores, fructum, aut semen. Hæc posteriora veluti scopum quendam naturæ, plantis cum animalibus communem: ambo enim sibi simile modis omnibus moriuntur excitare, vt si immortalia omnino non sint, saltē quantenus sint immortalibus proxima, specie per tot supposititia singularia perennante. Hinc animalibus foetuum cura est præcipua, & quod mireris, plantis ipsis semina & fructus (in quibus spes sua est successionis) sic vestientibus, ornantibus, muniuntibus, armantibus. Quam rem cum sequentibus & aliorum de simplici materia libris, tum vel maximè admirabili & adorando naturæ in plantarum partibus artificio apertè deprehendas. Sed de radicibus primùm sermo nobis est, quas tum præcipuè euellat medicus, cum medicamentosæ sunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non inest tempore, sed aliæ alio vegetæ magis sunt, quod suis locis audies: quâquàm sunt qui putent oēs radices legendas autumnò, vbi folia deciderunt: alij veris initio, priusquàm in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integræ sunt, si fieri potest, vellendæ, & vnaquæq; in solo & cœlo naturæ ipsius maximè familiari, bene nutritæ, bene habitæ, non præ alimenti copia enormes, neque ob inopiam strigosæ, tenues, rugosæ: mox aqua lauandæ, & radiculis portionem quandam alimentati reperentibus, & stolonibus etiam dum trahentibus purgandæ: post (nisi vtendi recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel necessitas) siccandæ: quædam vmbra & vento, vt apij, fœniculi, iridis, & quæ aliæ sunt vel minores, vel sicciores, vel rariores, quarum vires sol ceu ignis promptè dissipet: quædam cōtrariæ dictis sole & vento, vel igni siccantur, si cœlum est nubilum, aut hyems: & sæpe versandæ, ne mucidæ aut putridæ fiant, vt bryoniæ, gentianæ, mandragoræ, rhei

rhei pōici. Si verò siccatis citò est opus, patellæ ignitæ impositas sæpe versandas siccabis. Quædā item integræ siccantur, vt gentianæ: aliæ in taleolas dissectæ, vt iris: aliæ lignosa matrice (sic enim cor plantarum Gaza ex Theophrasto vocat) adempta, vt fœniculi, petroselini, apij. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento: sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, præsertim quando hūc plantæ quædam adhuc humidiores requirunt, modò non fient austri. Eadem quamdiu vegetæ adhuc sunt seruandæ, parvæ scilicet ac tenues & raræ, vt asari, asparagi anno tantum: quamvis elleborus vterque etiam triennio seruari possit, vt magnæ & crassæ essentia præditæ, bryonia, rheon ponticum, aristolochia, gentiana. Hæc autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio comoda, & duratio, non in radicibus solis obseruanda sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atq; adeò quibusdam animalium aliquorum partibus, vt sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propter hæc chamæpityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, polium, hypericum, aliæque, florentia capiebat Galenus, theriacen, vel aliud medicamentum compositurus, non sole æstiuo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando æduntur, quando augentur, quando deniq; vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis vrantur, neque humiditate à tecto, vel muris madesiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi, nec aliis vicina, neq; sub tegulis, sed horum media, quæ ostia meridiem spectantia habeat: prope quæ tamen medicamenta ne reponas.

Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium, et accusandi tum mercatores, tum herbarij, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tēpus carpunt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum obseruatio valere putatur. Pæoniæ enim radix ad epilepsiam legenda decresciente luna quibusdam videtur, & alysson sub æstu caniculæ vult legi Galenus: vt Aeschriion caneros fluuiatiles capi contra rabiem, vnde est herbæ nomen: tanquàm vis quædam illis contra rabiem à fidere accedat, rabiem canibus asferente.

Lib. 1. antidotorum.

Lib. 3. compo. ph. general.

Lib. 2. antid.

Galenus in horum simplic. viribus.

ferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harū editis & siccis locis, vt Cretæ montibus, præfert Galenus, vt abundè in methodo medicamenta cōponendi audies. Neq; velim lectorem latere, multas efferri plantas per us vel os masculinè, interdum etiam fœmininè, vel per um vel on genere neutro: vt acorus, elleborus, hyssopus, fœniculus, crocus, lupinus, peucedanus, æsypus: vel acorū, elleborum, vt ὁ βούτυρος, καὶ τὸ βούτυρον: ὃ ἢ ἡ χάλικανθο, ἢ τὸ χάλικανθον: ἢ ἡ μωλαστῆ, ἢ ἡ ἀντίδοτ, ἢ τὸ ἡμωλαστρον, τὸ ἀντίδοτον ἱππ, & præterea, id est, equus in compositione cum nominibus plantarum significat magnum, vt βούς, id est, bos: quod docent hipposelinum, hippomarathrum, hippolapathon: vnde opinor nostratibus iuglandes caballinæ vulgò vocantur omnium maximæ.

Lib. 10. simpl.
& 4. c. ph. &
1. ph. g.



CORVS gustu acri, & modicè amaro, odore iucundo, tenui consistentia, calidus siccus ordine tertio, Galeno lib. 6. simplicium. Is nunc esse videtur quibusdam Calamus aromaticus, aliis potiùs Galanga. Quibus repugnat Aētūarius in antidoto aurea Alexandri, in qua γάλανγαν (sic enim cū Arabibus vocat) & multis interiectis acorum, eodem pondere, ad finem verò calamum aromaticum pondere diuerso misceri scribit. Acorus omnino verus magnitudine ireos, galanga maior hodie vulgò dictus, mihi Tornaco missus à Nicolao Godino eius vrbs præstantissimo medico. Ignotus tamen quibus adhuc est, eius loco galangam magno successu miscuerint, interdum calamum odoratum. Qui verò nobis frequens ostenditur, palustris acorus est, insipidus, inodorus, substantia crassa, frigidus, siccus, à xyri planta acri nobis notissima diuersissimus: quadripartito tamen sectus & solè ficcatus, trienio seruatur: non vtendus hîc, nisi Medicus imperauerit.

Veri autem prouentus nunc vberimus Lugdunum & in alias Gallix vrbes celebriores conuehitur ex India, Lusitanorum (vt audio) navigationibus.

A Garicus tãquàm fungus est enatus truncis arborū præcipuè glandiferarum, vt ilicum: toto contextu est rariore & fungoso, sed facie summa & mucrone est solutior: sede verò & radice semilignosa & semiputri, ob id abiicienda. In eo fœmina rectis intus venarū discursibus fracta constat, qui dentium

Diosc. & Gal.
lib. 1. antid. &
lib. 6. simpl.

dentium murinorum vestigia in caſeo duro repræſentent. Eadem leuior, rarior, mollior, albior, breuior, friabilior, ſplendidior, proinde præſtantiſſior. Mas verò in fracturis ſoſus nervorum modo, grauiſ, denſus, durus, niger, lignoſus, lógus, interdum rotundus, ſed vbiq; compactior: neuter adulteratione recipit. Vtriq; ſapor eſt initio dulcis, mox amarus, tandem etiam ſubacer, & ſubſtringens: vnde incidit, tenuat, terget, digerit, obſtruſta liberat. Vis autem phlegmagoga, hoc eſt, pituitæ purgatrix, ſtomacho aduerſa: vitiis tamen omnibus internis ab ea natis ſaluber eſt in omni ætate, ob quæ medicamentum familiæ veteribus eſt dictus. Datur drachmæ pondere ſeu à ſcrupulis duobus ad drach. vnam pro ægri natura, ætate, viribus, cõſuetudine, & morbi natura & tempore cum vino, vino diluto, vino mulſo, ſapa, aceto, aqua, hydromelite, oxymelite. Quinetiam ſtomacho ſolutis, vt cibi tenax nõ ſit, & acida ruſtãtibus mādatur, & ſine humore deuoratur Dioſcoridi. Nobis omnibus naſeabundus eſt, fortasſe quia deterior nunc ex Alpibus Gallicis & noſtro Delphinatu affertur, quàm quem maioribus mittebat Agaria Sarmatiæ regio (à qua illi nomen) & Galacia & Cilicia. Ponticus Andromacho iuniori in Theriaca probatur. Mendum igitur videri iure queat in ſine lib. noni compoſ. pharm. part. vbi ſuffocatis ab vtero datur ʒo. x. hoc eſt, vncia vna cum vino pro drachma vna. Corrigitur vino, zingibere, caryophyllis, nuce moſchata, vel aliis ſtomachicis. Seruatur annis quinq; integer præcipue cum dauco, libyſtico, polypodio. Non ſolùm autem ſumitur, ſed etiã foris admouetur, vt Galenus docet lib. 6. ſimp. & in ſine lib. 10. comp. ph. part. in iſchiadicis remediis. De agarico autem inter radices agimus, quòd is dicitur radix Dioſcoridi, & Galeno lib. 6. ſimpl.

Lib. 2. alimēt. Althæa ſive Ebifcus eſt malua agreſtis, foliis vt cyclaminus rotundis, lanugine caneſcentibus, flore roſaceo, caule bicubitali, radice lenta, intus alba, ſubſtringente. Partibus ſuis omnibus digerit, laxat, phlegmone leuat, mitigat, coquit abſceſſus coctu difficiles adipibus incoſta & ſubacta. Radice autem & ſemine tenuiorum eſt partium, magisque tum ſiccatur, tum terget. Althæa autem dicitur, quòd inter primas ſit vtilis, & pluribus polleat remediis, Dioſc.

Pl. c. 11. li. 10. Apium ſatiuũ eſt, cui gratia vulgo eſt, cuiuſq; rami largis portio

Gal. li. 6. ſimp.

Dioſc.

Li. 1. anti. Gal.

*Lib. 2. alimēt.
& li. 6. ſimpl.
ἀλθαῖνα &
ἀλθῖα κύρο,
medeor.*

portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Quæ Plinij verba nostrum vulgare petroselinum magis indicant: atque idem *σέλινον ἑσθμον*, id est, odoratum, Theocritus 3. *ἑσθμῶν* vocat. Sed apium vulgare est Dioscoridis & Galeni Eleoselinum, hoc est cum Gaza, Paludapium, quia in paludibus & secundum aquæ ductus nascitur. Petroselinum autem verum ex Macedonia asperis & præruptis petendum. vt Galenus docet lib. 1. de antidotis. de quo in litera P. Quod verò Macedonicum petroselinum vulgo dicitur, est hipposelinum, quod olus atrum seu pullum à Latinis appellari Hermiolaus, Ruellius, Marcellus in Dioscoride inscripserunt, quod meus codex Græcus non habet. Galenus autem verum Smyrniū (id est, vulgare Leuisticum) *δανύσατρον* Romæ vocari iam consuetū scribit lib. 2. aliment. Omnia hæc selinorum, id est, apiorum genera idem pollent tota, sed semine sunt potentiora, & in his præcipue Macedonicum calidum siccum ordine tertio.

Ari radix vt dracunculi, ex fimo bubulo podagris illinitur, eiusdem cortex splenicos iuuat & hydropicos, Galeno lib. 9. comp. ph. part. calida sicca primo ordine: incidit, tenuat, terget mediocriter.

Aristolochia, quia sit *ἀριστολόχουσα*, id est, parturientibus optima & salubris, Dioscoridi & Galeno triplex, radicis figura præcipue distincta. Quæ primo generi est tuberum modo rotunda, ob id & malum terræ dicitur: secundo digiti crassitudine, dodrante longa: unde (opinor) dactylitis dicitur lib. 2. comp. ph. gene. & lib. 7. comp. ph. part. in arteriace Andromachi 16. Tertio longissima, quasi vitium nouellarū, ob quam clematitis. i. farmentosa dicitur. Huius fructus putatur quibusdam *κόκκος* orientis, vulgo Gallorum dictus, stupefacientis piscibus efficax, quā vim Plinius rotundæ tribuit. Quartū genus addit Plinius Pistolochiā seu Polyrhizon omnium tenuissimam, densis radicis capillamentis iunci plenioris crassitudine. Omnes valent tantum radice amara & subacri, sed rotunda omnium est substantia tenuissima: longa verò terget moderatius: clematitis, quia odore est gratiore, & cortice carnoso ad vnguenta (nardina Plin.) est quam ad medicationes aptior. Præfertur Pontica, & huic Cretensis lib. 10. compo. ph. part. Effodienda est mensibus, & desquamato terreno seruanda.

Asarum

Gal. lib. 6.
simpl. & li. 5.
anod.

Pl. lib. 25. c. 8.

Afarum Galli olim Bacchar vocabant, nunc syllabarum metatthesi Cabaret. Valet foliis, flore, semine, sed efficacissimum est radice, ellebori albi modo purgatoria, Diosc. Galenus tamen in hiera picra etiam asarū recipiente solam aloē purgatoriam vim habere scribit: asarum verò humores malos ad vrinas deducere, lib. 8. comp. ph. part. & lib. 6. simpl. vires habere radicis acori sed valētiores. Fodienda est cūm folia mittere incipit, & in sole siccanda (nisi recens vtenda sit) quia in vmbra situm celeriter trahit & senescit, præcipuè ex locis riguis, ex macris autem & sitientibus (quæ imprimis amat) minùs est putredini obnoxia.

Asphodelus Latinis Hastula regia dictus, à caule insigni ex multis radicibus bulbosis emicante, quibus agnatis abundat, interdum ad 80. Radice utilis est tergente: eadem vsta magis calfacit, siccatur, tenuatur, digeritur. Nunc porcorum cibus est, olim etiam hominum, muribus venenum. Autumno legitur, cūm valet plurimū.

Lib. 2. alimēt.

& lib. 6. simp.

Asparagus, vel Atheniensium more per ph, Aspharagus, vel etiam aphæresi, Sparagus, generatim quidem est coliculus tenerior herbæ, fruticis, arboris, ad fructum & semen incremens: speciatim verò herba vulgo nota, eaque duplex, radice utilis & semine ad detergendas renum & hepatis obstructions. Regij, qui in hortis nascitur, & Helij, id est, palustris, meminit Gal. lib. 2. alimentorum: & huius etiam initio lib. 9. comp. ph. part. ad icterum: & illius lib. 5. simp. Petræi autem lib. 6. simpl. qui post inuentos altiles asparagos Corrua propriè dicitur: Polluci aut sylvestris asparagus. Hic multò est satiuo efficacior. In asparago mas à fœmina semine separatur.

Gal. li. 6. simp.

BRyonix, seu vitis albæ radix terget, siccatur, & moderate calfacit: ob hoc induratos lienes liquat sumpta: & cum ficis admota, & psoam & lepram sanat: fructus verò eius maturitate ruber, racemosus, est Psilothrum vt planta ipsa. Nam ἀμπελον λευκὴν βρυονίαν καὶ ψιλοθρόν καλοῦσι. Gal. li. 6. simp. tamē ἀμπελον λευκὴν & βρυονίαν separat lib. 1. comp. ph. part. in pilos corruptentibus medicamentis.

Behen Serapioni duplex, alba & rubra, magnitudine radicis pastinacæ parux, calida, humida, odora, semen augens: ex Armenia defertur. Earum loco, si id solum possunt, Eryngij radicem

radicem substituerem potiùs, quàm radices nescio quas nobis ab institutoribus venditari solitas: sed Ben eidem vt Mesue est Galeni Balanus myrepfica, de qua in Fructibus audies.

Calamus aromaticus καλαμὸς ἀρωματικὸς Diosc. Gal. *μυ- Gal. li. 7. simp.*
γνῶσις, id est, vnguentarius Hippocrati, Arabicus Plutarcho, Alexandrinus Celso: calidus siccus ordine secundo, leuiter astringit, minimum acer est, partium nonnihil tenuium remediis ventriculi & hepatis calidis misceri potest, ac menses mouentibus. Melior est fuluus, intus albicans, odore fragrantissimo, dense geniculatus arūdinis modo, cætera mollis tactu, lentus in frangēdo: cōfractus autē in assulas dissilit, non totus, raphani in morem rumpitur: fistula intus plena araneorū, casia gustu, astringēs, & cum quadam acrimonia amarus, in mandēdo glutinosus: In India nascitur, triennio seruat. *Dioscor.*

Capparis radice cortex amarus, acer, acerbus, terget, purgat, tenuat, incidit, digerit, constringit: lienes induratos & ischiadas ob hæc magnificē iuuat, sumptus vel cum idoneis remediis admotus. Eadem radix etiam hepatica est, lib. 8. cōp. *Gal. li. 7. simp.*
& li. 9. comp.
ph. part. in sple- nicis.
 ph. part. & splenica, lib. 9. eiusdem. Flos eius & fructus aceto & sale conditus primis mensis ad excitandam appetentiam fumitur licet stomacho noxius, siticulofus, aluū turbare Dioscoridi dicatur. Folia capparis trita cum mero pota splenica, lib. 9. comp. ph. part. admotā cum virium vehementiam obtundentibus chœradas sanant.

Centaurii magni radix acris, astringens, subdulcis, & subamara: vlcera glutinat, sanguinem reiicientibus prodest: à Chirone Centauro Herculis sagitta vulnerato inuentū & nominatum Centaurium: annis decem seruat Theophrasto. Centaurium autem minus radice inefficax est, foliis & flore vtilis, subastringēs: ob amaritudinē Fel terræ dicitur Plinio.

Cyperis seu radix cyperi calfacit, siccāt sine morfu, subastringit, incidit, vlcera præhumida cicatrice claudit, calculos frangit, vrinam & menses mouet, oris halitum commendat, vt lignum aloës verum. Cyperus Indicus inter zingiberis radices inuētus Curcuma Venetiis dicitur. Ad odoris gratiam cyperus additur tenuantibus capillos, lib. 1. comp. ph. part. à figura caulis iuncus triangularis Plinīo: quadratus Celso, licet rarò sit quadrangulus: angulosus Dioscoridi non definito angulorum

gulorum numero. Cyperus Babylonicus Galanga (de qua mox) quibusdam dicitur, vulgaris scilicet ac minor: nam maior Acorus esse dicta prius est.

*Panisporcinus,
quia porci gra-
tus.*

Cyclamini radix tota vehementer medicamentosa, magis eiusdem succus: incidit, terget, ora venarum aperit, trahit, digerit, illitus abdomini ventrem purgat, per nares trahit, cum melle illitus suffusos iuuat, scirrhus mirè emendat, menses & sudores mouet.

Dioscor.

Costus subamarus, modicè astringit, acer adeò & calidus, vt vlceret, Gal. lib. 7. simpl. & lib. 8. còp. ph. part. mihi Lugduno missus à Carolo Paludano eius vrbs medico iure primario, si Hieronymū Montuum nulli eruditione secundū exceperis. Costus præcellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris gratia, recens, abundè plenus, densus, siccus, à teredinibus non erosus. Secundus est Indicus, vber, leuis, niger. Tertius Syriacus, grauis, colore buxeus, odore feriēs. Costus Arabū dulcis, & amarus, Græcis indictus: sed *νέσθη γλυκύς* Arabas passim imitanti Actuarius dicitur in secundo Dialachan, & paulò post in diaromato. Costus autem hortensis, herba quanquàm amara est, fuerit magis Piperitis aut Siliquastrum Plinii.

Cucumeris agrestis radix terget, digerit, emollit: potentius eius succus, Elaterium dictus, summè amarus, ordine secundo calidus: menses mouet, cynanchis cum melle illinitur, ictericis cum lacte in nares trahitur & cephalalgicis.

DAucus femine vehementer calet, præcipuè agrestis, triplex Dioscoridi. Seminis folius in aliis generibus vsus inualuit, in cretico etiam radicis. Ob id Dauici Cretici radices scribit Gal. lib. 9. còp. ph. part. in malagmate dia spermation.

Dioscor.

Dictamni radix gustu calfacit, partus accelerat. Folia eius pulegio similia, maiora, de sa lanugine obsita, in vsu sunt præcipuo ad ictus & morsus venenatos, ac cætera, quæ præstat pulegium: quo tamen ob essentia partium tenuitate est efficacius. Horum foliorum vim largam Venetiis ad me attulerunt Simon Thomas, Stephanus Tullerius, Martinus Gregorius, discipuli olim mei longè doctissimi, nunc medici æqualium celeberrimi. Quæ autem vulgo circumfertur dictamni radix, est potius pseudodictamni. Creticus laudatur potus & appositus. Metitur æstate & autumnno.

Doron

Doronicum Serapioni est radix parua, foris subflaua, intus alba, dulcis, calamo aromatico similis: calida sicca ordine tertio: flatus præcipuè vteri dissipat, cordis palpitationi cõfert, ipsumq; roborat, venenosis morfibus & ictis auxiliatur, sumptum & admotum. In officinis habetur: *καργαβόδιον* dicitur Actuarius, vires illi easdem tribuenti: tamen is in *διάμυξα* doronicum omittit, quod habet Mesues in diambra compositione prope eadem.

Dracunculi radix aro acrior, amarior, ob id calidior, tenuior, viscera omnia purgat humoribus crassis & lentis à se tenuatis, vlcera cacoëthe sanat, vitiligines terget cū aceto illita.

ELenii radix odorata, subacris, amara, calfacit non primo statim occurfu, siccatq; non exactè ob humorem in se recrementitiũ, tandem verò etiam rubrificat, ischiadas & affectus alios diurnos ac frigidos: eclegmate cum melle, crassa & lenta ex pulmone & thorace expectorat, serpentium morfibus prodest. Ex montibus & sicco solo præstantior, legitur æstate, particulatimq; dissecta siccatur, vel melle aut saccharo cõdita seruat: *ἐλένιον λευκόν η̃ ἰσχυρόν* Actuarius appellat.

Enula Campana.

Ellebori vtriusque tum albi tum nigri radix multiplex, tenuis, ab oblongo & exiguo capite procedens, calida sicca, ordine tertio: sed nigra gustu calidior, alba amarior: pituitam ac bilem vtranque vacuat, alba magis vomitu, nigra deiectione: alphas, lichenas, pforas, lepras deterget. Alba melior Cyrenaica, nigra ex Anticyra: ambæ in montibus & asperis locis messibus effodiendæ, in vmbra siccandæ.

Eryngii radix longissima, intus alba, foris nigra, odorata: calida, ad primũ ordinẽ, sicca ad secundũ: tenuium partiũ, ciet menses & vrinas, morfibus venenatis resistit, flatus dissipat.

Esula Serapionis est Pityusa Dioscoridis & Galeni, radice, semine, foliis, succo, tithymallorũ more purgans: ob id etiam tithymalli species à quibusdam putatur. Mesuæ & Auicennæ esula parua, est tithymallus paralius, id est maritimus: magna verò est tithymallus platyphyllos, viribus tamen sunt iisdem valentibus, scilicet in purgando.

FOeniculus calidus ordine tertio, siccus primo, semine magis quàm radice, minus foliis quibus lac gignit, vt illis

b 2 vrinas

Marathrum cum vrinas & menses magis ciet. Cortex radice in vfu est frequenti, lib. 8. comp. ph. part. *μαλαθροσπέρμεν* per λ vbiq; scribit Actuarius, id est, marathri semen.

Græcis.

Gal. lib. 8. simp.

Filicis radix maximè utilis, amara, subastringens, lumbricos latos necat, partum mortuū eiicit, vlcera valenter sed sine morfu fccat impofita, hepatis meatus probe terget sine manifesta calfactione aut refrigeratione. Gal. lib. 8. cōp. ph. part.

Serapio.

GAlanga Actuario Barbaros in multis imitato, est radix subrubra, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo linguam admodum vellicante, calida, sicca tertio gradu, odore & figura quadam cyperi: vnde quibusdam Cyperus Babylonicus dicitur, vt prius in Acoro & Cypero docuimus. Adulteratur cyperi radice aceto piperato macerata, sed adulteratio intrò non penetrat. Coctione iuuat, flatus dissipat, oris halitum commendat, venerem excitat etiam ore retenta, cerebrum roborat naribus indita, cordis palpitationi prodest.

Gentiana radice est ob multam amaritudinem efficaci, ad tergendum, tenuandum, purgandum, obstrueta liberandum: propter quam aloë Gallica dicitur: à Gentio Illyricorum regē inuenta & dicta.

Dioscor.

Lib. 6. simpl.

Glycyrrhiza, Actuario sæpe Glycyrrhizon, *γλυκύρα ῥίζα*, & absolute *γλυκύρα*, lib. 7. comp. ph. part. dicitur Romanis dulcis radix, nobis partium metathesi Riglyce: radice sola & succo ex hac recenti expresso, dulci, & leuiter astringente valet, tepida, temperato proxima, modicè humida, vnde quia sitim sedat, *ῥιζή* quoque dicitur. Asperitates lenit arteriæ & vesicæ scabræ. Melior nigricans & lenta, quàm buxæ & fragilis. Pulvis radicum eius pterygia seu vngues oculorum leuat. Dioscorides.

Gramen, seu gramen pecori esculentum radice est modicè frigida & sicca, parum mordaci, substantiæ tenuitatem exiguan fortita, qua calculos potu interdum frangit.

HErmodactyli duo fastigia facit Mesues, vnum radice digitali longitudine, quod Ephemerum esse videtur Dioscoridis, Galeni, & Pauli: radice oblonga, digitali crassitudine, odoratum, iris agrestis appellatum, repellendi & digerendi facultate præditum. Alterum radice rotunda, & ea foris

foris vel nigra (quod Colchicum est ephemerum & deleterium, prædictis autoribus passim frequens, flore croci per autumnum erumpente) vel rubente, vel alba, vt intus, quam eligit solam, si crassa sit, ac modicè dura, & ex loco edito lecta: calida sicca initio secundi gradus, stomacho aduersissima est. Pituitam crassam à iuncturis præsertim extrahit, ob id podagræ, & ipsi arthritidi prodest, per se, vel decocto sumpta, aut etiam admota cum farina hordei, vitellis ouorum, mica panis. Hæc omnino est, quam Paulus Hermodactylum vocat, & ab utroque ephemero separat, veteribus indicta radix, vti & quæ rubens Mesuæ dicitur. An verò quæ in officinis ostenditur, horum sit Hermodactylus, vel Colchicum, discernere non est difficile his qui legunt, aut integras habent radices, nam delibratæ ad nos conuehuntur. Canis tamen largam eius vim per me depastus innoxie, & multorum tutò hac radice purgatorum experientia quotidiana facit, vt credam vel Hermodactylum hunc esse Mesuæ, & neotericorum, veteribus indictum, vel saltem non esse Colchicum. Actuarius miror inter purgantia simplicia hunc non descripsisse, cum toties eius meminerit in compositis medicamentis, *ἔργασι δ' αἰσινλον λυλιδόν καὶ ἀκνον* alicubi appellans. Serapio hermodactyli nomine principio Dioscoridis Colchicum repræsentat, deinde etiam ephemeron. De omni hoc genere Musa in examine simplicium, & Tagaultius suis in Mesuæ simplicia annotationibus doctis pariter ac luculentis accuratius scribunt.

IRidis radix laudatior parua, densa, frangi contumax, subruffa, amara, sternutamenta dum tunditur ciens, odorata, qualis ex Illyride mediterranea Dioscoridi, Galeno, cæteris omnibus prædicatur: ob id eam Illyridem vocare consuevit Andromachus. Elige autem in Illyricæ genere odoratiorem: nam vnumquodque est præstantissimū, quod generis sui odorem habet valentissimum. Iris autem quæ ex Libya magna Romam affertur, tantum ab Illyrica deficit, quantum corpus mortuum à viuo. Quæ autem in aliis regionibus crescit, non ita multum deficit: vnde Iris Gallica alba purgata vsurpatur, lib. 8. comp. ph. part. & hodie passim Florentina pro Illyrica nobis obtruditur. Iris coquit, tenuat, calfacit, pituitā crassam

Lib. 2. antidotorum.

Lib. 6. & 9. c. ph. p.

Lib. 1. antid.

b 3 & bilem

Lib. 9. c. ph. p. & bilem purgat, humorem ex pulmonibus crassum expecto-
Diosc. rat. Ireos sylvestris radix lib. 10. comp. ph. part. ephemeræ ra-
 dix videtur accipiēda, de qua nūc in Hermodyctylo egimus.

Lib. 6. sim. Ifatidis radix in dia chamæmelo Actuario ea est amara,
 astringit valenter, siccatur sine morfu, ob hæc vulnera magna
 etiam in capitibus musculorum duræ carnis glutinat.

Gal. li. 7. simpl. **L**ilii radix terget primo ordine, digerit moderatè, emol-
 lit, menses ciet, vulnera glutinat, etiam in capitibus muscu-
 lorum cum melle mista. Eadem præstat foliū, sed imbecil-
 lius. Flos verò substantia constat mista ex tenui & terrea, &
Gal. in fine c. aquea: coctus ex oleo mollit, & citra morsum digerit. Liliū
ph. p. radix mollit, coquit, terget, discutit: ob hæc vitiligines, lepras,
 pforas, achoras, furfures emēdat, Diosc. addito melle, vel alio,
 vim eius tergendī imbecillam augente, Gal. lib. 7. simpl.

Gal. li. 7. simpl. **M**Andragoræ maris ceu præstantioris delibratæ radicis
& Diosc. cortex crassus, lino traiectus ad vsum suspēditur, refri-
 gerandi valētissimæ, vt ordine tertio, & siccādi primo. Eius-
 dem & pomi succus prælo expressus, insolatusq; donec cōcre-
 uerit, fistili reponitur ad vsum eisdē: sed in pomo cum calore
 quodā est aliquid humiditatis, à qua est soporiferum.

Lib. 1. antidot. Meum nobis frequens, Dioscoridis picturam explet, tamē
Lib. 9. c. ph. p. præstantius Macedonicum, aut Hispanicum: sed Athamanti-
& lib. 7. simpl. cum laudat Andromachus minor in sua theriace. Calidum
 est ordine tertio, siccum secundo, vrinas & menses mouet, vt
 asarum, sed largo vfu, cephalalgicum est.

Lib. 8. simpl. **N**ardi spica & radix, calida excessu primo, sicca secūdo:
 astringit, subacris, & leuiter amara, iecur & stomachum
 roborat, sumpta & admota, vrinā ciet, fluxiones intestinorū,
 capitis, thoracis siccatur. Nardus igitur mistæ est substantiæ &
 facultatis tum digerentis, tum repellentis, & roborantis. Nar-
 dus præterea vim habet non exiguam coquendi omnes frigi-
Lib. 6. & 8. c. das dispositiones. Ea est multiplex, præstantissima est Indica,
ph. p. secundo loco Gallica, post Cretica, & quæ apud nos montana
Lib. 9. c. ph. p. ex Cilicia, & nardina herba potius quàm nardus vocatur. Ra-
Lib. 6. c. ph. p. dix nardi Indicæ, & apud nos montanæ modicè astringit.
 Nardus Indica quanquàm radix est, tamen etiā *ῥάδιον ῥάχυσ*,
 seu

seu cum Actuário & Hera. lib. 6. comp. ph. part. in diabefasa *Lib. 1. antidot.*
ωαρδίαχμος, id est, spica nardi, à similitudine formæ cū spica.
 Tamen Philo in sua antidoto Creticā nardum, vel vt alii eius
 ænigma interpretantur, Indicā radicis falso nomine dici au-
 tumat, quoniam spica nardi nuncupant. Nardi Gallicæ cum *Lib. 9. c. ph. p.*
 radicibus & terra circumdata fasciculū vnū cum aliis ad co-
 lumellas laxatas adhibet Archigenes: astringit enim & dige-
 rit nardus Gallica, ambo mediocriter. Nardi Celticæ flores
 vsurpātur lib. 8. eiusdē in tertio Andromachi medicamento.
 Nardus autē Gallica, seu Celtica dicitur: nam gentem eandē *Lib. 6. c. ph. p.*
 Gallos, Galatas, & familiarius Celtas appellant. In Liguria *Ibidem.*
 albis ea nascitur Dioscoridi. Radice igitur vtilior apparet *Lib. 1. antidot.*
 ex initio lib. 8. simpl. & locis prædictis, spica tamen non inuti-
 lis. Laudatur enim recens, levis, larga coma, spica breui, fla-
 ua, odoratissima, cyperum redolente, diuq; in sua odoris gra-
 tia permanens, amara, linguam mordens. Nardus etiam *Lib. 7. c. ph. p.*
 Syriaca vsurpatur in arteriace 12. Andromachi, sed imbecil-
 lior est quā Indica. Fugienda nardus quæ *Lib. 1. antidot.*
ἐκπλυτ, id est
 elota dicitur, & eligenda quæ *ὀμφας* lingua Barbarorum di-
 citur. Spica vulgaris, odoris & saporis gratiam illam non ha-
 bet, imo inter coquendum odoris est grauissimi, & egros læ-
 dit: estq; verius pseudonardus, quā vera nardus.

Oenanthes radix in multa capitella ceu oliuæ fructus ex- *Diosc.*
 tuberans, ex vino stranguriæ subuenit. Oenanthē au- *Vitisflora.*
 tem vitis agrestis ac erraticæ flos cum germine astringens in
 vsu est frequentiori Medicorum. Gal. initio lib. 8. comp. ph.
 part. & lib. 7. meth.

Petroselinum, id est, apium petrosū omnibus notum, in *Gal. li. 1. antid.*
 regione Macedoniæ præcipiti nec magna laudatissi-
 mum nascitur, hoc est, acerrimum & amarissimum, maxi-
 mē si recens fuerit, sed paucum, à qua Estreaticum dicitur
 & Macedonicum. Plurimum verò in Epiro gignitur, ex qua
 in Macedoniam comportatum, & propē totum in Thessalo-
 nicen. inde tanquam Macedonicum à mercatoribus diuehi-
 tur: alioqui vniuersis gentibus non sufficiat. Quomodo mel
 Atticum melle ex Cycladibus locupletant, proq; Attico ven-
 dunt: & vinum Falernum in parua quadam Italiæ regione

paucum genitum, sic ab indigenis adulteratur, vt in omnem Romanorum imperio subditam regionem feratur. Si autem Estreaticum Macedonicumq; petroselinum desideras, nihil peior, sed minus amara erit theriace, & alia antidotus, si alterum iniiciat. Nō enim deleteriis pharmacis, aut virulentarum bestiarum moribus adeo aduersatur, quod principalissimum est theriaces promissum: sed id hydropicis, imbecillibus, & aliis quibusdam similibus affectibus succurrit. Hæc Gal. lib. 8. simpl. Calidum siccum ordine tertio, acre, & amarum, incidit, vrinas & menses affatim ciet, flatus dissipat: semine tamē quā radice & foliis est valentius: quapropter id maximē in vsu est.

Gal. lib. 8. simpl.
Diosc.

Pyrethrum ab ignea & caustica vrenteq; vi dictum, quam mansu saluam potentius, quā pro caloris modo elicit: vnde & Saliuaris quoq; Latinis dicitur. In Apœnino frequens, annis quinque seruetur: affectibus omnibus frigidis efficax.

Manardus in
epistolis.
Lib. 6. simpl.

Pœoniæ maris radix longa, althææ æmula, cōtra epilepsiā & melancholiā recēs collo appēdenda potius quā fœminæ radix. Luna autē decrescēte hanc legi volūt: leuiter astringit, subamara est cum quadam dulcedine & acrimonia, si diutius mandas, menses ciet, obstructa hepatis & renum expurgat.

Lib. 8. simpl.

Peucedani radix calida ordine secūdo, sicca tertio: incidit, tenuat, digerit, affectibus neruorum frigidis, lienī indurato, pulmōni farto pituita crassa, lenta, vlceribus contumacibus auxilio est. Succus ex hac expressus valentior est.

Phu Dioscoridis, & cæterorum Græcorum, nostræ Valerianæ plurimū exprimūt, nisi florum, qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desideretur. Phu Ponticum aliquid habet simile nardo, & petroselino, & cæteris feminibus vrinam mouentibus. lib. 8. & 9. comp. ph. part. antidotis inferitur.

Lib. 8. simpl.

Polypodii radix dulcis, & austera, multum siccans, sed sine morfu, purgādi vim tacet Gal. bilem, pituitamq; trahit, Dioscoridi. In quo non bilem sed melancholiam legit Serapio: sic & Mesues, & alii post eos plerique, melancholiæ purgatricem vim tribuunt. Sit crassum, solidum, cirrosum, ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo, vt pistacium recens, quercubus innatum potius quā faxis & muris: aliis contrā videtur, nisi astringendum sit.

Mesues.

Pentaphylli radix siccatur ordine tertio, sine morfu, tenuiū est

est partium, minimum acris, & calida: Tormentilla putatur Leoniceno, Manardo, Ruellio, quæ nunc quinquefolia, nunc septemfolia his & mihi sæpe visa est: vti & vulgare quinquefolium etiam septemfolium frequenter est: vti & Eupatoriū, quod etiam dicitur Pentaphyllum Galeno lib. 5. ph. part. Hæc radix in theriacen recipitur, & nostra tormentilla venenis & pesti resistere experientia multa est certissimum, vt si non sit eadem, eius loco vsurpari possit.

RHa, Rhaon, Rheon, Rhion, radix nigra, costo nigro for-
ris, centaurio magno intus similis, sed minor & rufior, Diof.
fungosa & laxa, aliquantulum leuis, sine odore, teredinibus
non exesa, quæ mansa colorem reddit pallidum, ad crocū in-
clinantem, facile fragilis, amara: præter hæc legit in Diosco-
ride Serapio, astringens, si plusculum mandatur, subacris: san-
guinem expuentibus, cœliacis, dysentericis cōfert. Ex riguis
ad Rha fluuium supra Pontum (vnde Rha Ponticū Græcis & Gal. li. 8. simpl.
Latinis, & radix Pontica Celso dicitur) & Bosphorū septen-
trionali tractu affertur: parum purgatoriū experientia poste-
riorū, licet inuentu sit rarissimum, & hodie propè ignotum:
obscuratum opinor à Rha barbaro seu Indico, quod ex India
meridionali in totam propè Europam quæstu maximo cōue-
hitur, odoratum, grauitate insigni commendabile, astringens,
amarum, cholagogum magis, colore dum manditur planè
croceo. Quod siue idem sit genere cum Pontico, viribus ta-
men, colore, odore, pondere nonnihil dissimile soli & cœli ra-
tione: siue omnino diuersum, aliis disquirendum relinquo,
quibus plus est otii, & facultatis: cum præsertim etiam cele-
bres hodie medici in ea cōtrouersia sibi nō constent, & nunc
idem, nunc diuersum affirmant. Manardus nanq; in epistolis
nunc idē nunc diuersum censet: Mesues & Serapio suo Rha
barbaro tribuūt omnia, quæ Diof. & Gal. Rheo. Mihi satis
fuerit admonere, in locum Pontici iam propè desiti Indicum
viribus proximum, & vbique copiosum potius esse sufficien-
dum, tanto tamen parcius quanto efficacius, in Græcorum
compositionibus, quàm cœtaurii magni radicem minimo vi-
riū commercio cum Pontico conuenientem. Præsertim au-
tem sufficiens est, quòd in Indico est astringēs magis, mi-
nusq; purgatorium, quale multum inuenitur: aut saltem eius

macerati vel afsi magma, prout Medicus iudicauerit. In Arabum autem compositionibus utrūq; distinguitur, illud Rheu Ponticum, hoc Raued Seni appellatum. Rhion vel *ῥίον* Ponticū, vel Rhiu Pontici radix ferè Galeno dicitur in cōpositis medic. part. 7. & 8. & in antid. *ῥίον ποντικόν.* & *ῥίον βαρβαρικόν.* Actuario: & Rheu Pontici radix idem Pōtica radix in Esdræ antidoto: *ῥίον ἰνδικόν* Actuar. in *διαλάχαρ* pro Raued seni Mesuæ. Mesuæ. Seruatur annis 3. 4. psillio, milio, cera oblitum sola, vel cum terebinthina. Quod autem vulgus Europæ pro Rha Barbaro in hortis passim serit, Lapathi genus omnino videtur, licet radice colore Rha Barbaro nonnihil sit affine, viribus autē plurimum abest. At cū reliqua Rhej vtriusq; historia nemini scribatur, sed radice solius, conuincere nequeas, congenerem plantam vel degenerem & diuersam, nisi ex partis vnius natura.

Rubia fatiua radice acerba, & amara, lienē & iecur expurgat, vrinas crassas, multas, sæpe etiam cruentas, & menses mouet, albos albos cum aceto terget. Cortex Rubiæ recipitur in antidotum ad lienem Actuar.

Σ *Αρξιφάγον* Græcorū à nostra vulgari Saxifraga diuersum, tamē utrūq; calculos renū cōfringere certū est: hoc multa neotericorū experiētia, illud Galeno in the riace ad Pisonē, & lib. 5. sanat. tuendē: quod esse Betonicā inde patet *κίσρον ἢ ψυχρότροπον* (quod locis aliosis gaudet Diosc.) *ῥομαίσι δὲ βίτονικη* amari uscula est, ac subacris, incidit, calculos renū rūpit, &c. lib. 7. simpl. & apud Dioscoridē capite cestri seu betonicæ. *Ἐπὶ δὲ τῶν λιθιόντων, ἢ βιτονικῆς τι πῶς μίγνυται, ἢ κίσρον το παρὰ τοῖς κελτοῖς γινόμενον, καλοῖσι δὲ τὴν βοτάνην τάντλη σαρξιφάγον.* lib. 5. sanat. tuendæ in sene calculoso: nisi quòd hīc betonicam à cestro videtur separare, si pura est lectio, aut ἢ pro siue, vel id est, capiendum. Hac opinor causa Ruellius ætatis nostræ doctissimus medicus ex Dioscoride caput de Sarxiphago diuersum à capite de Betonica expunxit. Radix sarxiphagi Actuar. passim vsurpatur.

Gal. li. 8. simpl.

Scilla calida ordine secundo, admodum incidit: assam aut elixam sumi præstat, vt virium eius vehementia exoluatur. Legenda ex terra quando folia eius & caules omnino aruerunt, lib. i. antid. Scillæ albæ segmenta seu taleolæ culrello ligneo separatæ, lino traictæ modicis interuallis ne se cōtingant

gant, in vmbra siccantur diebus 60. vt ex his fiat acetum scilicet Diofcoridis. *Diofcoridis*
 lites. Alba est mafculus, eaq; vtilior quàm fœmina nigra. De *Plinius cap. 9.*
 ea leges plura in cōpofitis medicamētis de Paftillis fcillinis. *lib. 20.*

T Amarix, feu Myrica, fructu, radice, foliis extremis ramulis terget, incidit fine manifesta ficcatione, parum astringit, tenuium partium, lien iudurato cum aceto aut vino coctis prodeft: fructus & cortex valentiùs astringunt. Fructu tamen & fuccum & non radicem adhibet fplenicis remediis, *Tamarifcus lib. 7. fimp.*
 lib. 9. comp. ph. part. Quinetiam trunco in vafcula vel potoria vel efcaria cauato, lienem arcano quodam odio fuibus & hominibus longo vfu abfumit.

Thymelæa Diofcoridis, est Mezereon Mefuæ, vt patet confereti fructum, myrti baccæ æmulum vtrique, quod granum gnidium dicitur Diofcoridi. Folia quæ oleæ fimilia faciunt ambo, fed anguftiora Diof. maiora Mefues: ramos Mefuæ bicubitales, Diofcoridi tripedaneos. Cùm hi chamelææ (quam nonnulli mezereon putant) fint dodrantes & palmo tantum alti: vnica autem thymelæam facit Diofcorides: multas mezerei fpecies facit Mefues.

Turbith Serapionis, est Tripoliū Diofcoridis ad verbum. Turbith vel Turpetū Aftuarij duplex, est Diofcoridis, Alypon & Pityufa, quam etiam Turpet à Barbaris vocari fcribit: nec fortè vox ea cum Leonicensi & aliis quibufdam expungenda ex Diofcoride fuerit, quum alias plerafq; appellationes barbaras interponat. Turbith autē Mefuæ quibufdam videtur fecunda tithymalli fpecies. In hac opinionum varietate de radice hodie parum comperta, & quæ viribus maleficis est prædita (quanuis enim crudam, & craffam, & lentam pituitam purgare dicatur, magno id ftomachi, cordis, & aliarum partium incommodo præftat) fatius est eius loco vel agaricum, vel aliam phlegmagogam fubftituere. Laudant Arabes eius corticem album, gummosum, vacuum, arundinaceum, recentem, friabilem: corrigunt zingibere, & formatis ex eo trochifcis.

Zingiber Galeno & aliis cum indigenis ferè dicitur, quibufdam Zinziber, aliis Gingiber: radix est herbæ graminis modo serpentis, candicans, odorata, piperis fapore & viribus,

viribus, nisi quòd tardiùs calfacit, sed diutiùs, vti longum piper, ob humiditatem excrementosum: cuius occasione utrūq; teredinibus faciliè tentatur. Condiendum recens omnino est, nunquam vetus impostorum more. Mittitur ex Arabia & Troglodytica.

Zurumbet Serapioni, Auicennæ aliisq;, & Zedoaria, *ξοῦδαγ* Actuário in aurea antidoto dicitur, *ξάδοναγ* eidem in *Διακομίσω*. & in diantho, alibi *ξάδρα* & *ξάδοναγ*. res est ac nomen barbarum, Græcis prioribus incognitum.

Est autem radix aristolochiæ rotundæ æmula, sapore & colore zingiberis: calidum siccum gradu secundo: flatus dissi pat, odorem allij, cepæ, vini tegit, morsui venenato resistit, vomitum cohibet.

DE HERBIS.



VAE priùs in radicibus dicta sunt de collectione, repositione, duratione illarum, ad herbas trāsferri possunt, nisi quòd his ferè recentibus vtinur, quibusdā omnino, vt portulaca, lactuca, buglossò, atriplice beta, brassica, acantho, nasturcio, helxine, mercuriali, viola nigra, intybo, fumaria, hyoscyamo, mandragora, & aliis permultis. Quibusdam verò recentibus vtinur, quando his mitioribus opus est, vt ruta, mentha, absinthium, abrotanum: recentes minùs calent ob istam humiditatem excrementosam: siccatae verò calidiores sentiuntur: & fumaria recens minùs aluum subducit: magis sicca.

Colliguntur ferè cum floribus herbæ, aut seminibus, sic benedictus carduus acanthium putatus, centaurium paruum, calaminthe, chamædrys, chamæpitys, daucus, fumaria, maiorana, polium, pulegium, origanum, serpillum, thymus: aut saltem cùm vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quæ scapo sunt crassiores, aut folio humidiores, & ob id apto putrere. Vbi probè sunt siccatae, reponuntur vti radices, sed minùs diu seruari possunt: ob id quotannis mutandæ.

Absinthi



Abſinthium triplex forma, ſapore, facultate planè diuerſum, vt interim natales omittā. Primum generis nomine dicitur, quale præſantiſſimum eſt Ponticum. Id folio & flore eſt multò minore, quàm cætera abſinthia, et odore non inſuaui, ſed aromatum quid præ-

Lib. 11. meſho.

ferente, qui reliquis omnibus planè fœdus: quapropter hæc fugienda. Utendum autem ſemper Pontico ad ventriculi & hepatis phlegmonas, ad tergendum, purgandum, ſubducendū prauos humores ſtomacho hærentes, & roborandum dictas partes contrahendo & cōſtringendo. Cū enim omni abſinthio duplex ſit facultas & qualitas, in Pontico aſtringens quidem plurima eſt, amara verò exigua: ob id calidum eſt exceſſu primo, ſiccum tertio. In cæteris abſinthiis, vt abrotano, amara eſt vehementiſſima, aſtriſctio autem obſcura, aut prorsus nulla guſtu ſentitur: ob id ſtomacho ſunt hæc inimiciſſima. Ponticum prætereà terget ſordes tunicarum ventriculi, nō tamen ſi quid altius in eo imbibitum eſt, foras extrahit, aut expellit, aut ſaltem parū id præſtare valet ob iunctam inſignem aſtringendi facultatem. Hiera autem picra propter id excogitata ſalubriter, illud ipſum poteſt. Ponticum autem videtur eſſe, quod Romanum Meſues vocat, quodque paſſim hodie viſitur. Diuerſus enim Meſues Galeno tātum eſt, quod ſiccum tertio gradu hic, ille ſecundo ſcribit. Quæ controuerſia in aliis ſimplicibus multis eſt inter medicos etiam doctiſſimos: quorum vnus in fine, verbi gratia, primi vel ſecundi, alter in principio ſecundi vel tertij intelligit: quæ ambiguitas etiam Galeno ipſi eſt in anetho, praſio, ruta agreſti, & aliis permultis. Nam quod ſuccum eius dicit Meſues ob nitroſam qualitatem nocere ſtomacho, ipſi Galeno id non aduerſatur ſcribenti, ſuccum longè ipſa herba eſſe calidiorem.

Lib. 8. c. ph.

*par. in hiera pi
cra Gal. lib. 6.*

*ſimpl. initio et
ſine.*

*Lib. 6. ſanit.
tuen.*

Noſtrum autem vulgare abſinthium ſarmentofum, folio & flore multo maiore, quàm cætera tria abſinthia: veteribus inter abſinthia comprehenſum non videtur, niſi eſſe velis abſinthium primum Dioſcor. quod vulgò notum dicit, & βαδωνισπον, vel potiùs βαδωνισπον vocari à multa amaritudine, qualis in aloë, cui ſubſcribitur Dioſcoridi, à qua vulgus aloinam & forte appellat. Id autem ſi primum in Dioſcoride recipias, quænam alia in eo ſtatues? Tamen id ad lumbricos, vti &

vti & fantonicum, est efficacissimū sumptum & admotum.

Lib. 6. simp.

Abrotanum fœmina foliis seriphio & cypresso proximis, albioribus: vnde cypressus & chamæ cypressus vulgò dicitur. Mas verò abrotanum generis nomen tenet, calidū siccum tertio recessu à mediis, admodū amarum, coma cum floribus vtile, vt absinthium, & cineribus suorum sarmentorum ad pilos reddendos.

Lib. 6. simpl.

Acantha, vel Acanthus branca vrsina vulgò: foliis modicè digerit, radice siccatur, leuiter incidit, est tenuium partium, emolliendæ aluo iniectionibus hodie destinata.

*Li. 1. c. ph. p. et
Lib. 6. simp.*

Adiantum, seu Polytrichon calido frigido temperatum, gustu acerbo, siccatur, tenuatur. digerit, ob id strumis confert, lapides frangit in nobis, crassa & lenta ex pulmone educit, capillos reddit, præsertim vstum. Triplex Dioscoridi esse videtur: primum speciatim Polytrichon vocat, Adiantum album Theophrastus, Gaza cum vulgo Capillum Veneris. Alterum Trichomanes, nigrum Theophrastus, vulgus Polytrichon. Tertium foliis filicis, vulgò Adiantum, vt Dioscoridis textus hoc loco mancus videri possit. Nam foliorum filicis & lenticulæ tam dissimilium bis in eodem adianto non meminisset. Quartum addi potest Salvia vita vulgò dicta, quartanis curandis efficax est. Galenus adiantum non diuisit, fortè quòd omnium eadem sit facultas. Callitrichon à nonnullis Trichomanes dicitur: tamen qui de herbis scripserunt, adiantū vocant callitrichon potiùs quam trichomanes: Polytrichon autem & callitrichon diuersa facit, lib. 1. comp. ph. part. Recens melius, nisi cùm siccandum & astringendum valentius.

*Gal. lib. 2. c. ph.
p. in caluitio in
tempestiuo.*

*Agnus castus,
iunctis ambo-
bus vulgò.*

Αγνος, id est, castus, quòd ad castitatem conferat, foliis & floribus sumptis & substratis, & semine frixo, vel non frixo: id enim sumptum, vt semen rutæ, nocturnas veneris imaginationes cohibet, lib. 6. sim. & libro 6. sanit. tuendæ. Calfacit, siccatur ordine tertio, acris est ac astringens, & substantiæ multum tenuis, flatus omnium maximè discutit. Ob id lege libro primo alimentorum calfacit, non cum Græcis exemplaribus et veteri interprete refrigerat, quod effecta illic adscripta indicant. Item lib. 2. comp. ph. part. de cephalalgia ab æstu, vbi Agnum inter refrigerantia commemorat: & paulò post vbi Archigenis dicta distinguit, folia lauri calidissima, Agni verò mediocriter refrigerant, legèrem non ἄγρον sed ἀνύρον. quæ
planta

planta Dioscoridi refrigerat, & astringit, etiā si Galenus fortè alibi nusquàm ea herba sit vsus. Neq; enim placet elusio, quòd per accidens refrigerat: id enim etiam foliis lauri & calidis omnibus commune est.

Alyssos herba marrubio similis, asperior tantùm, & spinosioribus pilulis, flore cœruleo, aduersus rabiem efficacissima, vnde illi nomen. Legenda autem sub feruenti æstu caniculæ: siccata trita creta reconditur, ne quid viriū eius expiret.

Gal. lib. 2. antid. & Acl.

Anethum calidū secundo ordine, siccum primo, tenuium partium, digerit, ex oleo decoctum dolores sedat, somnum conciliat, crudos humores coquit, præsertim viride, quia minus calidum & humidius est. Vstum autem calidum siccum gradu tertio fit, vlcera præhumida præcipuè pudendorum & præputij cicatrice tegit. Coma florum odoratissima, & semine nobis consuetissimum est.

Lib. 6. simp.

Betonica amariuscula, subacris, incidit, calculos renum frangit, pulmonem, thoracem, hepar purgat & terget, menses mouet, epilepticis, acidum ructantibus, ischiadicis, pota prodest: admota autem vlceri, omnibus bestiarum moribus. Vide *σακκίφάρον*.

Beta viridis, alba, & nigra, nitrofa est facultatis, qua digerit sine calore manifesto, terget, per nares purgat, alba adhæc valentior: nigra subastringit, præsertim radice: coquendo has vires exuit.

Li. 8. simp. & lib. 1. c. ph. p.

Blitum imbecilliter refrigerat & humectat, lib. 2. cōp. ph. part. in secundo recessu à temperatis, lib. 6. sim. iā vulgare est.

Brassica esculenta sapore nitroso, parum acri, siccatur, terget sumpta & admota, induratas phlegmonas digerit, lepras terget, vlcera etiam maligna glutinat. Cinis vstorum eius caulium siccitate est caustica, cum adipe veteri mistus veteratos laterum dolores discutit. Brassicæ sylvestris semen maximè tenuat, efficaciter siccatur, & digerit, lib. 9. comp. ph. part.

Caulis. Gal. lib. 7. sim.

Brassica marina subsalsa, & subamara, ventrem deiicit, & cætera præstat, quæ has qualitates sequi consueuerunt.

Soldanella.

Buglossus bubula lingua Catoni dicta, calida humida, ob id vinis iniecta lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditur, vnde Euphrosynon Græcis vocatur, & nobis Corago, corruptè Borago, Her. tussi ob faucium asperitatem natæ cocta in meli

Gal. lib. 6.

in melicrato confert. Iulio mēse colligitur Diosc. Buglossum magnum, Cirsum Dioscoridi dictum, Buglossus vulgaris videtur, caule dum veterauit triangulo, vel in triangulum inclinante, tūcque tam spinoso, ut citra noxam non tangatur. Notæ tamen quædam Dioscoridis in utroque desiderantur.

Carduus à nostris Benedictus, ob singularem plantæ totius amarissimæ facultatē aduersus pestilentes, putresque alios affectus: an verò sit acanthium vel chamæleontis quædam species, dictu facile non est ob imperfectam horum historiam.

Lib. 8. simp.

Cichorium, Romana lingua Intybum olus dicitur, Gal. lib. 2. comp. ph. part. Id verò & reliquæ sereos species, foliorum magnitudine & cultu distinctæ, facultatibus parum discrepant, nisi quòd agrestia satius sint sicciora & amariora. Omnia enim hæc subamara sunt, subfrigida, modicè astringentia: sed agrestia frigida sicca secundo ordine: domestica verò magis refrigerant, & in his multa humiditas mista siccitatem extinguit. Ob hæc hepatis intemperiem calidam tum solam, tum cum corruptis humoribus & ichoribus maximè iuuant refrigerando, roborando, sinameius partem & gibbam obstructione liberando: præsertim si cum vino albo bibatur, & cum melle, sic enim illos humores per vrinas pellunt: nec frigidam multum lædunt, ut alia permulta, quæ sunt frigida humida sine amaritudine & astringitione: sumuntur succo, decocto, puluere, lib. 8. comp. ph. part.

Chondrilla omnis, & Sonchus, & Hieracium utrunque sereos species etiam Dioscoridi & Galeno putata, & sereos ac cichorij nomine etià ab his & aliis dignata (licet Chondrillam lactucæ non seri iungat, lib. 2. alimentorum) ut forma & temperatura sunt affines, sic viribus minimum discrepant. Ob id ea tanquàm congeneria iungit Dioscorides. Pro Intybo autem vulgus Endiuia re & nomine corrumpit, ut pro feri scariolam quasi feriolam dicere tentauit.

*Lib. 6. c. ph.
par. & lib. 7.
simp.*

Calaminthe, vel cum Nicandro Calaminthum, Galeno duplex est: domestica, & eo efficacior môtana, quam ab Andromacho minore miratur Nepirhâ voce Romana potius quàm Calaminthen Græca vocari in sua theriace, cum cætera Græcè appellarit. Dioscoridi triplex est, primò montana, vulgare calamen

calamentum: secunda pulegium sylvestre, tertia herba eataria Ruellio videtur. Musæ cōtrà, tertia vulgare calamentum, secunda cataria putatur. Ob imperfectam omnium historiam in hac sententiarum varietate iudicium difficile, καλαμίνδην πωλάμαρ addit Aët. Galeopsis autē quæ vulgò herba cataria putatur, esse vrtica foetida purpurascētibz floribus videtur. Calaminthe calida sicca gradu tertio, acris, parū amara, tenui substantia, cutim calfacit, mordet, fugit, postremò vlcera: tamen eius succum vulneri etiam cerebri meningas diuidenti infusum, milii farina sicca superiecta glutinare affirmat Archigenes apud Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Lib. 1. antid.

Lib. 7. simpl.

Chamædris, id est, quercula, amara, subacris, calida sicca tertio gradu, sed calidior paulò quàm ficior. Ex Creta Cæsari afferebatur ad theriacas compositionem: tamen vbique nascitur, etiam in Romæ suburbiis, odore & gustu quàm Cretica vehementior, præsertim si multo imbre non fuerit irrorata, quamvis hac campestris sit melior. Prægnans semine cum Dioscoride, aut succo cum Plinio, aut etiam flore cum Galeno carpitur.

Lib. 8. simpl.

Lib. 1. antid.

Gal.

Chamæpitys, id est, pinus pumila, quòd odore & foliis eam imitatur, Aiuga Idea Scribonio dicitur, aliis Abiga, vulgo Iua: calida secundo gradu, sicca tertio: amarior quàm acrior, terget, purgat, obstruatum iecur liberat, istericis, ischiadicis cum mellicrato pota succurrit, menses, vrinas ciet, viridis vulnera magna glutinat, vlcera putrescentia sanat, mammarū durities discutit. Huius radicē vsurpat Asclepiades, succo tamē decocto, semine, puluere idē pollet, Gal. lib. 8. cōp. ph. part.

Lib. 8. simpl.

Cicuta refrigerat extremè, id est, quarto gradu, ob id lethalis est: eius vna species nobis est pumila, odorata, quæ frixa & admota dolorum causas leues dissipat. Cicutæ semen excorticatur, lib. 10. comp. ph. part. in fine.

Lib. 7. simpl.

EVpatorium, vel Hepatorium, vel Hepatitis, omnino agrimonia vulgaris videtur, Dioscoridis Eupatorium cum Serapionis agrimonia, & Mesuæ eupatorio conferenti. Corruptum verò nomen ex argemone apparet, quam falsò Eupatorium quidam (vt Dioscorides ait) putarunt: incidit, terget, tenuium est partium sine manifesto calore, subastringit, iecoris ob id obstructions aperit, ipsumq; roborat, vnde & nomen

Lib. 6. simpl.

c men

men inuenit: vel cum Cicerone, ab Eupatore rege. Hanc etiam Pentaphyllum vocari, quod folio sit quinquepartito, scribit Gal. lib. 5. comp. ph. part. vt dixi in Pentaphylli radice. Eupatorii nunc folia, nunc radicem Actuarius miscet.

*Hermolaus in
sarxiphago.*

Eufragia veteribus incomperta herba, Pampinulae similis, folio minore, & magis ferrato, flore luteo, praecipuae claritatis ad omnia oculorum vitia: vnde ophthalmica dici potest: ab euphrosyno detortum nomen apparet. Montana melior, quae ferè est polyclonos, alibi monoclonos magis.

Lib. 7. simpl.

Dioscor.

Mesues.

Fumarica acris, amara, subacerba, vrinam biliosam & multam commanducata aut pota prouocat, hepar obstruatum purgat & roborat, scabiem & pruritus inde sanat: siccata ventriculum cum vino roborat, cum melicrato aluum subducit, succo suo oculorum claritatem, & delacrymationem summi modo molitur, vnde illi nomen.

Gallitrichum pro Gallicentru Ruellio videtur esse Horminum Graecorum, aliis Verbenaca recta, ob picturam Hormini & verbenacae rectae obscuram breuitatem, iudicium difficile. Callitrichon autem prius in Adianto diximus.

Lib. 8. simpl.

Hyoscyamus, id est, Suis faba, quod eius pastu apri conuellantur, & resoluantur, nisi mox caneros fluuiales edeant, Helianus: his enim fabis apros Erymanthios in Arcadia ab Hercule occisos scribit Philo in sua antidoto, lib. 9. comp. ph. part. Galeni. Triplex Dioscoridi & Galeno: primus flore purpurascens, semine nigro, venenosissimus: alter flore & semine luteo, mitior, sed etiam deleterius: tertius flore & semine candido, ad sanationes aptissimus, frigidus ordine tertio, siccus primo, Gal. lib. 3. methodi.

Gal. li. 8. simpl.

Hysopum calidum siccum ordine tertio, tenuium partium: crassa & lenta ex pulmonibus extrahit, humorem crassum per aluum etiam purgat, obstructions terget: montanum est efficacius hortensi: Cilicium praefert Dioscorides: Creticum verò commendatur Archigeni, lib. 8. comp. ph. part. Galen. in chrysocome & origano Heracleotico. Quaedam à Dioscoride Hysopo tribuuntur, quae in nostro desiderari videntur. Cum florum spica legendum est, aut cum semine turgent.

Dioscor.

Lauri

Lauri folia & fructus calfaciunt, & siccant vehementer, sed hi magis quàm illa: leuiter astringere addit Dioscorides, quam vim & amaritudinem foli radici cortici tribuit Galenus, qua calculos confringit.

Lib. 6. simp. & lib. 2. c. ph. p.

Lapathum digerit modicè, oxylapathum digerit, & repellit, vtriusque semine leuiter astringit, vnde dysenterias & diarrhoeas sanat præcipuè oxylapathi. Hippolapathum, quod in aquis omnino nascitur, eadem præstat, sed imbecillius: idem verò valentius fuerit in hortos hodie translatum.

Gal. li. 7. simp.

Marrubium, seu Prasium album, sapore amaro, calidum ordine secundo, siccum tertio: lienis & hepatis obstructions soluit, pulmonè & thoracè purgat, menses ciet, ad motum terget, digerit, & cum melle oculorum aciem claram reddit.

Lib. 3. simpl.

Malabathrum sui generis folium, Indicæ nardo, vt odore & sapore, sic viribus simillimum, sed nardo efficacius. Laudatur recens ex candido nigricans, contumax frangi, integrum, odore vegeto nares feriente, & qui folio semoto persistat. Id nunc desit, à quo tamen vnguentum foliatum diuitibus Romanis mulieribus frequens, est dictum. Desit & folium Syriacæ arboris Plinio celebratum. In horum locum Mauri inuexerunt folium laurino proximum, sed maius, & neruis tribus folium intercurfantibus distinctum, odore iucundo. Primum illud folium Indum dicitur Serapioni: tamè Actuarius in hedychroo magmate, *φύλλον ἰνδύλλον*, & *φύλλον μαλαβάδρον* ceu diuersa miscet: *φύλλον* ab his diuersissimum Dioscoridi describitur, vulgò Italis folium syluestre dictum, Hermol.

Li. 1. c. ph. par. & lib. 7. simp. Dioscor.

Maron herba furculosa vulgò cognita, flore origani, sed odoratiore, foliis multò candidioribus, subastringit, modicè calfacit, sisymbrio similiter, Dioscor. Maron planta est vehementer odorata & amara, amaraco proxima, quo tamen est multò odoratior & amarior, minus tamè eo est acris, vnguento amaracino fortè dicto, quod amaraci plurimum olim reciperet, nunc solum marum immittunt: satius tamen est, æqualem amaraci & mari portionem imponere, vt hedychroi compositioni: qua mistione minus quidem odorum, non tamen minus efficax erit: hæc Galenus. Suspicio est nobis vehemens Marum esse herbam Mastice vulgò dictam, maiora namque simillimam, flore tamen muscoso in pappos abeunte.

Lib. 1. antid.

Maiorana, Amaracus, Sampfychus, Dioscoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt herba: vnguentum tamen amaracinum à sampfychino cur diuerfum fit Dioscoridi, doctè mihi Musa coniectare videtur ex plantæ huius appellatione consueta vtrique regioni, in qua vtrunque id vnguentum fiebat laudatissimum. Calida est herba & sicca ordine tertio, & tenuium partium Sampfychum, Galen. lib. 8. simpl. Amaracum verò calidum ordine tertio, siccum secundo, idem lib. 6. simp. Ex qua temperamenti varietate, & quòd seorsum de his agit, Amaracum Galeno, & post eum Paulo esse dictam, vulgò Matricariam suspicantur Hermolaus, Manardus, quæ iisdem autoribus Dioscoridis est Parthenium: sed Amaracum Galeni non esse Matricariam vulgarem odore aspernabili, sapore amarissimo, conuincit quæ de Maro & Amaraco nuper ex Galeni antidotis protulimus. Adhæc Amaracum se vidisse in Italia crescere scribit Galenus, lib. 1. antidotorum, tanquàm planta esset Italiæ rara, cùm tamen Romæ familiarem esse Matricariam Musa Ferrariensis affirmat. Nec satis ad confirmandam ipsorum sententiam est, Galenum bis de re eadem non scripsisse, cùm bis de absinthio, de atere seu bubonio, de chalciti scripserit. Parui prætereà est momenti varietas ordinum siccitatis, quòd scilicet amaracus sit siccus ordine secundo, samfuchus autem tertio: ille enim completo, hic incipiente esse possit, vt in absinthio dixi. Quo fit, vt ex his plantas esse varias nemo possit colligere.

Melissa.

Melissophyllon, id est, apum folium, quòd herba hac præfertim florente apes plurimum gaudeant, vnde Apialtrum Latinis dicitur: & à citri odore Citrago. Viribus est marrubio simile sed imbecillius, ob id etiam vsu rarius.

Lib. 7. simpl.

Ibidem.

Myriophyllum, Romanis Millefolium, siccitate multa glutinat vlcera.

Lib. 8. simpl.

ORigani genus omne calidum siccum tertio ordine, incidit ac tenuat. Tragoriganum etiam subastringit: præfertur montanum, vel Creticum, vel Heracleoticum.

Gal. li. 6. simpl.

& li. 3. c. ph. p.

PLantago refrigerat siccatur ordine secundo, astringit, repellit, digerit: ob hæc vlcera recentia & vetera etiam rebellia glutinat, hæmorrhagiam sistit, fluxiones & putredines, & ab

& ab his dysenterias coërcet, hepatis & renum obstructions tollit. Semen & radix eadem præstant, sed siccant magis, refrigerant minus. Adhæc semini adest essentiæ tenuitas. Duo eius genera facit Diosc. parvam, & hac efficaciorē magnam. Præter hæc est tertium nobis Arnoglossum, vel Arnoglossa nomine generis appellatum, folio rotundiore, sessili, hirsuto, in vsu medicorum frequentissimum.

Portulaca frigida ordine tertio, humida secundo, subaustera: fluxiones biliosas, & æstus febriles maximè cohibet sumpta, & admota. Hæmodiam, id est, dentium stuporem non omnem, sed eam solū, quæ ab acerbis, austeris, acidis est nata, sanat: quia ab his asperè exiccata lenit: & replet humiditate lenta, Galenus: vel quia suo lentore acidulo hæres ac subiens, acorem illum sibi affinem sapore ex dente extrahit, Aristoteles sectione prima, problemate 38. Huius autem effecti omnibus cogniti causam inexplicabilem, & soli Deo notam, scribit Aphrodiseus initio problematum suorum.

Populus duplex, *λίλυς*, id est, alba, & *ἄγυς* & Gal. *ἄγυς* & Diosc. id est, nigra. *ἄγυς* id est, flores, seu *σφαίρια*, id est, pilulæ, primo foliorum partu exilientia (ut in leuce vocat Dioscor.) calida primo à temperatis recessu: nam *ἐν τῇς πρώτης ἀποστάσεως* Paulus, Manardus, Fuschsius in Galeno legunt: licet *ἐν τῇ τρίτης*, id est, in tertio, habeat codex Aldinus, & ita legerit in Arabibus, vnde vertit vetus interpres: & Orbasius Græcus medicus lib. 2. ad Eunapium, & lib. 15. ad Iulianum Cæsarem, paulò ficciora, quàm quod humido & sicco est temperatum: tenuium partium potius quàm crassarum. Folia floribus sunt similia, sed imbecilliora: & resina eius exigua floribus similem habet facultatem, sed calidiorem: semen floribus & resina ficcius, non multò calidius, sed partium est tenuium. De hac vtriusque populi lacryma in Succino seu electro leges postea. Folia *λίλυς*, id est, populi albæ, media sunt inter folia lauri calidissima, & folia *ἀλύνου* herbæ, refrigerantis Dioscoridi: sic enim lib. 2. cōp. ph. legendū censuerim potius quàm *ἄγυς*, qui lib. 6. simp. dictus est calidus ordine tertio, etiā si vetus ex Arabibus eo loco habeat agni casti. *λίλυς καρπὸς*, id est, populi albæ fructus digerētis est facultatis, ibidē paulò antē. Gustāti Manardo Populū nigrā & communem, visa est modicè astringere, postea minimū amara,

Lib. 2. c. ph. p.
& lib. 6. simp.
Gal. lib. 6. simp.
pli. & de optima secta.

Lib. 6. simpl.

Oculi populi.
neutra populus
florere videtur
Hermol.

Gal. lib. 2. c.
ph. part.

Lib.7.simpl. odore non insuauis, sed languido. Ex eius igitur floribus myracopum populeum refrigerat, cum præter adipem & populi oculos modicè calida, cætera habeat frigida, etiam magna parte ad supremos vsque ordines. Populus alba temperata ex aquea tepida substantia, & terrea tenuata terget: eius flores multum acres nobis sunt, ex hisque vulgò fit vnguentum populeum: licet acopum *ἡ ἀργύρεα* apud Galenum & Paulum legatur, non *ἡ ἀνώνυμος*.

Lib.8.simpl. R Vta hortensis est imbecillior agresti: hæc enim calida ordine quarto, (tantum tertio dicitur lib.6.comp.ph. part. in stomachica diabesafa) illa tertio: vtraque acris, amara, tenuium partium, valenter siccans, incidit, digerit valenter crassos & lentos humores, vrinas mouet: flatus, & veneris appetitum cohibet. Syluestris Moly, Befanum, Befasa dicitur: Syri indigenæ Harmola vocant, lib.6. & 9.comp.ph. part.

Lib.7.simpl. Rosmarinus coronaria nobis est frequens, utilis folio & flore, quem vulgus absolute *ἄνθος* malè vocat. nec antidotus *ἡ ἄνθος*. Actuarii folius Rorismarini florem recipit, sed aliorum, ut post leges. Sterilis libanotis ad Montem Pessulanum plurima. Tertia fecunda duplex est Dioscoridi: omnes emolliunt, incidunt, tergent, digerunt, ictericis decocto profunt, & oculorum aciem ab humorum crassitie obtusam succus radicis cum melle emendat.

Lib.6.simpl. Salvia quod ad multa, præcipue fecunditatem sit salutaris, *ἡ ἑλίουφανος* Græcis, quasi syluestris lens dicitur, folio est maiore, squalidiore, scabriore: Sphacelus verò breuiore & læuiore. Quæ Theophrasti verba nostram Saluiam francam sphacelo videntur exprimere. Calfacit euidenter, & subastringit *ἡ ἑλίουφανος*.

Lib.8.simpl. Scordium ab odore & acrimonia scorodi, id est, allii, dictum est: subamarum, acre, acerbum: calfacit, purgatque viscera, obstructions liberat, vrinas & menses mouet: viride magna vulnera glutinat: siccum autem fordida purgat, contumacia cicatrice tegit. Optimum ex Creta petitur, quale etiam Andromachus iunior suæ theriacæ miscet: non malum tamen in aliis regionibus possis inuenire. Putriferis animalium venenis & pharmacis deleteriis succurrit. Quæ vis eius inde est coiectata, quod quæ in bello occisa fuerant corpora, diuque insepulta

pulta super Scordium fortè iacuerant, minus putria sunt inuenta, quod à viris quibusdam fide dignis acceptum tradit Gal. lib. 1. antid. Nobis in agro Parisiensi locis riguis est largissimum verum scordium.

Scolopendrion idè cum Aspleno cõtèdunt Musa & Massa rius in librũ nonum Plinii: tamen Galenus ait maiores lienis obstructions vehemèntiora postulare remedia, capparis corticem, tamaricis radices, scolopendrion, & scillã, & eam herbam quæ asplenos appellatur, effectum id nomine repræsentans. Vbi apertè scolopèdrion ab aspleno separat, licet postea in censu simplicium aspleni vires describat, scolopendrii non meminerit. Libro tamen methodi 13. scolopendrion quoque lienì conuenire scribit, nulla mentione aspleni facta: quamquàm ibi alia quoq; eius remedia attingat. Diuersas etiã herbas facere videtur in splenicis, lib. 9. comp. ph. part. *μυρίνη καρχῶν, βοτάνης ἀσπληνίου λεγμένης σκολοπενδρίου, ἢ ἡμιονίτιδος ἀνά:* tamen paulò antè in Andromachi splenicis scribebat, *ἡμιονίτιδος βοτάνης. ἢ ὅτι Ἰβ' ἀσπληνίου, ὅτι δὲ σκολόπενδρον λέγουσιν.*

Lib. 5. simpli.

Ex quibus colligere possis, herbas esse affines non viribus modò, sed forma & habitu, vnde nominum hæc incertitudo nata sit. Quod & in Dioscoride passim obseruabis, & in aspleno quoque, quem ab aliquibus *σκολόπενδρον*, ab aliis *ἡμιόνιον* vocari ait: non tamen *ἡμιονίτιδα* dixit, quòd hæc folio sit diuersissimo, quam tamen *σπληνιον* quoque vocari scribit. Vnde Massarius & ex Theophrasto affirmat Hemionum vel Hemionion esse vulgatum nobis Ceterach: A splenon verò seu Scolopendrion plantam esse aliam, ex foliorum & radicum pictura persuaderè conatur. Quæ autè vulgò est scolopendria, Dioscoridis est *φυλλίτις*, à quibusdam Lingua ceruina multò iustiùs appellata, quàm à Gaza Scolopèdrion Theophrasti, quàm rectius Centipedariã vertisset. Siue aut Ceterach sit asplenò aut scolopèdrion, siue hemionus dicta, quòd mutæ hæc herba plurimũ delectentur, parui est momenti, quòd hæc omnes lienè diminuant, & liquent, & substãtia tenui sine calore lapides etiam in vesica frangant: lib. autè 8. sim. & Diosc. phyllitis acerbã cùm sit, diarrhœas & dysenterias pota iuuat.

Stœbe herba quæ apud nos nascitur fruticosa est, calida, acris, odoratum quippiam resipiens, ad vini conseruationem ne acefcat, aptissima, si calor huiusdoliis admotè ignis calore

Lib. 1. antidot.

excitatus, vina crudiora percoxerit. Stœbe, quæ & Phleos dicitur, spinam habet in folio & caule Plinîo, lib. 21. cap. 15. lib. autê 22. cap. 11. omnia ex Dioscoridis Stœbe mutuatur, quòd astringat foliis & semine, ob id hæmorrhagiæ, dysenterię, oculis cruentatis, auribus purulentis conueniat, quæ vires Galeni Stœbæ acri & calidæ non conueniunt: neutra tamê harum nostra est Scabiosa vulgò dicta, quòd scabiei sanandæ sit idonea, folio erucæ cùm adoleuit hirsuto, aculeis tamen non horrente, flore cœruleo, quæ pulmoni purgândo & hepati confert, & carbunculum recens adnota horis tribus perumpit. Psœra autê Aëtii non esse nostra Scabiosa hinc apparet, quòd huius vstæ fumo arborum erucæ non moriantur, imo non moueri eas magis quàm stipularũ fumo expertus sum: quam tamen facultatem Aëtius Psœræ tribuit.

Libr. 4. sanit. tuend.

Lib. 6. simpl.

T Hymum commendatur maximè Atticum, aut ex locis siccis & editis: calidũ siccum ordine tertio, incidit, menfes & vrinas mouet, crassa & lenta ex pulnone & thorace expectorat.

Lib. 8. simpl.

V Erbascum, Phlomis Græcis, vulgò Tapfus barbatus, & Bullio albus & niger: foliis terget, siccatur, digeritur: radice est acerba, ad fluxionis affectus, & dentium dolorem idonea.

Verbenaca recta, id est, *πριτσόρων δ' ὀξυδός*. præsertim viridis & recēs, sed etiam sicca, cum radicibus oleo incocta, perfusaq; capiti, dolorem eius omnem diuturnum à frigore, aut crassis humoribus omnium maximè digerit, & caput roborat. Galen. lib. secundo composition. pharm. part.

DE FLORIBVS.



F L O R E S vt plantarũ partes reliquæ legantur, cùm maximè vigent, vt capparis in gēma, rosa expādi cœpta, reliqui ferè aperti. Sed haud ita pridem & ex quibus vis nondum exhalauit, siccantur sole magis minus, pro varia ipsorum natura: quidā siccandos volunt, donec ex pōderibus decē vnicum superfit. Reponũtur vt alia, quotānis mutantur, quamuis schœnuanthos etiā decenniũ efficax seruari possit: chamæmelum

melū item diu vegetū est, ob fortē partiū suarū mistionem.

Flores, absinthii comæ, buglosi vtriusq;, chamædryos, chamæpityos, capparis, rorismarini & aliorum quorundam in herbis prius dicti sunt: reliqui sunt dicendi.

BAlaustium sylvestris punicæ flos, cytinus sativæ & domesticæ Dioscoridi & Galeno *ἡ δὲ ἀνθεμίδου καὶ τῆς καὶ πρῶτης γενεᾆς ποικίλης*, id est, primogenia punica. Nam quando arbor florere definit, fructus ipsius apparet in mali Punici speciem figuratus. Hi in fine veris gignuntur, & meliores sunt ex granatis acidis & acerbis, quia magis astringunt, Ibidē. Ambo tamē insigniter astringunt, refrigerant, siccant, crassæ sunt substantiæ: ambo etiā hodie à medicis cū Plinio Balauſtiavocantur.

Lib. 6. c. ph. p.

Buphthalmi flos cardiacus Aëtuar. oculi bubuli effigie, unde illi nomen, colore floris Anthemidis, sed multò maior & acrior, ob id valentius digerit: putatur esse Cotula nō fecunda vulgo dicta. Anthemis, seu Chamæmelum ab odore mali dictum: calfacit, siccatur ordine primo, stipata rarefacit, tensa laxat, plena digerit, dura emollit, essentia tenuis ut rosarum succus, lassitudines soluit, dolores capitis & aliarum partium frigidos, si homo plethoricus non sit, nec cruditate laboret, sedat, libro secundo compositionis pharmacorum particul. biliosas febres percoctas, & quæ ex cutis densitate nascuntur, potu perſanat: melancholicas autem, & pituitosas, & quæ ex visceris alicuius phlegmone oriuntur, cōcoctas strenuissimè iuuat: ob id à sapientissimis Aegyptiorū vnicum putatur febrium omnium remediū. Tria huius genera Dioscoridi sunt flore tantum diuersa, intus in omnibus aureo, foris cādido in leucanthemo, melino in chrysanthemo, purpureo in erāthemo, quòd vere floreat. His nominibus Macer distinxit.

Lib. 6. simplic.

Libr. 3. cap. 9.

et lib. 6. simp.

*Chamæmelum
cōmune est leu-
canthemum.*

CAryophyllū, quasi nucifoliū, quāuis hāc nō seruet naturā, quæ nomine præteditur: fructus est arboris Aëtio & Simeoni: flos autē est Paulo cuiusdā arboris Indicæ, festuca-ceus, niger, lōgus, acer, subamarus, odoratus: calidus siccus secundo gradu Aëtio, tertio gradu Paulo: ad obſonia, suffitus, & multa medicamenta utilis. Dioscoridi & Galeno indictus.

*Clauius à figu-
ra vulgò dici-
tur.*

Crocus calidus ordine secundo, siccus primo, parū ac mediocriter astringit, qua facultate cor & partes alias roborat,

vt suo calore moderato coquit ac digerit, & siccando modicè dispositiones pectoris phthisicas iuuat, putredines corrigit, lib. comp. ph. part. 4. 7. 8. Optimus medicamenti est Coryceus recens, oblongus, integer, plenus, non fragilis, flauissimus, & qui cum humore tritus manus suo colore saturet, nec situm nec cariem redolens, subacer, Dioscor. Crocus Coryceus à Coryceo antro, in quo nascitur, veteribus atque adeò Poëtis præter cæteros celebratus: aliis sanè procerior est, non tamen aliis robore odoris aut diuturnitate est præstantior. Eligendus verò est non procerior, sed odoratissimus, & flauissimus, & longo tēpore in vigore suo persistens. Præstantissimum igitur aliquē crocum apto quodam ædiū loco repositum obserua sæpe, vt pernoscas: nam id colorem odoremq; pristinum diu seruabit: adulterati verò odor & color celeriter vanescit. Crocus Cilicius etiam laudatur, libro septimo comp. ph. part.

Lib. 1. antid.

Lib. 14. meth.
 κηκονβι, &
 κροκουτι, &
 κροκουθλω, &
 κροκουθλω le-
 ges in Act.

Epthimum Græcorum est flos thymi saturæ similis, calidus siccus gradu tertio, omnia potest quæ thymus, sed efficacius, ob id illius penuria hoc vti licet, mensura tamen maiore. Datur Epithimum drach. quatuor cum sero lactis vel mulla, ad educendum humorem melancholicum. Horum loco si Arabum epithymo, hoc est, cassutha thymo innata, vt saturæ seu thymbræ epithymbrum Actuatio dictū, & hyssopo, & maioranæ, epyssopum: & orobo orobanche: & lino linanche, vti libet, quia vires cum thymi flore easdem illi Plinius veterum solus tribuit, dabitur cum Mesue ob imbecillitatem à drach. quatuordecim ad drach. viginti. Epithymus autem Arabum, vt thymus, est duplex, hortensis, & hoc calidior siccior montanus.

Lib. 6. simpl.

Ericæ digerentis plantæ flore potissimùm ac foliis vtendum: semen etiam adhibetur lib. 6. comp. ph. part. Ericæ fructus sæpe lib. 9. comp. ph. part. in splenicis.

Lib. 8. simpl.

Genistæ nostratis, & Sparti folia, flores, semina, succus valenter trahūt, ob id anginis, ischiadibus salubriter admoventur, & hydropicis sumuntur. Flores eius antequàm dehiscant, aceto & sale conditi annos etiam tres integri seruantur, idonei primis mensis, & delicati capparum loco, quibus etiam valentius obstrueta liberant.

IOU, id est, viola omnis, & præcipue nigra seu purpurea, quanuis in eodem genere est etiam alba, vulgò Martia dicitur, & Quadragesimalis, quòd Martio mense, & quadragesima floreant. Et etiam multifolium, ob id Dasypodium Græcis dictum, concolor primæ sed plenior: frigida est ac humida primo ordine. Syrupus ex multis florum violæ nigræ recentium, vt rosarū, florum perfici, infusionibus soluit aluū, vt in compositis ipsis dicemus. Quin & semen violæ nigre album, rotundū, milii æmulum apertè cholagogum est. Est quoque eius generis syluestrior toto habitu strigiosiore, magis serpens, flore purpureo, in album languescēte, inodoro, λευκώϊον verò quanuis violam albam significet, ad omnes tamen violas præfertim eas, quæ primo vere nascuntur, siue albæ, siue luteæ, seu purpureæ fuerint, seu nigræ cum Hippocrate, seu cœruleæ, vt quidam Dioscoridis codices habent (quod expungendum putant plerique, præfertim Plinius lib. 20. & Paulus de oleo ioto, id est, violaceo, album, luteum, purpureum, leucoion tantum commemorant) extēditur. In his efficacissimæ sunt luteæ, Keiri Arabibus dictæ. Tamē cæteræ tres aut duæ caryophyllatæ, à floris figura caryophyllum imitante nobis dictæ, non sunt inefficaces: linguam enim valenter calfaciūt, & acrimonia sua mordent folio, sed magis flore, qui in his colore plurimum variat, arte opinor quæsita, vt in floribus aliis. λευκώϊον verò Theophrasti, quod florū primū se ostendit, etiam nondum exacta hyeme: radice bulbosa an sit quæ nobis circa natalem Christianum florem album pulcherrimum trifolium intus virentem ostentat, ab aliis malo diuinari, quàm à me rem non satis compertam pro vera pronunciari. De quo multa Massarius in lib. 9. Plinii.

MElilotum coquit, digerit, & parū astringit, vt crocus: largior enim est in eo substantia calida quàm frigida.

Gal. li. 7. simp.
& libro 4. c.
ph. p.

Nymphæa, quòd aquosa amat dicta: vna est flore albo, radice nigra, & semine nigro: altera flore luteo, radice alba. Vtriusq; radix & semē frigidum, siccans sine morfu, parū detergens, proinde alui profluvia, & dysenterias cohibent: semen immodicè profluens siue per insomnia, siue aliter, retinēt ex vino nigro aultero pota: in id efficacior lutea, adeò vt medeat

medeatur muliebri profluuiio, vt ad tergendum alba præpollet, quæ aqua macerata alphas, pice liquida alopecias sanat: Autumno radices exciduntur: Hæc Dioscorides & Galenus, verum facultatis florum, quibus hodie solis vtimur, non meminerrunt.

*Caprifoliū & materfylua.
Gal.lib.8.sim.*

Periclymeni fructus & folia subamara, tandem acria, adeo valenter calfaciunt, & incidunt, vt multo vsu cruentas vrinas educant, lienosos, ægrè spirantes ex oleo admota iuuat. Vides quàm fœdè labantur, qui Lycium veterum ex hoc fructu repræsentant. Nunc flore ferè vtimur, & ex eo vel flore ligustri aqua capitello destillata, ad oris & faucium aphtas & nomas colluendas.

*Rosæ parum astringunt, vt
lib.4.c.ph.p.*

Rosa omnis amara est atque astringens, præcipuè rubra, à qua substantia refrigerat, siccatur, flos autem eius astringit magis, proinde etiam siccatur valentiùs. Rosarum flores potius quàm rosas, quia imbecillâ astrictionem habent, in Diabesasa ponit Heras lib.6.comp. ph. part. Gal. & Andromachus in stomachicis, lib.eodem. Flos autem est pars interior, in qua semen est & capillus. Id semen vulgus Antheram vocat, cum Anthera compositio sit Græcis rosas siccas & alia recipiens: quin & sine rosarum flore anthera medicamentum est, lib.6.comp. ph. part. Rosæ præstantissimæ sunt, quæ longè omnium sunt suauissimæ, & aliis rubicundiores. Siccandæ verò sunt loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrent, rosas tamen non tangerent. Rosarum succus essentia est tenuissimæ, nam celeriter acefcit, & lentore caret, & vnguentorum omnium odores exoluit & obscurat. Ex rosis calidissimæ videntur Moschata, post has roseo colore insignes, incarnata nobis dictæ, quæ & cerebrum valenter feriunt, paulò minùs albæ.

*Lib.1.antidot.
Lib.3.sim.c.9.*

Lib.1.antidot.

Σχοῖνον, id est, iuncus absolutè scriptus, iuncus odoratus, Arabicus, Libycus, seu cū Celso rotundus, à triangulari cypero eum separante. Nescio autem quia causa vulgo ἀνδρὸς σχοίνου dicitur, cum rarò flos eius ad nos deferatur, sed herba sæpe, eius parte superiore à camelis erosa. Eamenim in Arabiæ viis copiosissimè crescentē, ob id parui pretij,

*Lib.8.sim. &
lib.6.c.ph.p.*

pretij, libentissimè cameli pascuntur. *σχωνάνθος* Actuarius, vulgus Scœnanthum: modicè calfacit, & modicè astringit, est nonnihil tenuium partium, ob id mediocriter digerit, & mediocriter repellit: radix astringentior, flos calidior, vrinas ac menses ciet, sumptum & fotu adhibitum, iecoris, stomachi, ventriculi phlegmonas iuuat, hæmoptoicis, id est, sanguinem fcreantibus cum aliis prodest: solo odoratus vigore deligitur: nam odoris illius gratia celeriter vanescit. 1. lib. antidotorum.

Στοιχάς nascitur multa vbique terrarum, copiosissima in Creta insula, & dictis Stœchadibus insulis, in mari Iberico, à quibus appellata est: nascitur & in Arabia, vnde & Arabica vocatur. Amara est, modicè astringit, proinde tenuat, terget, obstructa liberat, roborat viscera & corpus reliquum, putredinem arcet. Habitatior & meliùs nutrita atque melior ex insula Creta peritur, lib. 1. antid. Est in Gallia Narbonensi Stœchas citrina vulgò dicta, à comæ & corymbi floris colore luteo, Dioscoridis Heliochrysum, & Galeni Amaranthus videtur: altera autem flore purpureo.

κύκλασις
Gal.

Lib. 8. simp.

Lib. 9. c. ph. p.

Ex prædictis, & non paucis sequentibus plantarum partibus, & animalium, atque adeò metallorum, aqua fit vi caloris vel ignei, in flamma, prunis, arena, cineribus, scoria ferri, calce irrigata, aqua feruente (quod diplomata, id est, vas duplex dicitur) vel putredinosi in fimo equino, corticibus putrentibus, vel solaris. Tenuata enim humiditas à calore vapor fit, qui elatus capitelli vitrei, terrei, plumbei, argentei, vel alia materia frigida crassa constantis frigiditate concrefcit in aquam per nasum eius defluxuram in vas subiectum, quo modo pituita in capite humano ex totius vapore gignitur, & per nasum destillat. Cui si ignis valentior sub finem accesserit, rerum ipsarum humidum substantificum tollitur, & si quod rebus ipsis inerat oleaginum, vel delabitur pro vasorum situ & figura. De qua re fusiùs in compositis medicamentis agam, quòd hæ aquæ quamuis simplices sint, quia tamen aliquid opera nostra acceperunt, & fortasse veræ sunt compositæ, vt aqua calfacta Galeno.

Lib. 1. simp.

DE SEMINIB V.S.

Lib. 2. alimen.
initio.



SEME N à fructu differt, vt contentum à continente, seu potiùs vt pars à suo toto. Fici enim fructus sunt ipsi ficus, *κεχγαλιδις* verò in fructu granula sunt semina, in moro similiter. & *γίγαστρα* in acino fructu sunt vitis semina: & tria aut quatuor granà in medio pomo, pyro, sunt eorū fructuū semina: & in cucumere, cucurbita, pepone, melopepone fructib⁹, semina insunt plurima & cōspicua. In ceraso, pruno, mespilo, vtroq; corno, dactylo, myxis, seriphis. granatis, oliuis fructibus, quod ligno includitur semen est, vt fructus, seminū sit munimentum quoddam & propugnaculum. Quoniā plantarum sit permultarum finis semen procreare, in quo spes maxima est speciei suæ propagandæ, & quoad eius fieri licet, perpetuandæ. Ob id magna id cura est à natura munitum, & loco penitiorē tanquàm tutiorē repositū, ac non sola fructuum carne munitum, sed sæpe ligno, vel osse, sæpe cartilagine, sæpe callo quodam duriorē aduersus cœli & animalium iniurias. vel potiùs sit fructus, quod ex semine & reliquo. constat, vt in leguminibus siliqua inuolutis. filiqua cum semine est fructus, plurima eorum substantiæ pars est in seminibus. Est tamen vbi tenui discrimine distant semina à fructibus, vt segetes & legumina, Galeno scripta toto lib. 1. alimentorum.

Præterà nuces regiæ, nuces Ponticæ seu auellanæ, pistacia. Quin persæpe Dioscoridi & Galeno *καρπὸς*, id est, fructus, *ἀντὶ τοῦ σπέρματος* scribitur. Semen althææ, apij, agni, anethi, asparagi, dauci, fœniculi, genistæ, hyoscyami, lauri, plantaginis, portulacæ, nymphææ, rosarum, & aliorum non paucorum in radicibus, aut herbis, aut floribus cognominibus, dictum est: quam rem index apertissimè demonstrat. Legenda autem semina, cū sunt matura, & fructus quibus includuntur, sunt maturi. Semina verò quotannis mutare præstiterit, etiam si pleraque diutius seruari possint.

Dioscor. &
Gal lib. 6.
simp. & lib. 7.
cap. ph. p.

A Momum calfacit, validè siccatur, astringit, coquit magis quàm acorum, siccatur minùs, cætera facultatem habet eandem. Odoris conciliandi gratia medicamentis etiam principalibus miscetur, vt in componendi ratione audies. Delige candi

candidum vel fuluum, simplici tamen colore non vario, laxius in vua parua seminis tamen plena diffusum, non astrictius cohærens, odoratum, nares vulnerans, acre, mordax, recens, non cariosum. Amomi vua sæpe Galeno & Actuário ob id dicitur, quòd racematim velut in vua cohæreat. Laudatur amomum Scythicum, lib. 8. comp. ph. part. Non esse verò rosam Hiericuntis, aut Hierosolymitanam vulgò dictam aperte conuincit vtriusque historia. Hodie passim desideratur, nam quod ostendunt officinæ, inodorum est: habeo apud me fuluum, paruum, oblongum, angulosum, odoris dum fricatur iucundissimi.

Ameos semen calidum siccum in fine ordinis tertij, tenuiū partium, album, subamarum, acre, digerit, vrinam mouet. Ami commendatur Illyricum, lib. 9. comp. ph. part. alij Aegyptium laudant. *Lib. 6. simp.*

Anisi semen calidum siccum ordine tertio, vrentibus proximis, acre, subamarum, vrinas ciet, flatu ventris dissipat, digerit: addit Dioscorides venenis resistere. Inter prima laudatur Creticum: melius recens & plenum. Eius loco & penuria Anisum dulce vsurpamus, quod *γλυκύνισον* Actuarius sæpe appellat. Ita sentire malo, quàm cum nonnullis Anisum vulgare Græcorum Anethum initio tertij gradus calidum, siccum primo affirmare. Anethum verò vulgare calidius siccus, Anisum Græcorum calidum siccum tertio gradu. Nam vero veterum aniso (vt dixi) caremus. quod semen paruum apij semini simile, sed maius Dioscorides scribit: Anetho autem semen latum & foliatum Ruellius tribuit: ex quo scripto re nescio, nisi fortè anethum nostrum pinxit nó descriptum veteribus. *Lib. 6. simp.*

Acantha leuce Dioscoridis & Galeni, est Bedegar Serapionis, vt descriptiones & vires conferenti sole clarius euadet: astringit enim, & siccatur minùs quàm spina Aegyptia seu Arabica amborum, quæ Sucaha est Serapionis, fructu & radice utilis: cum nostra Acantha leuce, eadem, nisi quòd ob soli & cœli naturam est inefficacior.

Bombacis semen simplex cerasi nucleo simile, recentiores ad vitia pectoris purganda adhibent. Melita insula mittit multiplex, sibi implexum, nigrum.

Βασιλικον καρπός, id est, Basilici semen, cardiacum Actuario est: in usu etiam interdum apud Gal. in comp. ph. part. inuenitur.

Gal. li. 8. simp. **C**ucumeris esculenti semen magis incidit, terget, tenuis est substantiæ (præsertim arefactum, contritum, cribratum) quàm ipsa eius caro frigida humida ordine secundo, cum semen ipsum siccet ordine primo, aut etiã secundo incipiente. Ob hæc urinas mouent, & corpus ῥύματ' & vice tergent, & splendidum reddunt. Addit Dioscorides vesicæ exulcerationibus subuenire. Urinas magis mouent Pepones quàm Melopepones & Cucumeres, & Cucurbitæ, quod substantia sunt magis humida, aquosa, & tenui, & quæ in ventriculo facilius corrumpatur, & quæ vim quandam abstergerendi habeat, ob quam expeditius quoque deorsum quàm prædicta ferantur. Sordidam cutim, ἰφελίον, lentes in facie, ἀλφειὺς extimos & superficiarios detergent, semine potentius quàm carne, ut etiam renum calculis conueniat. Nulla verò seminis cucurbitæ Dioscoridi & Galeno in simplicibus est mentio, quum tamen hodie solenni quodam more vulgus medicorum in componendis suis medicamentis omnia hæc maritent, scribentes passim quatuor semina frigida maiora, ut distinguant à frigidis quatuor minoribus, lactucæ, portulacæ, intybi, fereos, id est, endiuizæ, scariolæ. Inter illa verò citreoli semen non melopeponis numerant.

Gal. li. 7. simp. Cari semen calidum siccum ordine tertio, mediocriter acre, urinas mouet, flatum discutit: planta etiam reliqua ad hoc utilis à Caria regiõe laudatissimum afferebatur: vnde illi nomen multiplex, Carum, Carion, Careon, Caroon.

Coriandrum essentia amaræ habet plurimum, parum humiditatis aqueæ tepentis, pauxillum astrictionis, à qua refrigerat, ut ab amarore calfacit, terget, digerit, tenuium est partium, lumbricos necat: sed largius sumptum mentem mouet non sine periculo, ob id aceto maceramus, post siccamus.

Cresson alenoy vulgò.
Lib. 7. simp. Cardamum, id est, nasturtium, semine & folio siccum est caustico & adurente, ut sinapi, phænigum, hoc est, rubrificationem in coxendicis aut capitis dolore excitat, eclegmatis mistum astmaticos crassis & lentis pulmonum excrementis valenter purgat ut sinapi.

Carda

Cardamomum Serapionis vtrunque tam maius, quod Granum paradisi vocatum putant plerique, quàm minus, nihil habet commune cum vero, id est, Dioscoridis & Galeni Cardamomo, etiam hodie desiderato. Cardamomum absolute & Cardamomum nigrum, lib. 9. comp. ph. part. & 1. antid. & in *Lib. 1. antid.* theriaca ad Pisonem.

Cnici semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam, vt *Carthamus*
cap. 5. lib. 2. simpl. docet Galenus, & lib. 5. fanit. tuendæ: quod *Gaxe cum*
in diacnico compositione postea plenius leges. Nihil tamen *vulgo.*
aut minimum harum virium in consueto nobis semine Cni-
ci expertus, fortè quòd à regionibus calidioribus non sit alla-
tum, sed in agro Parisiensi natum.

Cumini femen vtile magis, calfacit ordine tertio, ficut, *Gal.li.7.fimp.*
 astringere addit Dioscorides, vrinam mouet, flatum extin-
 guit: fatium est ac syluestre, idq; duplex Dioscoridi: lau-
 datur Aethiopicum, deinde Aegyptium.

Coccus baphica, vel coccum baphicum, id est, granum tinctorū, baccula est asparagi æmula, foliis innata fruticis aquifoliæ ilicis, Theo. Plin. astringens, amara, siccatur sine morfu: ob id ad vulnera magna etiam neruorum congruit, roborat partes siue his qualitatibus manifestis, siue etiam (ut quibusdam placet) totius substantiæ familiaritate, quam dicunt habere cum corde præcipuam: de hoc in antid. *Διὰ τὸν κόκκον βαφικόν.*

ERuca foliis & semine calida, flatuofa, ob hæc venerem
largiore vsu excitat, in condimenta venit, vrinas mouet.
Syluestris fatiua est acrior. hac synapis vice vititur Iberia oc-
cidentalıs, Dioscor.

Eruum calidū primo ordine, siccū secūdo, amarū proinde, *Orobus cum*
incidit, terget, obstructions liberat, largo vsu sanguinem per *Græcis, lib. 8.*
vrinas euocat, præsertim rufum. Nam Eruum non candidum *simpl.*
sed rufum vehemēter amarū est, candidū dulcius, lib. 1. antid.

Erysimi semen sapore nasturtii, calore igneo, vel aqua maceratū, vel linteolo & crusta pistoria inuolutum & tostum, ac eclegmatis mistum, crassa & lenta ex pulmone valenter promouet: id enim sic torrefactū terget, lib. 7. comp. phar. part. Lib. 6. simpl.

Foenumgræcum siccum primo gradu, calidum secundo,
lib. 8. simpl. calidum autem mediocriter, & ob id digere-
re dic

re dicitur, lib. 1. comp. pharm. part. Nati is gradus est medius inter summum & omnino temperatum, quod nec calidum absolute, nec frigidum iure dixeris: phlegmonas arden-tes irritat & exacerbat, minus calidas & duras digerendo sanat.

Ligusticum à Ligusticis alpibus, in quibus frequens nascitur, Galeno & Actu-ario vnius literæ mutatione Liby-
sticum. hodie rarum, semine solo visum Manardo, radix impe-
ratoria vocatur Leoniceo & Musæ. Hoc autem accipien-
dum in compositionibus Arabum pro Keîsin seu leuistico, apertè docet dia trion pipereon & dia calaminthes, à Nico-
lao & Mesue ex Galeno paucis admodum mutatis descripta. In quibus & aliis non paucis Arabū descriptionibus, vt dia-
cymino, diamoscho, Liby-
sticum reposuit Actuarius: vulga-
tum autem Leuisticum aut Smyr-
nium est cum Ruellio, aut
apii vel dauci genus: cum Ma-
nardo Smyr-
nium, putante pe-
tro-
solinum Alexandrinum vel Macedonicum.

Lib. 7. simpl.

Λίνιστον σπέρμα, id est, lini semen, humido & sicco quodam-
modo temperatum, calidum autem quodammodo ordine pri-
mo: flatuosum est etiam si frigatur, adeò plenum est humi-
ditate recrementitia. Quia igitur calidum humidum flatuo-
sum, semen homini generat. Lini semen torrefactum terget,
vt prissana & farina fabarum, lib. 7. comp. ph. part. Lini se-
men vires habet fœnigræci, discutit, & emollit omnē inflam-
mationem, Dioscor. Erui semen admodum digerit, & lini se-
men moderatius. Lini semen tepidè calidum, vt chamæme-
lum. Lini semen in aqua coctum refrigerantem succum gi-
gnit. Linospermon & succus rosarū frigidioris media tem-
perie sunt naturæ, sed non ita multo, quin potius caloris sunt
tepidi. Lini semen refrigerat, siccatur. Linospermon tan-
quàm frigidissimum vitandum asthmaticis censet Galenus,
vt meconium, mandragoram, hyoscyamum, cicutam, psyl-
lium. Linospermon urinas exigue mouet: frixum autem
vreticum magis fit, & aluum magis sistit esu.

Linospermon, quia semē duritie est lapidea, vel quia cum
vino potum calculos frangit Dioscor.

Lupinus est satius, idemq; vel dulcis, vel amarus: agrestis
verò minor sed amarior, & ad omnia valentior domestico,
terget, tenuat, incidit, digerit, siccatur sine morsu: vitiligines,
psoras,

Lib. 6. c. ph. p.

Li. 11. method.

Lib. 6. sanitat. tuen.

Li. 3. simp. c. 9.

Li. 4. rat. vult. in morbis acutis.

pforas,achoras, vlcera cacoëthæ sanat, lumbricos necat sumptus & admotus,iecur & lienem purgat, phymata, chæradas liuida ex aceto, vel posca, vel oxymelite pro ægri natura & affectus varietate costus digerit.

Lens calido frigido tēperata,sicca secundo gradu, valenter *Lib.8.simp. &* astringit,ob id ventrē sistit, abiecta priore aqua aluū mouēte. *lib.1.aliment.*

MElanthium est Gith, quamuis flore sit ex cæruleo albicante, semine nunc nigro nunc rufo, calidum siccū tertio gradu, tenuium partium, amarum: assiduo olfactu catarrhos sanat, orthopnœan iuuat, lumbricos necat, lepras terget, menses ob crassitiem & lentorē retentos mouet. Quæ verò in fegetibus altius adolescit, Nigella vulgò dicta, inodora, pseudomelanthium, & Githago vocari possit, Herimolaus.

Nigella Gaxe.

Nigella Romana vulgo.

OCymum calidum secundo ordine, excrementitia humiditate, ob quam non sumendum, sed foris illitum coquit & digerit. Ocymum calfacit, tenuat, non tamen valenter, *Lib.8.simpl.* lib.2.comp.ph.part. Ocymi semen Actuar.vsurpat.

PSyllium dictum quòd semen habeat effigie pulicis, humido sicco temperatum, frigidum ordine secundo: ne putes cum Arabibus corticem frigidum gradu quarto, medullam gradu quarto calidam. *Dioscor. Gal.*

Papaueris genera sex Dioscoridi & Galeno. Satiuum calice grandi, flore & semine albo, minus frigidum, ob id esculentum, & mediocriter somniferum. Syluestre, flore ad medium nigricante, calice minore, semine nigro, admodum frigidum. Tertium etiam syluestre procerius, squalidius, calice longiore, omnium frigidissimum, proinde stupefacit: amborum scapo sub capite conuulnato succus defluit lacteus, opium dictus: Meconium verò succus ex his expressus crudis. Horum frigiditate aliorū vehementem calorem obtundunt Medici in suis compositionibus. Quartum papauer Rhœas, Quintum Corniculatum, Sextum Herculeum, *κωμαῖ μίνων* & vsurpantur Actuário.

SEsili radice & fructu, id est semine, valde calet, ac resanuum est partium, quare urinā mouet, epilepsię & orthopn

Siler vulgò cū Virgilio.

d 2 thopn

thopnææ confert: laudatur Mafsilienfē. Eſt alterum etiam Aethiopicum, & tertium Creticum Dioſcoridi.

Staphis agria ſemine velut in vuam coaſto (vnde illi nomen) vehementer acri & vrente, quod manſum pituitam in os ex capite plurimam detrahit, & illitum ex oleo capiti puerorum pediculos enecat: vnde Pituitaria & Pedicularis quodque herba dicitur.

lib. 8. ſimpl. Sinapi calfacit, ſiccatur ordine quarto. Sinapi Alexandrinum laudatur, lib. 9. comp. pharm. part.

lib. 1. antid. **T** Hlaſpi duplex, Cappadocicum, nigrius, non exactè rotundum, ſed quadam ſui parte velut *ὀρθλασμά* habet, id eſt, infraſtum, exiguum, vnde illi nomē, multò maius & præſtantius quàm ſecundum. quod etiam in Cappadocia & Creta, & vbique naſcitur *ὠχροξάνθου*, id eſt, ex pallido flauum, rotundum, admodum exiguum. Creticum tamen plerique immiſcent theriacæ.

V Rticæ fructus, id eſt ſemē & folia præcipuè vtilia ſunt, non vehementer calfaciunt, tenuium ſunt partium, digerunt, phymata & parotidas, craſſis & lentis humoribus pulmones purgant.

DE FRUCTIBVS.



F R V C T V S eſt ea plantæ pars, quæ carne conſtat & ſemine: ſæpe etiam pro ſemine ipſo ſumitur, vt libro ſexto ſimplicium fructus vrticæ: lib. 8. ſimpl. fructus ſefeleos, fructus hyperici, fructus ſcillæ, periclymeni fructus & eiufdem ſemen, lib. 9. comp. ph. part. & alibi perſæpe. *καρπὸς τοῦ ἑρμύκου*, Solani bacca Actuatio.

Lib. 8. c. ph. p.
& lib. 6. ſimp.

A Mygdala amara incidunt, tenuant, tergent, digerunt ſine morſu: ob id ex pulmone excreationem craſſorum & lentorū promouent, obſtruſtum hepar, lienem, renem, colum à craſſis & lentis humoribus expediūt. Amygdala dulcia ſunt moderatè calida, leuiculam tamen amaritudinē habent, ſed à dulcedine occultatā, quæ tamen tēporis ſpacio fit manifeſta.

Anacard

Anacardus, vel cum Aſtuario Anacardion, à cordis figura & colore dictum videtur, calidum ſiccum quarto gradu Meſuæ, veteribus Græcis indiſtū, affectus cerebri & neruorum frigidos humidos mirè iuuat, admotum cutim vlcera, verrucas tollit. In India, Sicilia, Apulia frequens.

Bαλανο μυρεψική, id eſt, glans vnguētaria, Myrobalanus *Lib. 6. ſimpl.*
 ſequoq; Plinio dicta, ex Barbarica regione allata, Ben Arabibus dicta, hodie frequens, ſtomacho aduerſatur, cum hydromelite pota carnis huius drachma vna eſt vomitoria: cum oxycrato autem iecur & lienem purgat, cum aceto item (quo maximè gaudet ad agendum) lepras, pſoras, lentes, virilignes, pruritus extergit, lienī & hepatis indurato illinitur cum farina aliqua ſiccante, vt erui, lolii: lienī etiam prodeſſe ſcribit Gal. in theriaca ad Piſonem. Carnis huius ſucco facultate calido vtuntur aromatarii: id enim inodorum cū ſit, omnibus ſuſcipiendis odoribus eſt aptiſſimum, vt inſipidum ſaporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum Balaninum Dioſcoridi dicitur. Oleo expreſſo quod reliquum eſt magma terreum & amarum, incidit, terget, contrahit, ſtipat, ad prædicta etiam effica, ſed minus. Id autem videtur eſſe μυροβαλάνου πώμα, id eſt expreſſum, quod cataplaſmatis miſcet Galenus, lib. 11. & lib. 13. meth. & bis. lib. 9. comp. ph. part. ſplenici remediis, & ad ſcirrhos lienis affectus adhiberi ſcribit Gal. Quo in loco μυροβαλάνου tantum, aliquando μυροβαλάνου ſαρλίδς, aliquando βαλάνου μυρεψικής leges, aliquando μυροβαλάνου ἄλυστον, id eſt farina & puluis, & μυροβαλάνου λήπυρα, id eſt putamen & cortex, & μυροβαλάνου λήπυρα κελιμμένα καὶ σιτισμένα, id eſt, Myrobalani teſtæ & cortices inciſi & ruſi cribratiq; Omnia hæc ad ſplenicos ſcribuntur, vt ſit credibile maximè de fructu eodem, ſcilicet Balano myreſica, & eius partibus, omnia hæc intelligi. Quam verò myrobalanum Arabicam intelligat Dioſcorides, cui ſimilem facit fructum palmæ Aegyptiæ, de qua nunc dicam, planè ignoro. Nam Arabum recentiorum Myrobalani quinque generibus diſtinctæ veteribus indiſtæ putantur, & prunorū generi potius, quàm Balanorum, id eſt glandium, aſſignandæ ſunt. Sunt verò hæc: Lutea ſeu citrina refrigerans, cholagoga. Inda & nigra, melancholiam purgat, & exhilarat. Cepula phlegma-
 d 3 goga,

Lib. 10. meth.
Dioscor.

goga, visum illustrat, coctionem iuuat, pectus purgat, hydro-
pici confert. Empelitica (quæ Astuario ἀμπελινίξ & ἰμβρίξ
quoque dici videtur) etiam phlegmagoga, ventriculum pur-
gat & roborat, appetentiam reuocat, vomitum sistit. Belet-
zica empyos iuuat, hæmorrhoides & capilli defluuium. De
his plura leges in Arabibus. Ignorata quoque videtur ho-
die χυσοβαλάνθ, digerens & roborans, vt spica nardi, & ad
colicos affectus, & stomachi ardores & singultus adhiberi
scripta Gal. lib. 8. & lib. 9. comp. ph. part. Epithema ex pin-
guibus palmulis, quas παλίττις vocant, salubriter viscera re-
frigerat, si harum caro omni membranoso exempto coqua-
tur cum aceto solo claro, vel etiam aqua adiecta donec tene-
rescat, & tusa applicetur. φοίνιξ in Aegypto nascitur, viridi
colore, odore mali cotonei, medio maturitatis vigore per au-
tumnnum decerpi solet, Arabici Myrobalani similis, sine osse,
quam Myrobalanum quoque vocari Hermolaus affirmat.
πωμάα autem & ἀδύσθ etiam Dioscoridi vocatur, quod ex
hoc fructu palmæ Aegyptiæ humidior, acerbo, astringente
expresso, potus fit sitim sedans Solino autore, qualis nobis ex
pomis, pyris, sorbis. Hic autem fructus si vsque ad maturita-
tem in arbore finatur, solibus nigricat, & φοινιδοβάλανθ vo-
catur. φοίνις ἢ φοινιδοβάλανοι, vel quomodo aliter vocare li-
bet, moderatè stringunt, acerbo sapore: φοινιδοβάλανων ἂν
σαρκὸς, & in colice Scribonii ibidem. Caro φοίνις στυγίαν
in arteriace Andromachi 12. & caro φοινιδοβάλανων in 15. φοι-
νίλων βάλανων proprietatem quandam habent capitis dolo-
rem excitandi: easdem tamen dat ibidem in cephalalgia: sed
addit, si sint consuetæ & accipienti iucundæ. Adhæc bilem
pellunt deorsum, vt absinthium, & refrigerant. φοίνις θη-
βαίνοι à Thebis Aegypti opinor, & paulò post, φοίνις πά-
τηροι celebrantur, φοίνις πάτηροι μέγιστοι bis lib. 9. comp. ph.
part. & paulò antè, φοινίλων κάρυον: πάτηροι autem vocan-
tur, quod id genus tertium palmularum cariotarum præhu-
midum in parente rumpat se præ humore, calcato simile red-
ditum. φοίνιξ verò palmæ ipsius fructus, præfertim dulcis,
non paucam obtinet caliditatem: tamen desiceat, roborat, con-
trahit, stipat, densat, sumptus & admotus. Hic autem fructus à
palmæ Aegyptiæ fructu ex osse differt: nam hic os habet ma-
gnum & longum & durissimum, in quo semen id os vstum
& tritum

& tritum valenter digerit, lib. 6. c. ph.p. Daſtylus à digito-
rum forma dicitur. *ὀξυφαινίξ* verò dictus Aët. & aliis qui-
buſdam Græcis recentioribus ab acido ſapore, palmæ ſyl-
ueſtris fructus, Tamar Indus, id eſt, Daſtylus Indus Barbaris
vocatus: quāuis cholagogus ſit cōprimendo, vt palmæ Aegy-
ptiæ fructus Phœnicobalanus, tamen os habet quod ſatum
arborem nobis produxit, aliis multis conueniunt & diſfe-
runt, vt mox audies: ſed Oxypheenix veteribus indiſtus, cūm
Phœnicobalanus in his frequens ſit. Oxypheenix ſubniger,
lucidus, tener, villis tanquā radicebus miſtus, recens, pin-
guis, acido ſapore. Quibus notis apparet, quantum conue-
niat cum Phœnicobalano, & quantum diſcrepet: adhæc oſſe
vt diximus, & uſu hic recentiorum tantum, ille etiam vete-
rum. Si frigidus eſt ventriculus oxypheenici, debet miſce-
ri maſtiche vel macis vel ſpica nardi. Rarò per ſe datur, pi-
crocholis ſaluberrimum ad vncias quatuor dari poteſt: an-
nis 10. ſeruatur. *Μοχρονάξου*, vel *μοχρονάξουδιον*, vel *κάρνον* *Νυξ moſchata*
μυρσινὸν Græcis recentioribus, vt Aët. dicitur. *κάρνον ἀρωματὶνὸν* *vulgo, etiam ſe*
Aëtio, veteribus ignotum. Probatuſ hæc nux recens, gra- *moſchuū non*
uis, præpinguis, & quæ acu vulnerata mox humorem red- *oleat.*
dat oleaginum. Reliqua huius hiſtoria tam graphicè pingi-
tur Ruellio medicorum huius ætatis doctiſſimo, vt poſteri-
tatem lateri e non poſſit, vti neque nux Indica oleo prægnans,
ſemen argente, & venerem ſtimulante, vt ait Auicennas, ve-
teribus quoq; incognita, ſuis coloribus ab eodem belliſſimè
abſoluta: & nux vomica, quia vomitum citat, & ſtupefacit, ca-
nes ac ceruos eſu mox necat: cæteras aues, & piſces ſtupefa-
cit, vt manu capi poſſint ſopiti.

Cœni Atticis vocati olim fructus, Coccali verò & Strobili *Nux pinea lib.*
li à quibuſdam nunc dicti, virideſtori ſunt ſub amari & *7.c.ph.p.*
ſubacres, emplatiſti ſunt, & tergent, purulentam & craſſam *Lib.7 ſimp. &*
lentamq; expuitionem promouent. Nucleus autem eius eſcu *lib.2. aliment.*
lentus, nutrimentum eſt coctu difficile, validum: aqua mace- *Gal.lib.7 ſim-*
ratus acrimoniam exuit, aſperitatemq; lenit, & calido frigi- *plic.*
doq; temperatus euadit. In ſua nuce pinea ſeruantur.

Cypreſſi pilulæ quæ etiam Cœni quibuſdā dicuntur, vnde
Coniferæ cypariſſi, Virgil. ſiccant valenter ſine inſigni ca-
lore aut acrimonia: ob id hæ molles & recētes vlcera magna

in duris corporibus glutinant, enterocelas iuuant.

Cydonia Græcis, Cotonea Catoni, mala omnib⁹ nota. Quo in genere quædam sunt rotundiora, minora, acerbiora, quæ mascula vocamus: vt alia fœminea longiora, maiora, dulciora, minùs acerba, quæ Struthia cū Asiaticis suis Galenus vocat, lib. 6. saniti. tuendæ: & *ὑπονιδιωνία*. lib. 2. alimentorum. ex hisque vel aliis diacydonion componit, ibidem.

Citrum, vel malum citreum, seu citrium, seu medicum & aureum, succo acido (qui frigidus sicco ordine tertio, ex pane admotus phlegmonas internas cohibet) semine amaro, cortice odoro, medicis in vsu est aduersus internas & pestilentes putredines, venena, & partium principum & stomachi imbecillitatem. Nam & roborat, tamen ægrè is coquitur. Inter citrea mala Aranciū numeratur Hermolao, cortice, succo, semine illis proximum, vt & quod Limonem vulgus Gallorum appellat, succo, frigidiore quàm citrum: & quod ex infusione pomum citreum vulgò dicimus Pomcire.

*Diosc. & Gal.
lib. 7. simp.*

Colocynthe, id est, Cucurbita fatiua, frigida humida ordine secundo, vt cucumer fatiuus, ad phlegmonas & sitim vterque efficax. Colocynthidis verò fructus in pilæ mediocris specie conglomeratus vehemèter amarus, validè purgatorius, præsertim sua medulla, cuius oboli 4. bilè & pituitam etià crassam detrahunt: balanis etiam & clysteribus sedi immittitur, stomacho tamen admodum aduersa est: ob id sola non vten- da, quod docet hiera dia colocynthidos: legenda cùm coeperit in pallidum colorem permutari. De hac Mesues multò plura scribit, quæ tanquàm parum momentanea neglexi.

Cucumeris agrestis quàm fatiui fructus multò est minor, oblongis glandibus similis, cuius succo elaterium qua ratione fiat, docet Diosc. amarus est, bilem pituitamque purgat, præsertim hydropicis citra stomachi iniuriam, radice alba, magna, & præsertim eius cortice & foliis etià utilis est, sed inefficacius vtrunque, ciet menses, emollit, terget, digerit, purgat, quàm elaterium: summè amarum, tenuium partium, leuiter, vt ad secundum ordinem, calidum.

Diosc.

Carpobalsamum, id est, fructus Balsami, flauum sit, plenū, grande, graue, mordax gustu, & fernens in ore, modicè opobalsamum redolens. Adulteratur semine hyperico simili, quod Petra Palæstinæ oppido affertur: sed id Carpobalsamo maius,

maius, inane, viribus ignauum, sapore piperis. Carpobalsamum tamen adulterari non potest, lib. 1. antid. Galen. Balsamo planta secundo excessu calida sicca, tenuium partium: et Carpobalsamo, & Xylobalsamo liquor est tenuior, minùs tamen calidus quàm quidam existimant, tenuitate partium decepti. Sæpe enim expertus sum non iuuisse dispositionē calfactione egentem. Opobalsamo igitur (quod & βαλοσμέλαιον Gal. lib. 1. c. ph. p. Diosc. vocari dicit Simeon) recenti, validi odoris, subruffo, albo, vel viridi (nigrum autem pessimum est) syncero, dilui facili, læui, astringenti, nō acido, linguam modicè mordenti, est præcipua inter has plantæ huius partes autoritas, & vis efficacissima. Laudatissimum autem est Syriacum siue Iudaicum, siue ex Syria Palæstina, ac præcipuè Sigadinum, è loco Palæstinae, in quo copiosissimum & optimum gignitur. Opobalsamum sit Syriacum, tenue, perspicuū, substantia non crassum, quale in fundum vasis subsidere solet, quale item sit vetustate. Opobalsamum variis adulteratur modis, vt ægrè possit etiam ab exercitatissimis cognosci, vt in adulteriis docemus: alias veri Opobalsami notas ex Dioscoride requiras: hodie propemodum desiit videri. Xylobalsamum autem furculus est recens, sarmēto tenui, fuluus, odoratus, Opobalsamum nonnihil spirans.

Cassia fistula Arabum veteribus Græcis indicta, recentioribus Cassia syringodes, id est, fistulacea, & nigra Actuario, scribenti passim κασίαις μελάινις τὸ ἐν τὸς, à quo bellè describitur. Ex India, Syria, Aegypto affertur: optima est collucens, grauis, plenior, & quæ concussa clausis intus granis non strepit, atramento intus seu pulpa pingui, splendente, succulento, non situlento, nec putri: calida humida primo gradu: vacuat omnes humores leniendo pueris & prægnantibus à drach. sex ad vnciam vnam & dimidiam. Si verò alius fluit, mastiche aut myrobalanis afsis corrigitur. Cassia autem Græcorum quæ sit, post leges in Cinnamomo inter cortices.

Cubebæ non sunt cum Serapione & aliis quibusdam neotericis, Galeni καρπύσια, nec Dioscoridis oxymyrlines seu myrti syluestris fructus (nam is Carpesiorum non meminit) vt Cubebas cum prædictis conferenti patet. Hæ enim sunt fructus tenues piper æmulantes, sed minùs acres & subamaræ. Galeni verò καρπύσια sunt κάρφην, id est, festucæ tenues,

Lib. 6. simp.

Gal. lib. 1.

c. ph. p.

Diosc.

Lib. 1. antidot.

Lib. 4. c. ph. p.

Diosc.

Lib. 1. anti. &

in theriaca ad

Pisonem.

Lib. 7. simp.

ἀκρίμοσι, id est, furculis cinnamomi, similes odore vocati *φοῶς*, sed valentiore, & nonnihil aromatico, quem & gustatus deprehendit, facultate etiam Phu similia: sed quia sunt tenuiora, viscerum obstructions potentius detergent, & urinam mouent, & renum calculos expurgant. Non adeò tamen sunt tenuium partium, ut cinnamomi loco usurpari possint, cum Quinto: cum multò sint deteriora optima Cassia. In Side Pamphilæ loco, quia luxuriat, carpesium ibi est vilissimum. Actuarius tamen *κομβίβας* vel *κομπίβας*, etiam *καρχήσια* vel *καρχήσια* vocari scribit.

Libr. 3. c. ph. p.
& lib. 8. simpl.

Ficus recens præhumida modicè calida, digerit, nō potest coquere: Ficus verò arida seu passa, id est carica calida in fine primi gradus, vel initio secundi, partium tenuiū, digerit, tenuat, coquit, pinguior magis coquit, acrior potētius terget, & digerit: *σῦκα λυκὰ* ficus candidæ, interdū pingues Actuar.

Galla est fructus roboris, & cæterarum glandiferarū arborū. ea vel est omphacitis, id est, immatura, parua, nodosa, grauis, solida, non perforata, cæteris præstantior & maiore vi in medicina: ob id ea, sed magnitudine mediocri, deligitur. Heræ. lib. 6. comp. ph. part. Altera est magna, rotundissima, læuis, leuis, laxa, perforata, flaua. Vtraque refrigerat ordine secundo, siccat tertio, crassæ est essentiæ, astringit.

Lib. 6. simpl.

Iuniperi fructus calidus ordine tertio, ficcus primo: sed folia calida sicca gradu tertio.

Iuiubæ, Zizipha Græcis, Zinzipha etiā Actuario, fructus Myxariis affinis facultate: nam calidus humidus primo gradu, etiam pulmonarius: est duplex, sericum, id est, rufum, nobis frequens: & candidum, adhuc ignotum. Ad fluxiones calidas, acres, tenues, in pectus salubre: ut alimentum verò à Galeno damnatur lib. 2. alimentorum. Quem locum Auicennas, Sauonarola citant in suis Iuiubis.

Diosc. & Gal.
lib. 8. simpl.

Lib. 6. c. ph. p.

Malum granatum seu punicum triplex, dulce, acidum, acidodulce scilicet succo, saporis naturam viribus refert: omnium tamen flos, cortex, nucleus astringit, sed acidi & acerbi magis, dulcis multò minus: medii horū mediocriter.

malic

malicorium, id est, cortex nondum adutorum sed perfectio-
ni propinquorum est melior ad astringendum in ore affectus
ex fluxione nascentes.

Myxæ, & myxa, & Myxaria Actuario & Græcis quibus-
dam aliis recentioribus, ἀπὸ τῆς μύξης, id est, à mucco lento è
naribus fluente: cùm simili hi fructus abundant, bilem detru-
dere, & sitim sedare dicuntur, humida primo gradu, calido
frigido temperata.

Myrti vtriusq; germina, folia, bacca, succus constant sub-
stantia calida, tenui, & contraria illi frigida, terrea, astringen-
te, magis sylvestris quàm fatiua. Bacca Catoni Myrta, Murta
Varroni, Myrtili vulgò, Myrtus alba & nigra passim dicitur
Galeno in comp. ph. part.

Myricæ fructus generosissimè astringit: lib. 6. comp. ph. p.

Morum album Græcis veteribus indictum videtur & La-
tinis præterquàm Quidio, fortè quia per insitionem in po-
pulo alba gignitur: nigrum cantatissimum, & arbor cuius fo-
liis bombices pasti sericum nent pulchrius & splendidius,
Mori tamen albæ folium ad hos alendos est mollius, eoq; ho-
die tota Italia vititur. Sycomorum seu ficum Aegyptiam
non habet Italia, Musæ.

Kάρον βασιλικόν, id est, Juglans seu Nux regia, nucleo est
tenuium partium vbi inaruit, siccante etiam sine mor-
fu, ex quo inueterato oleum valenter digerit. Lib. 7. simpl.

Λαττονάρον, id est, nux tenuis, Pontica, Prænestina, Auella-
na, à locis vbi luxuriat Ponto, Præneste, Auellis dicitur. plus
habet terreæ & frigida substantiæ, ob id austerior. Ibidem.

Nuces teneræ, rancidæ, vstæ, cinere digerunt & astringunt, libro sexto part.

Nux Indica Actuario in diasatyrio & diaromato.

Oliuæ halmades, quæ in muria sua seruantur, & in ea vel
oleo suo quasi urinabundæ innatant, Colymbades ob id
dictæ, plurimum astringunt & digerunt: sunt tamen mitissi-
mum ad aphthas remedium. lib. 6. comp. ph. part.

Oxyacanthæ vel Oxyacanthi racemosæ bacculae dū matu-
ruerunt rubentes, astringunt, vis eadem foliis sed languidior:
Radix infixæ corpori spicula extrahit, trita & admota Diosc.

Piper

*Lib. 8. simp.**Lib. 2. antid.*

Piperis fructus inter initia ceu filiqua coryli nucamento similis, longū piper est: humidius, ob id citò perforatur, vt zingiber, & tardè, sed diu linguam mordet, vt arus. Hæc filiqua postea in grana milij æmula racematim degenerat, quæ aucta & siccata sed adhuc tanquàm omphacodea & imatura Piper album fiunt, nigro *Ἀγυρίνον*, id est, acrius: nam nigrum iam superassatum sole & superficcatum est, tamen vtrunque valenter calfacit & siccatur, & maximè digerit. Idem in agreste rufum cœli & soli iniquitate degenerauit.

*Lib. 1. ant. &
lib. 4. sanit.
tuendæ.*

Piper longum adulteratum seculo Galeni erat duplex, afferebatur alterum ex Alexandria, alterum erat germen herbæ cuiusdam, quale est nobis coryli aut betulæ nucamentum.

Piper longum nec sit pertusum, nec adulteratum: album sit maximum, plenissimum, graue: itidem & nigrum, neque id sit rugosum. Piper nigrum maius est alio pipere, & corticem habet tenuiorem & minùs rugosum, lib. 1. antid.

Piper album stomacho est accommodatius, & acrius nigro, lib. 9. comp. ph. part. Piper omne coctione sumptum iuuat, sed album supra duo reliqua genera stomachum roborat, lib. 4. sanit. tuendæ, & lib. 9. c. ph. p. Radicibus piperis maximè proceris etiam vitur Andromachus apud Gal. li. 7. comp. ph. part. His vires costo similes tribuit lib. 8. simpliciū.

Piper longum & rotundum bis scribitur lib. 10. comp. ph. part. vt id album & nigrum comprehendat.

Piper *νοινόν*, id est, commune Actuario in antidoto podagrica, diapætonia, & diatrion pipereon, est nigrum: nam longum & album ibidem commemorat.

Lib. 8. simp.

Pistacium fructus strobilo proximus, ex Syria largus affertur, subamarus, odoratus, tenuis essentia, obstruções præfertim iecoris, sed & pulmonis, & thoracis liberat.

*Lib. 5. sanit.
tuendæ.*

Pruna dulcia aluum subducunt, alia pro qualitate saporis nos afficiunt, bilem ex ventre comprimendo vacuant astringentia. Damascenis ad aluum subducendam longè præfert Galenus Hispanica seu Iberica, vulgò hodie Augustana, quia mense Augusto matura leguntur, & Cathalaunica etiam Italis dicta ab hac Hispaniæ regione, in qua luxuriant.

Sumach.

Rhus hic aut hæc est fructus racemosus, cortice acido, astringente, repellente, nunc medicamentarius tantum, olim

olim etiam culinaris, pro sale obsoniis aspergebatur: stomacho valde idoneus: alter verò & coriarius densandis pellibus applicabatur. Ille etiam Syriacus & ruber, lib. 3. & lib. 6. cōp. ph. part. Vterque tamē musto austero incoctus stomachicum est medicamentum optimum, lib. 6. compositi. ph. part. Eius succus omphacij vice est in Gallia Narbonensi, in hortis Guilielmi Pellisserij, Episcopi Montispeffulani longē omnium doctissimi & optimi.

Ibidem.

Ribes Arabibus dictus fructus est racemosus, acidus, acerbus, frigidus siccus secundo gradu, sitim extinguit, vomitum & fluxum alui biliosum sistit, morbillis & variolis (quas vocant) saluber, frutex nobis poteriū rubrum dicitur. Quid sit, frutex an herba, & quæ, ambigit Serapio in suis testimoniis.

Succus ex his expressus cum saccharo cydoniati modo coctus est delicatissimus. Ribes Damascenus Musæ additur foliis rotundis, & magnis viribus iisdem.

Rubi, seu Sentis, Græcè βάρου genera Theophrasto tria sunt: magnus seu rectus, humilis, & medius. Batus magnus seu rectus est Dioscoridis & Galeni κυννοβάτης, fructu oblongo per maturitatem rubente, cytino simili, in quo ceu lanæ flocci arteriam si deuorentur infestant: huic foliis, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Englientier nobis dicta: & rosa frutex omnis, nisi quod ferè gerit folia florum magis multiplicia & maiora, arte opinor adiuta: sed Cynobatos spinis hamatis horridior, rector, & altior assurgit, odore caret, quem Cynosrhoda tota habet præstantissimum: rosa verò frutex flore solo est odorata, nunc albo, nunc rubro, nunc amborum medio (incarnatū vocant) nunc etiam moschato. χαμαιβάτης autem, id est, humilis rubus. Dioscoridi & Galeno absolutè tantum βάρος dicitur, foliis multò maioribus quàm cynosbati, bicoloribus, per nodos ternis, sarmentis longissimis & firmissimis, qua parte terram attingūt, radicem iterum facientibus, flore albo, tenui, racemoso. Cui succedunt Mora grandia, racemosa, multis granis coagmentata, per maturitatem nigerrima, βάρνα Galeno dicta. Medius denique est βάρος ἰσῆος Dioscoridis, longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens, quanquàm & sine spinis inueniatur: frequens est in sylvis, folia habet chamæbati, sed paulò minora, rectus ferè surgit ad duo aut tria cubita, scapo gracili & infirmo, & mini

Li. 3. hist. plāt.

Ronce Gallis,

minimùm spinoso, flore simili, & fructu, sed minore & granis, quinque, sex coagmentato, & per maturitatem nigerri-
mo, sed in cœruleum inclinante ob aërium quoddam tecto-
rium, nigris vuis & prunis, & aliis multis fructibus innasci
solita: astringunt, siccant, refrigerant omnia hæc magis & mi-
nùs. Ad rubum Ideum docti hodie reducant hortensem rubi
recti, brevis, parum spinosi speciem, foliis bicoloribus, fructu
dum maturuit olfactu & gustatu iucundissimo, fragi rubri
(est enim etiam album) æmulo: quem fructum herba trifolia
& bicolor fert acrem, præsertim semine. Flos rosarum
astringit magis quàm ipsæ rosæ, lib. 6. comp. ph. part. & alibi
sæpe. Est autem id crocatum in flore medio, quod Anthera
vulgò dicitur corrupto fortè vocabulo pro ἀνθ' ὁρόδου: cùm
Anthera Galeno sit nomen compositi medicamenti.

Senna Hermolao, Serapioni Sene, folliculis latis sed falca-
tis, & in his semine vtilior purgando humori melancho-
lico, in morbis ab eo p̄deuntibus. Datur pulvis eius ad drach.
vnam, decoctum vel infusum eius à drach. 2. ad drach. quinqs:
multis torminosa est, aliis est clemens pro varia sumentium
natura: tutius tamē est, mastiche vel caryophyllis & alio cor-
rigere: foliis non est inefficax. Non esse autem Dioscoridis
vel Empetrum, vel Delphinium, vel Peplium, vel Alypum,
planè intelliges, si rem cum picturis horum conferas: veteri-
bus enim omnino indicta est planta, amara, subastringens. In-
dica, Aegyptia valentior vncia dimidia, quàm Apula, aut Li-
gustica vncia vna: & recens præstantior quàm inueterata.

Lib. 6. simp.

Vva fatiua vitis coquit, astringit, lauiter digerit: Vuæ
passæ caro tantum astringit, quantum eget hepar affe-
ctum. Habet præterà facultatem coquendi crudos humores,
& euincendi malignos: ægrè corrumpitur, tota substantia fa-
miliaris est hepati, & vsu crebro consueta est: ob id felicissi-
mè miscetur medicamētis hepaticis. *ἡ ἀπὸ τῆς κικαδάρου μίλιας.*
id est, exemptis vinaceis Actuar.

Lib. 8. c. ph. p.

Fructus herbarum, vt mandragoræ, cucurbitæ, vtriusque
cucumeris, peponis, ex herbis, quarum naturam ferè sequun-
tur, noti sunt: tamen pomum mandragoræ calorem quandam
odore

odore testatur: & colocynthidis fructus medulla amarior & purgantior, quàm ipsa planta, vt antè diximus: ἀγγούριον peponibus addit Aëturius.

L I G N A.



GALLOCHVM est lignum quod ex India et *Diosc.*
Arabia defertur, maculatum, odoratum, gustu *Lignum aloës.*
astringens, & subamarum, cute aliquantum ver
ficolor. Halitum mansu commendat, ventri-
culum frigidum iuuat Aët. est enim eustoma-
chū. Pro thure ad suffimenta substituitur Dioscoridi, eiusq;
modo liquefcit, sed tardiùs: aquæ iniectum subsidet, & bullu-
las edit. Arborem huius triplicè scribit Ludouicus Rom.
Patricius in tractu Indico videri, Calampat perfectissimam,
Bochor vilissimā, Iubam mediam. Xylaloë Aëtio & Aëtua-
rio dicitur, id est, lignum aloës, arboris non herbæ. Rhodiis
militibus est frequens in corollis precariis. Quod verò osten-
dunt officinæ, verius est aspalathum acre & austerum, Gal.
lib. 6. simpl. quod aroma apud suos nasci idem Gal. scribit lib.
8. comp. ph. part. & in Syria & Rhodo Dioscorides: graue,
detraçto cortice rubens aut purpurascēs, densum, odoratum,
amarum, astringens: alterum deterius, candidum, lignosum,
inodorum, Diosc.

Bersilium, vel Verzinium, à Verzinia vrbe Indiæ adue-
ctum & dictum, medicis in vsu nondum venit, sed infe-
ctorium tantum est rubenti colore.

GAiacum lignum haud ita pridem inuentum, morbis o-
mnibus ex humore præsertim frigido natis salubre est:
nam acrimonia & amaritudine incidit, tenuat, terget, vacuat.
De huius facultate mira doctissimus Antonij Galli medici
commentarius, his diebus paucis in lucem editus, facit, ne
mihi de hoc pluribus sit agendum: vt interim taceam Hurte-
num, Matthæolum, Massam, & alios quamplurimos, qui ver-
bosissimè vires eius nobis inculcarunt, potissimum in curan-
da lue Hispanica: sed tamen etiam morbis aliis, præsertim
frigidis, conferre tam est hodie persuasum, vt certatim eo
etiam

etiam magnates vti gestiant.

*Lib. 7. simp.
in loto arbore.*

ΛΩΤῆς ῥίνυμα id est, scobs & rasura Loti, ad sanguinis sputum vsurpatur Actuário in Διὰ ἡλίκου: Galeño autem ad muliebre profluuium, dysenteriam, cœliacos affectus. Huius fructus etiam valenter astringit. Alifa vulgò dicitur, & arbor ipsa Aliñer.

*Sandalum.
vulgò.*

SAntalum triplex Actuário Græcorum soli, Arabes vt videri potest, imitato: album pessimum, rubrum bonitate medium, κίτρινον Act. flauum odoratissimū & optimum: frigida omnia gradu tertio, sicca secundo, hepar roborant Act. Ex agro Calicuthi Indiæ emporij aduehunt Lusitani. Quod autem officinæ vsurpant, est calidum, & linguam acrimonia pungit, præcipuè citrinum: vt cedri vel alterius aromaticæ & calidæ arboris lignū iure optimo censeri debeat: nec vtendum nisi medicus iusserit.

Lib. 9. c. ph. p.

Lib. 7. metho.

Xylobalsamum in carpobalsamo dictum est. Xylocinamomum in cinnamomo dicitur mox, & Xylocasia Actuário in casia. Aromatica verò medicamenta sunt nardus Indica & Gallica, σχίνου ἄνθος. casia, amomum, cinnamomum, costus, spica nardi, calamus aromaticus, iris, ladanum, malobathri folium, styrax, bdellium, opobalsamum, xylobalsamū, & reliquis aromatum catalogus, aspalathus, myrrha, crocus, macer, opus Cyrenaicus, pretiosa hæc & sumptuosa: pauperum verò communia, meum, dictamnus, acorum, cardamomum, lib. 6. & 8. comp. ph. part. Piper verò non esse aroma, ex priore loco colliges. Omnia autem aromata sunt calida sicca, tenuium partium, lib. 7. comp. ph. part. in fine.

DE CORTICIBVS.



CORTICES fructuum, vt arancij, citrei, granati: radicum arborum, vt oxyacanthes, capparis, tamaricis, fraxini, sambuci, mori, thuris & herbarum radicum, ebuli, apij, petroselini, fœniculi, mandragoræ, raphani, in cognominibus plantis vel dicti sunt, vel dicentur. Qui verò præter hos sunt

sunt exotici, & ob raritatem quidem, etiam ob facultatem in maiore pretio habiti, nunc præcipuè dicentur.

Cinnamomum arbor lauro foliis & baccis similis, & eius ramorum non trunci, tertio quoq; anno delibratorū cortex: Ludouicus Romanus Patricius. Cinnamomum calidum tertio ordine, siccat autem & digerit super omnia æquè calida, propter summam essentiae partium tenuitatem: propter hæc dispositionibus scirrhoris mederi solet. Idem cunctas corrigit putridas & venenatas vires ichorum, & humorum, & lethalium pharmacorum, & veneni virulentarum bestiarum. Idem sua facultate alteratrice & digerente, & odoris gratia, præsidium est non paruum aduersus omnes prauas dispositiones, & casia, & pleraque alia aromatum materia. Cinnamomum quia tenuissimarum est partium, ventriculi meatus aperit, qui humores crassi & lenti inhæserunt, tenuat, & terget, ob id commodè hieræ miscetur. Cinnamomi autem facultas qualis iniriò adest, integra seruari nequit ad annos triginta, multò minus ad centum, vel etiam ducentos, ut quibusdam visum est, cinnamomum senii experts putantibus. Nam id seruatum vasculis ligneis ab Imperatoribus variis, Traiano, Hadriano, Antonino, Commodò, Seuero, imbecillius tanto est expertus Galenus, Seuero theriacen componens, quanto vetustius: contrà tanto valentius, quanto recentius. Nam Seuero Imperatori theriacam parare iussus, qualem Antonino Imperatori parauerat, coactus cinnamomum capere ex Traiani & Hadriani temporibus relictum, cum nondum triginta anni præterissent, multò inualidius expertus est, lib. i. antidot. Arborem enim totam primi generis cinnamomi ex Barbaria in scriniolo cubitos quatuor & semissem longo ad Antoninum allatam vidit Romæ Galenus, ex eaq; theriacen paratam aliis longè præstantiorem expertus est, ut ea etiam ante duos menses Antonino uti licuerit, non expectata medicamenti coctione. Cinnamomum optimum, iis qui id crebrò viderunt, omnium facillimè dignoscitur: & cum principum cinnamomorum sex sint differentiae generales, optimi tamè supra deterrimum insignis est excessus, ut in casiiis, quarum tamen optima parum à prauissimo cinnamomo abest. Id autem cinnamomum est odoratissimum, ac indicibilem quandam odoris gratiam super alia omnia refert, gustatu ad-

e

modum

*Lib. 7. simpl.**Lib. 6. c. ph. p.**in diabesasa.**Lib. 7. c. ph. p.**Lib. 8. c. ph. p.**ibidem.*

modum calidum est : non tamen adeò, vt molestè rodatur : color illi est lacteus, cum *φαιῶν*, id est, giluo, & cum cyaneo mixtus. Cinnamomum quantò casia sit præstantius, docet Gal. lib. 5. comp. pharm. part. in dentifricio : quod si odorum facere vis, misce casiae aut amomi drachmas duas : si regi paras, cinnamomi drach. vnam, vbi non solum casiae pondus duplat, sed etiam mediocribus dicat cinnamomum regibus.

Lib. 1. antid.

Ob id penuria cinnamomi duplum casiae miscendum omnes propemodum veteres scripserunt, vti quod pondus aliquis robustus ferre consuevit, eo absente ferat duo imbecilli. Quintus autem penuria cinnamomi multum vti duplum carpesii miscebat, cinnamomo miscet casiam duplicatam, Aët. in pastillo ad ileosos. Pseudocinnamomum vero est simile, ob id facile nobis imponit, sed gustu & odore longè est inferius. Xylocinnamomum lignosum est valida habet virgulta, nec similem habet suaueolentiam. Cinnamomum omnium præstantissimum est cineritium colore, virgultis gracilibus, notis frequentibus, odoratum vehementer : idque odore longè optimo & suauissimo, gustu acri, & admodum mordaci, & quod mansum *πυγαμίσειν*, id est, rutam olere videatur, læue, confringi facile : addit ibidem veri cinnamomi genera aliquot. Vero igitur cinnamomo nos caremus : nostra autem Cannella aut Casia est, aut pseudocinnamomi species. *λευκοκινάμωμον* Aët. pro optimo vsurpatur.

Gal. in theriaca ad Pisonem.

Casia lignea vulgo, & aromatica : est autem nostra cannella.

Lib. 1. antid.

Gal. in theriaca ad Pis.

Casia verò genere proxima cinnamomo est, quin ipsa nonnunquam ex æmulatione euadit cinnamomum, vt totum quidem veluti exacta arbor, casia videatur : furculi autem in ea quidam cinnamomi, ramis casiae proximi reperiuntur. Optima Casia in cinnamomum degenerat. Vidit enim sæpe Galenus casiae sublimis & ramosae ac fruticis æmulæ in magnitudine furculos cinnamomi furculis omnino similes, corticis tenuitate, & firmissimis cinnamomi notis in odore & gustu deprehensis. Casia sæpe imponit, nisi sis in diiudicando expertus : pseudocasia enim veræ est persimilis, sed odore minus est grato, & corticis medullæ adhærentem habet. Optima autem laudatissimaque est *κίρρα, ροδίσσα, δινίσσα*, id est, rufa, rosam expirans, & vinum olens, gustum dulcem præferens, fistulosa, & aromatum modo vehementer odora. Casiae cortex Actuarius etiam dicitur. *σύνεργον κασίας* idem, Casia Aegypt

Lib. 4. & 7. c. ph. p.

Aegyptia idem, in asyncritico casia cathartica, id est, purgatrix quibusdam dicitur. ἡ σύριγγς ᾗ κασίας, lib.1. antidotorum in compositione theriaces. Casia σύριγγς, id est fistula, & κίρρα, id est, rufa dicitur in arteriacis Andromachi: πύρρα verò bis lib.6.eiusdem. μιλάνη autem in fine lib.7. bis, & lib.8.eiusdem. ῥοδίβρα denique, id est, rosam spirans, lib.8. ξυλοκασία eadem Actuario, & Arabum alumnis casia lignea. Casiam fistulam cum Andromacho minore ad Galeni ætatem omnes theriacæ miscebant: hæc autem omnibus nota est, & comparatu omnium facillima. Corticem verò exteriorem (quem & fistulam dicunt) odoratu & gustatu valentem habet: quod autem intus est, maximè imbecillum, ob id inutile. Aduersus putria, deleteria, venena, proxima post cinnamomum casia, quæ optima est, atque illi cognata valet: aromataq; cætera, nardus, iuncus odoratus, calamus, aspalathus, myrrha, crocus, eandem habent facultatem: sed cinnamomum digerit, casia verò & malabathri folium, & amomum astringentem participant. Casia, crocus, costus, amomus, nardus astringunt quidem, sed magis digerunt, præsertim costus.

κασία διαφνί-
ται.

Lib.9.c.ph.p.

Lib.1.antid.

Lib.8.c.ph.p.

Lib.4.c.ph.p.

MAcer Dioscoridi est cortex flavescent, seu cum Plinio rubens, radicis magnæ, nomine suæ arboris nobis incognitæ, crassus, gustu perquam astringens, ex Barbaria allatus. Galeno autem est cortex gustu multum acerbo, cum leui quadam acrimonia, odorem iucundum redolens, vt pleraque aromata, siccat ordine tertio, calore & frigore est temperatus. Tamen lib.6.comp.ph.part.in compositione διὰ ῥοιῶν, ad finem scribit, καλούμηνον μάκρ φλοιός τις ἀροματιστὸς ἱλαυνῶς ὁδρμαίνων τε καὶ σύφων: nisi causeris adverbium ἱλαυνῶς transponendum, vt solum determinet σύφων. Ex India verò affertur.

Lib.7.simpl.

Macis autem Arabum menibrana est extrema nucem moschatā propè totam vestiens, tenuis, rufa, aut flaua, interdum nigricās, aromatica, odore suauis, sapore subacri, & minimum amaro, tenuium partium, calida sicca tertio gradu, ventriculum roborat, coctionem iuuat. Ex quibus liquet, Macis & Macer res planè diuersas, licet odore, colore quadantenus conueniant: at temperamento tamen differunt, nisi contendas in Dioscoride & Galeni simplicibus mendum esse, quod vix

queas demonstrare. Quòd si res sint diuersæ, vt ex Plinio apertè patet, Macer hodie est incognitum: tamen pro Nicolai Macis Actuarius *μᾶλίστ* reponit.

DE SVCCIS.



Υλὸς, id est, succus ex plantis totis, vel plantarum partibus concisis & tuis torculari, vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa, aut vino, aut liquore alio: vel recens vsurpatur, vel vase, aut loculamento aliquo reponitur, hicq; vel liquidus, vel ficcus. Liquidus item aut per se seruatur, vt vinum, acetum: aut misto sale, vt omphacium, oleum: aut superfuso phialæ oleo, vt succus rosarum, granatorum, limonum, cydoniorum, sambuci, ebuli, & similibus: aut sole, vetustate ue, aut igni per se siccatur, vt succus glycyrrhizæ, opus Cyrenaicus, scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, vt in plurimis syrupis audies. Qui verò succi sine melle [aut saccharo] reponuntur, plurimum corrumpuntur: nisi igne diutius cocti, aut sole æstiuo vsque ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Iidem temporis spatio sicciore euadunt, pluribusq; annis seruati, eo siccitatis veniunt, vt balausticis similiter læuigari possint (quales sunt succus hypocisthidis, vuæ acerbæ, glycyrrhizæ, centaurii, & alii propè omnes) qui verò ex his lentorem quandam natura habent, dilatantur magis, quàm læuigantur, nisi ficcioribus multis mista horum parua portio. Portulacæ, semperuiui, cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, cum omphacio probe trita herba exprimitur: alii tritas igni lento calfaciunt, alii tritas loco frigido, vt cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. *χυλὸς* etiam, id est, succus, sæpe cum humore aliquo extractus ex partibus plantarum, semine psyllii, cydoniorum, lini, fœnigræci, lentorem, aut velut cremorem & muccorem significat: vnde dictum est emplastrum *διὰ χυλῶν*, id est, de glutinosis quibusdam succis: diuersum tamen ab eo, quod est de muccilaginibus, vt in compositis leges.

Oleum

Lib. 6. c. ph. p.

Lib. 1. c. ph. g.

Oleum propriiſſimo nomine appellatur, quod ex oliuis *Lib.7.ſimp. & lib.2.c.ph.gen.* exprimitur: maturis quidem dulciſſimū, calidum, moderatè humidum, vel dum eſt recens, frigidum humidum, lib.1.comp.ph.gen. ex crudis autem & immaturis omotribes & omphacinum quantum astringit, tantum refrigerat: illud veteratum calidius fit, & potentius digerit: hoc autem ſi dulceſcit vetuſtate, dulcis vires induit, quas ſapore explorabis. Tenue eſt purum, tranſlucidum, & cuti affuſum eius modicum, latiſſimè per eam extenditur, continuum ſibi manens, & citò à cute combibitur: idemq; optimum æſtimatur, quale in Italia Sabinum. Oleum lotum morſu omni caret. Lauandi modus in lib.de comp.ph.gen. Sicyonium autem, cicinum, raphaninum, ſeſaminum, amygdalinum, caryinum, ſinapi-num, lentiſcinum, laurinum, melanthinū, terebinthinum, maſtichinū, myrtinum, balaninū, hyoſcyaminum, & alia præter hæc plurima ex fructibus expreſſa, fructuū, ex quibus extrahuntur, naturā ſequuntur. De his in compoſitis medicamentis fuſius. Salſum autem oleum iam compoſitum eſt, tantumq; caloris & ſiccitatis aſſumit, quantum ſalis. Oleum vim habet mitigatoriam & laxantem, lib.2.comp.ph.part.

Vinum protropum, id eſt, quod ab vuis deſluit, antequàm *Lib.8.c.ph.p. Lib.8.ſimpl.* calcentur, medium inter calidum & frigidum, hepaticis ſaluberrimum, præſertim cum hepate lupi: quia proprietate ſubſtantię hæc nutriunt, nec calfaciunt, nec refrigerant. Vinum muſteum calidum primo ordine, vetus tertio, medium ſecundo, calori proportionem reſpondet ſiccitas. Ex muſto cocto fit *ψημα*, id eſt, ſapa, lib.7.comp.ph.part. Nescio quo modo neglectum eſt, quod à noſtris Aſiæ Græcis *ψημα* dicitur, ab his qui Attico ſermone magis vtuntur *σίρωρ*, id eſt ſapa: quamvis etiam *σίρων* dicitur, quod pinguiſſis ficis in aqua coctis efficitur, quod magis digerit & terget. Muſtum verò coctum magis eſt emplaſticum, non rodens, lib.7.comp.ph.part. Ex ſapa diſſolutū caſtorium cum opio dolorem aurium inflammatarū magis ſedat, quàm vinum dulce, initio libri 2. eiufdem. Facultatum vini differentię ſunt permultæ: à ſubſtantia tenui, craſſa: colore, albo, fuluo, rubro nigro: odore imbecillo, valenti, ſapore vario, ſumendæ: de quibus Gal.lib.de vinis, lib.4.& magis 5. ſanit.tuendæ: Aph.17.18.21.lib.2.lib.

methodi 7. maxime 12. libro 1. antid. libro 3. aliment. Vinum medicamentis stomachicis, coeliacis, hepaticis, feliciter miscetur, si absit phlegmone, erisypelas, abscessus, intemperies calida. Nam totius substantiæ similitudine alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperiem frigidam vel humidam, si qua adsit, tutò persanat, libro 8. comp. ph. part.

Omphacium sic à vino differt, vt oleum omphacinum à dulci: siccato interdum vtimur, vt Heraclides apud Gal. lib. 6. comp. ph. part. id quia repellit, incipientibus phlegmonis est salubre.

Lib. 1. simpl.

ACetum crassius partibus, & fæcibus, seu fæci proportionem respondentibus calidum videtur, non tamen causticum: tenuibus verò partibus frigidum, idq; magis quam calidum, aut fortè frigidum per se, calidum per accidens. Nam spongia aceto madida, plebeio cuidam admota, is principio & post horam vnā, duas, tres, frigus percipit: ablata deinde spongia, sensum nascentis in parte caloris phantasiam & opinionem habet, acrimoniæ mordentis ratione. In œdematis verò calorem non inducit: omnino autem siccatur. idem purum, idem aquæ non mistum, & perlucidum maxime est partium tenuium, libr. 1. com. ph. gen. Acetum incidit, renuat, digerit, refrigerat, reprimat, ac repellit influxum. Nam substantia modicè calidum est, plurima parte frigidum, tenuium est partium, si est acre admodum, & nihil vini qualitatis repræsentans. Idem solum ob suæ virtutis vehementiam capitis affectibus non adhibetur, sed mistum alteri: album magis est tenuium partium, libro 6. comp. ph. part.

Lib. 1. & 2. c. ph. p.

Acetum atram bilem parit, & in massam attollit, biliosis salubre, Hippoc. lib. 3. rat. vict. acut. & ibidem Galenus, tamen quartanis datur ad incidendum & tenuandum.

Lib. 7. simpl.

Mel in succorum censum referri potest: quod autem est calidum siccum ordine secundo, vt medicamentum: vt alimentum verò, & dum actu nutrit, calidum humidum lib. 3. temp. terget, alit, coquit, putredini resistit, vt vinum, non cogendo substantiam corporum quibus exhibetur, vt i fal, sed siccando, tergendo, ora aperiendo, transitus purgando. Vrinam mouet, stomachum subuertit, ob id non miscendum

dum remediis vomentium : intemperies frigidas humidas
tutò sanat, calidis siccis seu biliosis est aduersissimum, sinuo-
sa vlcera glutinat. Coctum & despumatum minus acre, &
tergens redditur, sed magis nutriens. Mel medicamentis
miscetur vel crudum, vel coctum, vel solum despumatum,
vel cum his coquendum, aut solum despumandum, aut vt
crudum maneat. Cùm autem despumandum est, coquitur su-
per prunas aut flammam lignorum aridorum, & sine fumo.

Lib. 8. c. ph. p.

Mel optimum sit purum adeò, vt totum perluceat, odorù,
flauum, acerrimum, dulcissimum, gustanti iucundissimum,
consistentia nec crassa, nec liquida : sed tam sibi cohærens, vt
continuitatem suam quasi linea longissima non intercisum
feruet, si digito attollitur. Idem coquendo paucam spumam
remittit, nec thymum improbè olet. Album etiam ex Gallia
Narbonensi præstantissimum affertur, & pallidum magis est
primo apum nouellarum mellificio.

Lib. 6. c. ph. p.

Lib. 4. sanit. et

lib. 7. meth.

Sacchar autè, vt vocant, & ipsum mellis species, ex India,
& felici Arabia aduectum, in calanis (vt aiunt) concre-
scit, minus dulce quàm nostras: similiter tamen terget, siccet,
digerit, nec inimicum stomacho est, nec sitim affert, vt no-
stras: quæ res ipsum à melle substãtia differre ostendit. Idem
sal Indus quibusdam dictus videtur, vi solis gutta extra can-
nas extracta & densata. Idem Zuchara Arabum re ipsa esse
apparet, solo differēs compositionis modo per coctionem &
expresionem: noto quidem Varroni & Straboni, ignorato
autem Dioscoridi, Galeno, Plinio. Nec tibi difficile fuerit ra-
tiones eluere eorum, qui Saccharum Græcorum à Zuchara
Arabum diuersum contendunt. Actuarius Sachar ubiq; scri-
bit pro Arabum Zuchara, voce ab his suo more ex Græcis
deprauata, aut fortassè còtrà, cùm res ea fuerit Arabica, Græ-
ci ex his nomen mutuati sunt.

Saccharum rubrum est ipsa velut spuma sacchari, spurci-
tiem coctione deponētis, calidius & acrius saccharo, vti spu-
ma mellis, melle.

Aeromeli, id mel aërium Galeni est, Manna Arabum, li-
quida & granulosa. Cuius & mellis eadē parte bona vi-
detur esse materia, quod cœli sereni rorem à frigido concre-
dat Aët.

*μάννα Per-
scam lan-
dat Aët.*

tum in floribus (qualem in maturis vuīs, batinis, prunis videmus) apes colligunt, licet etiam floribus quibusdam mel-
lea inſit dulcedo apibus appetita.

Manna hæc ſubalba ſit, & recens, ex plantis odoratis, & ho-
mini ſalubribus collecta: Laricea hodie probatur, anno ſer-
uatur, bile leniendo purgat ſanguinem data ab ſeſcuncia ad
vncias tres: calida ordine ſecundo.

Lib. 1. c. ph. p.
CEra calidi frigidi, humidi ſicci quodammodò media,
cræſſæ eſſentiæ, emplaſtica, debilitèr coquit admota, ha-
bet paulum quiddam digerentiſ calidæq; potētiae, quæ melli
plurimum inerat. Materia ob id eſt aliorum medicamento-
rum calfacientium & refrigerantium. Ea aut lutea eſt, aut fu-
ſca, aut alba: & hæc aut natura, vt Pontica apertè acris: aut
ablutione, vt Tyrrhenica, & noſtras acrimoniæ expers. Cæ-
teri colores ſunt aſcitiui, vt viridis ab ærugine, ruber ab an-
chuſa vel cinabrio vulgari, niger ab atramento, vel charta
uſta, à quibus miſtis vires mutat. Optima ſubſulua, ſubpin-
guis, pura, odorata, ſapore melleo.

Κηρός ῥάδιον opinor pro ῥάδιον, id eſt, cera ſtaſte & ſtilla-
ritia, initio lib. 2. compoſition. ph. gener. legitur.

Oxyacanthæ ſuccus Aſtuar. Scillæ ſuccus cum melle co-
ctus tribus cochlearibus ante & poſt cibum datur ægrè ſpi-
rantibus, Aſtuar.

Succus Braſſicæ cum melle coctus linctus eſt arteriacæ
Aſclepiadis & Antonii Muſæ, lib. 7. comp. ph. part. Galeni.

Succus pomorum mandragoræ vigentiū optimus, ex Cre-
ta Romam fictilibus poculis ſeculo Galeni afferebatur: &
hyoſcyami ſuccus ætate collectus, lib. 1. c. ph. g.

Χυλὸς ῥόδιον Pōticæ lib. 7. cō. ph. part. in diacodio Damocra-
tis. Succus alterci & mādragoræ Andromachus lib. 7. Chy-
lus ſeu ſuccus eryngii in aqua cocti. Succus ficuū in aqua co-
ctarū, lib. 7. cōp. ph. part. Succus ſcillæ, lib. 7. Succus ari maſcu-
li lib. 8. Succus plātaginis aridus, refrigeratoriſ, initio lib. 8.
Succus radicis mandragoræ: ſuccus pomorū lib. 9. Succus ex
acinis malorū puniceorum tritis expreſſus. Succus plantarum
ſole vel igne, vel temporis diuturnitate ſiccati, qui tamen hu-
mentes uſurpari poſſunt, in uſu medicorū frequētiore ſunt.

Acacia

A Cacia succus est ex fructu seu femine, interdum & foliis spinæ Aegyptiæ expressus, in umbra siccatus, siccatur ordine tertio, refrigerat primo: secundo autem, si lotionem suam acrimoniam deposuerit, Acacia κίρρα. lib. 7. compo. ph. part. in diacodio Heræ. Hæc tamen humidior usurpari potest, ut in theriace leges. Eligenda modicè rufa & odorata, quatenus illi datum est. Eius loco ex bacculis prunorum agrestium coctis succum expressum tessellatim confectum insolatumq; usurpamus minimo errore, quia refrigerat, siccatur, astringit ut veterum acacia. Diosc. Lib. 6. simpl.

A Loë herba semper virens, nunc in multis Galliarum occiduarum domibus ad ostentationem appendi solita, & eius herbæ succus calidus in fine ordinis primi, aut initio secundi, siccans ordine tertio, valenter amara est, astringit modicè, idq; sine morfu, eccoprotica est, id est, sterqus deducens, & eustomachos præcipuè lota: repellit, digerit, terget parum, quantum scilicet vlceribus puris non sit molestum, sinus glutinat, vlcera dyssepulotica, præsertim sedis, pudendi, oris, glutinat: & phlegmonas harum partium sanat aqua subacta. Perroquet vulgò.

Sumpta sæpe hæmorrhoides venas aperit, vel à tota substantia, vel quia calida: crassæ essentia, & pro modo tertionis mordax, lib. 5. simpl. cap. 13. & Aphor. 47. lib. 6. quauis anastomotica sint acria, terrea: admota autem sanguinis fluxum cohibet, quia astringit, & emplastica est, ob id emphrastica, id est, obstruens dicitur, cap. 11. libro 5. simpl. Nihil enim sumptum & admotum vires habet easdem, lib. 3. temp. de sinapi, & lib. 8. methodi de mulsâ. Aloë, ut rosæ, mistæ est facultatis: nam amara substantia tergunt, astringente vlcera contrahunt, & cicatrices tegunt. Optima est pinguis, libro 9. compo. ph. part. glutinosa, ex rubro rufa, hepatis modo coacta, & intus foueata, proinde minus grauis, bono odore myrrham æmulante, syncera, nitida, transparens, arena- rum & calculorum expers, friabilis digitis, facile liquefscens, eximie amaritudinis, non adulterata acacia, vel misto gummi, quod illam minus amaram, validioris odoris, non friabilem digitis ad minima vsque frustra reddit. Indica est optima. Valet etiam ex Cœlosyria, & Arabia. Ex magna Syria humidior. Arabicam tamē tanquam omnium vilissimam Lib. 4. c. ph. p.

& folis mulomedicis vsurpandam, damnauit Mesues: & inde caballinam vocant, nigram, obscuram, fæci simillimam, amarissimā odore tetro, arenosam, vt optimæ sedimētum videatur. Primā succotrinam, secundam hepaticam seu Persicā, tertiam Armeniacam, quartam bonitate Arabicam statuunt Mesues & alii. Aloë lota minus aluum ducit: multum enim virtutis medicamento sœ lauando deponit, magis tamen ventrem roborat. Aloë etiā lota his maximè aduersa est, qui citra prauos humores intemperie calida sicca laborant.

Li. 7. method.

Lib. 8. c. ph. p.

Ibidem.

Diosc.

ELaterium, succus ex fructu cucumeris agrestis, à bimatu ad decennium bilem ac pituitam vtriusque parte vacuat, à semiobolo ad obolum sumptus. Extrahitur variè Dioscoridi.

Diosc. Gal. lib.

6. simpl. Memithe.

Glaucium, succus herbæ ad Hierapolin Syriæ urbem nascentis, foliis ferè papaueris corniculati: à quo tamen quantum differat, docet Dioscorides, & succum extrahendi rationem. Græcis in vsu multo & Arabibus, nunc ignoratur: valenter alstringit, & insigniter refrigerat.

GLycyrrizæ succum ex Creta delatū præfert Gal. lib. 7. comp. ph. part. in sua antidoto diacodio. Cætera de hac dicta in radicibus.

Diosc.

Hypocisthis iuxta cisthi radices nascitur, flore punici similis, siccat & alstringit magisquàm acacia: prodest dyentericis, cœliacis, sanguinem sœciantibus, fœminarū profluuiio sumpta & indita. Hypocisthis succus, & Hypocisthidis succus passim dicitur in lib. cōp. ph. part. Hypocisthidis succo addita γλυκίως, id est, passī parte, macerat gummi, tragacantham, myrrham, thus, lib. 7. comp. ph. part.

Lib. 7. simpl.

Lycium à Lycia regione dictum, & delatum, succus est Pyxiacanthæ Dioscoridi & Galeno liquidus, quo vtebatur ad fugillata. Phlegmonas oris & sedis, herpetas, putredines, vlcera contumacia, aures purulentas siccat, & digerit ordine secundo, alstringit, terget. Calore symmetris est proximum. Copiosum etiam est in Cappadocia: Indicū autē est ad omnia valētius. Hæmorrhagiam à naribus Lyciū sistit, linamen

namento impositum lib. 2. comp. ph. part. Lycium coquit, digerit, vt castorium. Indicum autem dico, non quod apud nostras gentes nascitur, lib. 4. comp. ph. part. Lycium etiam Aphrunt dicitur, lib. 3. comp. ph. part. Spumam Lycij appellat ex Solone, libro eodem. Succo ex baccis Periclymeni id mentimur. Modus alius est in lib. de dynamibus, qui Galeno adscribitur.

DE LIQVORIBVS.



PLANTIS partes præter compositas insunt etiam similes ac simplices: sua quædam caro, os, nervus, vena: suus velut sanguis & humor in omnes partes nutriendas dispersus: suæ etiam lacrymæ ex planta sponte sua defluentes, vt gummi: suus *χυλός*, id est, succus, de quo prius: suus item *ὀρός*, id est, liquor, qui est crassum illud & lentum, quod ex vulnere effluit, quanvis radice incisa, qui inde *ρίσις* dicitur: vel caule etiam vsque ad medullam secto, terebrato, castrato, qui *καυλίς* dicitur, dilutior altero puriore, & perlucidior.

Theophr. lib. x. et 9. hist. plāt.

Specialius tamen & per excellentiam *ὀρός*, Cyrenaicus & Medicus, & Syriacus intelligitur, quia omnes caliditate & tenuitate exuperat: ob id omnium maximè digerit per halitum: quanquàm reliqui liquores sint multum calidi, & spirituosi, & plurima horum pars essentiae aëriæ & igneæ. *χυλός* tamen, *δάκρυον*, *ὀρός* Græcis sæpè confunduntur, & Latinis Succus, Lacryma, Liquor. Præstantissimus autem ex Aphrica est Cyrenaicus Galeno, Indicus & Armenus Mesuæ: imbecillior Medicus & Syriacus: vterque etiam virus & putrilaginem resipiens, vt & Parthicus, & Persicus, Dioscorid. Est autem Laseris seu Laserpitij seu Silphij herbæ liquor, caule ipsius ferulaceo, aut radice scarificata defluens, acer, mordax, digerens, optimus modicè rufus, non porraceus colore, translucens, myrrhæ æmulus, odoratus, suavi gustu, dilutus citò albescit. E Taprobana maris Indici insula omnium maxima conuehi hodie præstantissimum, Belzoë vulgò dictum, scribit Ludouicus Romanus Patritius. Opus Cyrenaicus est saluberrimus phlegmonæ gargareonis, & aliarum partium.

Assa aromatica & odorata & benionin.

Assa fetida Lib. 6. c. ph. p.

Lib. 6. c. ph. p.

tium, non incipienti, sed veteratæ, & in scirrhum durefcenti.
Est enim accerrimū & maximè calfaciens medicamentum.

Mήκωνος & μήκωνος ὁπὼς lib. i. ph. gen. succus ex foliis & calyce papaueris tufis expressus, pro Opio à multis supponitur, alia eius adulteria, Dioscorides. μήκωνος ὁπὼρ, & μήκωνος diuerfa facit Asclepiades apud Gal. lib. 2. antid.

Gal. lib. 8. sim. **O**pium est lacryma ex inciso papauere nigro defluens, hodie etiam ex albo destillat. Ex Apulia affertur : refrigerat, siccat, inspissat, Diosc. Incidendi & colligendi modum docet idem. Præfertur Thebaicum. Hispanum opiū vsurpatur lib. 7. c. ph. part. Opium calidis dispositionibus medetur, ut altercum, & similia : medicamenti additur ad sedandum dolorem, somnum conciliandum, siccandum, Gal. lib. 8. comp. ph. part. Opium etiam stomachicis miscetur ad sensum stomachi hebetandum, & somnum conciliandum. Vehemens autem refrigeratio ex opio, corrigitur castorio, pipere, & similibus, lib. eodem octauo. Opij drach. duas arteriacæ 14. miscet Andromachus, lib. 7. eiusdem. Cùm multi sint ὁπῶι, id est, liquores, solius papaueris ὁπὼς, neutro genere ὁπὼρ à medicis propriè nominari solet, lib. 9. comp. ph. part.

Opium omnium quæ sensum stupefaciunt, & somnum torpidum inducunt, valentissimum est, lib. eodem.

Opobalsamum in Carpobalsamo dictum.

Lib. 8. simp. **O**popanax liquor è panacis Heraclij radice incisa emanās, cùm caulis primum erumpit, aut vulnerato caule melsibus : calidus ordine tertio, siccus secundo, emollit, digerit, modicè terget, ob hoc ossa nuda vestit carne, vlcera maligna & contumacia sanat. Recens est candidus, vbi aruit, colore foris est croceo, aut subflauo, intus candido, odore graui, amarissimus, læuis, pinguis, friabilis, tener, facilè in aqua liquefscens. Damnatur maximè niger, & mollis.

Cedrinus liquor impenfè calidus, & siccus, frigidaë & humidæ cerebri tēperaturæ ob id saluberrimus : capillum sistit, & auget, odore non ingrato consuetis, ingrato delicatis, lib. i. comp. ph. part.

Euphor

EVphorbiū & Euphorbia arbor spinosa in Athlante Libyco ad Mauritaniā mōre, ferulaceaꝫue, & ex ea con-
to eminus incisa liquor emanans lacteus, facultatis est causti-
cæ ac vrentis, tenuium partium, vt alij liquores: vnum orobi
magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ouillis, vel
hedinis ventriculis quibus excipitur, concrefcit, vitreumꝫue
spectatur. Elige translucens, acre, recens, albissimum si calo-
re multo et igneo egetur: si modico, vetus et luteum. Nam re-
cens albius est, ac valentius calfacit: citò autem virtus eius
exoluitur, calorē enim habet caducum & statim euanidum:
& fit vetustate cineritium, pallidius, aut flauius, modicè cali-
dum. Id autem si recens sit feruidissimum, vt linguam vrat,
& leui gustu os accensum detineat diutiùs, & quicquid gusta-
tur, Euphorbium planè respiciat. Bimum aut trimum medio-
cre viribus adhuc est (talique vtitur Gal. lib. 1. comp. ph. part.
in alopecia) interdum & quadrimum. Quinto autem vel sex-
to anno iam exoluitur, deinde procedente tempore in totum
elanguescit. Gal. ne putes cum vulgo annis decem posse ser-
uari: etiam cum milio, lentibus, fabis adulteratur lacte hedi-
no, sarcocolla, glutino, id igni iniectum odorem edit fastidien-
dum. Euphorbiū siue liquor est, siue aliud ex occiduis re-
gionibus affertur, vt Sagapenum ex orientalibus, lib. 3. comp.
ph. gen. Euphorbium liquor est stirpis cuiusdam spinosæ
in Maurusiorum terra prouenientis, facultate calidissimus, in
ventre ouium reponitur, quoniam hunc solum non erodit.

Diosc.

Lib. 6. simp.

Lib. 3. c. ph. g.

Lib. 9. c. ph. p.

GAlbanum liquor ferulæ Syriacæ, seu plantæ ferulacæ
in Syria frequentis, calidus in fine ordinis secundi, aut
principio tertij, siccus initio secūdi: mollit, digerit, addit Dio-
scorides, trahit, vrit. De hoc pauca leges mox in Sagapeno.

Gal. lib. 8. sim.

Laudatur purum ligno, aliquid tamen seminis mistum ha-
bens, odore graui, sapore abominabili, humidi & sicci me-
dium, pingue, & in hammoniæ aut thuris similitudinē car-
tilaginosum. Eius obolostres miscet Andromachus arteria-
cæ 12. alteri drach. sex lib. 7. comp. ph. part. Purgandi eius for-
dibus ratio Dioscoridi traditur. Vitiatur resina, faba fricta,
hammoniaco.

HAmmoniacum seu Hammoniacum thymiama, liquor Hammoniæ
est resinæ aut gummi modo stillans ex ferula quadam gutta.
Cyre

Diosc. Cyrenaica in Aphrica prope Iouis Hammonis oraculū, unde illi nomen: calfacit, discutit, & adeò valenter emollit, vt tophos articulorum dissoluat, & lienes induratos sanet, ac chœradas per halitum digerat. Probatum purum ligno, arenis, terra, sordibus, bene coloratum, odore castorei, sapore amaro, prædensum, & in thuris masculi similitudinem, minutis glebis, cartilaginofum. Hammoniacum eryngio & melli mistū, arteriace est valida, & diuturnis affectib⁹ vtilis Critoni apud Gal. lib. 7. composition. pharmac. partic. Hammoniacum, Galbanum emolliunt, mitigant, emplastica sunt, & Opopanax, sed illis valentius, lib. 10. eiusdem. Ligno, terra, arenis, & sordibus aliis vitiatur.

SAgapenum est frutex ferulaceus, seu ferulæ similis planta, lib. 8. simpl. seu ferula quædam panaci similis, lib. 1. anti. in Media regione, & abusiue ex ea succus: qui etiam *ἰωὺς σαγάρωνος* dicitur, lib. 1. antid. calidus, tenuium partium, vt alij opoi, seu liquores: modicè terget, oculorum cicatrices purgat & terget, suffusiones & oculorum hebetudines à crasso humore leuat. Laudatur perlucidum, foris rufum, intus candidum, acre, odore porri, seu medio inter laseris liquorem & galbanum, quibus adulteratur. Opopanaci enim nihil est simile, sed galbano albiori. Nam spumosa, cohærens, albior, leuisque pars galbani in Sagapenum degenerat: pars altera densior & multò quàm aliud galbanum cōstrictior, fit galbanum optimum, sagapenum respiciens, eaque tanquàm præstantissima vtendum, lib. 1. antid. Si verum est, vino aut aqua statim dissoluitur: adulteratum non liquefcit, ibidem.

Diosc. Scammonia, vel Scammonium liquor emanans ex vulnerata radice crassa herbæ cuiusdam in Myfia Asiatica, unde laudatissimum affertur: hoc est, nitidum, rarum, fistulis tenuibus, fungosum, leue, taurino glutini colore simillimum, linguam non vehementer exurens, linguæ tactu albescens, quā notam misto cum erui farina tithymalli lacte adulteratum etiam habet, ac linguam vrit, quale pessimum est, & graue, densum, Syriacum, Iudaicum. Bilem verò & pituitam purgat, à drach. vna ad obolos quatuor. Seruatur annis 20. Mesuē: 40. Serapioni, cum malo cydonio, in quo ab interaneis purgato coctum fit clementius.

Scammo

Scammonia etiā foris admouetur, bis in cephalalgia apud Galen. lib. 2. comp. ph. part.

THapsia liquor herbæ ferulaceæ, valenter calidus, cum larga humiditate, ob quam citò corrūpitur: & cūm violenter extrahat, & extractum digerat, plusculum ad ea tempus postulat. Eadem post annum est admodum imbecilla, bima prorsus expirauit, lib. 1. comp. ph. gen. Primum in Thapso insula, inuenta est, vnde illi nomen.

Diosc.

DE LACRYMIS.



Αμυγδαλιν, id est, lacryma seu humor ex plāta sponte sua defluens, siue in gummi aquea res concreascit, siue in resinam liqueascit, oleagina eius substantia. Arborū partibus præsertim truncis à germinatu incisis & scarificatis etiā resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, vt pinu, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substātia igni parum siccata fit pix liquida, cui quod supernatat pissanthum tenui consistentia & facultate est astringente, ob id caniciem sine vlla noxa tardat, vt pisselæum, id est, pix liquida cum oleo mista, Gal. lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autē est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca adeò, vt puluerizari possit: qualis est Græca, etiam Celophonia, & Hispana, & Gallica dicta. *ωίαρα σπύτια*, lib. 8. comp. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiā Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calfacit, siccatur, tenuium est partium, magis minùs.

Resinarum iure præstantissima est Lentiscina, id est, Mastiche, parum astringit, siccatur sine morfu, calida & sicca ordine secundo, minimum est acris, tenuium maximè partium, stomachi, ventriculi, intestinorum, hepatis imbecillitati & phlegmonæ prodest: laudatissima & copiosissima è Chio insula (vnde Galeno Mastiche Chia passim dicitur) affertur, hoc est, fulgore quodam ignis splendida, candore ceræ Tyrhenicæ, adulta, retorrída, odorata, stridens friando. Deterior est viridis, & nigra Aegyptia dicta, aut Pontica, bitumini nigredini

Lib. 8. sim. & lib. 1. & 2. c. ph. ge.

Diosc.

gredini similis. Mastiche apta stomacho, odoris grati, vim medicamentosam aloës & aliorum purgantium efficaciter frangit, initio lib. 8. compo. ph. part. adulteratur mistura thuris & resinæ nucis pineæ.

Lib. 8. simp.

Pήτιν τέρβινθιν. Terebinthina resinarum cæterarū præstantissima, astringit manifestè, sed minùs quàm mastiche: emollit autem magis, coquit, digerit, qualitate subamara, & partium tenuitate terget angustos meatus vasorum, & in eis osculorum obstructions liberat, ob id putredinem prohibet, aut finit: & hepaticis probè miscetur: è profundo potentiùs trahit quàm cæteræ resinæ. Hæc aluum citra noxam soluit, & viscera omnia, iecur, lienem, renes, pulmonem abstergit. Terebinthina resina omnis ex Chio insula est præstantissima, & odore & gustu cæteris præcellit. Chia igitur semper vtenda, si haberi potest. Huius penuria Libycæ, Pontica, & ex aliis regionibus optima est miscenda theriacæ, & aliis medicamentis: non autè Libycæ, tanquàm omnium præstantissima cū Andromacho. Præstantior est alba, vel cæreulea, vel colore vitri, perlucida, odorata, & Terebinthum plus referens, qualis quæ ex insulis Cycladibus affertur: ob id Chiam quoq; terebinthinam laudat Gal. Minùs laudata Cypria, Syriaca, Iudaica, Arabica, Aphrica. Libycam tamen, vt dixi, laudat Andromachus. Quæ autem pro Terebinthina resina venditur, aut Laricea est, aut Abietina.

Nunc Cypria
Venetis com-
mendatur.

Inferiores autem Terebinthina in digerendo & attrahendo sunt, pinea, strobilina, picea, abietina, laricea, cyparissina, pityina, id est, pinea, propriè physema dicitur, lib. 2. cōp. ph. g.

Terebinthina mordax asperæ arteriæ & ori, initio lib. 7. c. ph. part. *ρήτιν φρυκτὴ* lib. 2. comp. ph. gener. & lib. compo. ph. part. sæpe.

Lib. 1. c. ph. g.

Resinarum mitissimæ sunt Terebinthina & Larix dicta: aliæ mordent modicè, quædam etiam insigniter. Resinæ Terebinthinæ Larix propemodum similis est, ob id illius penuria hac vtendum: illa autem per omnia est melior quàm Colophonia, & quæ Phrygæ dicitur, ibidem. Resinæ siue Larix siue Terebinthina vocatæ aduersus vlcera maligniora magis valent, ibidem. *κολοφωνικὸν πῖστω* in emplastro epulotica *διὰ καθάριας* vocat, paulò post *ρήτιν* appellat, lib. 2. compo. ph. gen.

Strobi

Strobilina resinarū longè calidissima, & celerrimè siccans, omnium moderatissima est, vtraque qualitate terebinthina.

Pitynon, Physema priuatim dictum, genere etiam resina est, multò minus calida & sicca quàm Strobilina, media harum calore Abietina, liquida tamen diu durat, vt Colophonia, thus redolens, odore suavi, calore vt Abietina mediocri, quæ à nonnullis sola dicitur Colophonia, nascitur admodum modica, ob id est pretiosa.

Resinæ siccata pinguis expertes fiunt: ob id emplastra bene adhærentia conficere non possunt, vt viscosæ & liquidæ.

Humidissima est Larix altera: est enim resina Larix dicta duplex, vna Terebinthinæ omnino similis, altera calidior, liquidior, odoratu grauior & ingrator, gustu amarior, acrior, mordacior. Quare satis est terebinthinam omnibus medicamentis vlcera rectè curaturis miscere, in quibus curâdis præcipuus est scopus non mordere: in comp. ph. gen. τερμινθινὴ πικρὴν retorrada, lib. 8. comp. ph. part.

Terebinthinam veram è Cypro allatam Venetiis ad me dono misit Ioannes Baptista Opizo, Medicus longè omnium doctissimus, nostræ Laricinæ & Abietinæ affinem, sed infinitis partibus præstantiorem.

DE GUMMI.



GUMMI est lacryma congelata concretaq; in truncis arborum ipsam producentium, veluti resina in multis visitur, quæ resinam proferre possunt. Est autem gummi aquea magis substantia, vt resina oleagina: proinde illud aqueis promptius miscetur, oleaginis ægerrimè, hoc contrà. Eadem flammam concipit, gummi verò in igni crepitat.

Lib. 7. simpl.

*Lib. 7. simpl.
in hedera.*

EX Acacia quadam Aegypti spina (ex cuius semine Acacia succum exprimi antè diximus) nianat gummi in vermiculorum speciem cōtractum, vitri modo perlucidum, purum, refrigerat, densat. Huius non meminit Galenus in Acacia lib. 6. simpl. vt nec Acaciæ mentionē facit paulò pòst in Acantha Aegyptia seu Arabica (quo nomine solo Dioscoridi vocatur) vnde colligas licet Acaciam & Acantham

Dioscor.

Gummi Arabicum.

f Aegypt

Aegyptiam seu Arabicam diuerfas esse in Aegypto spinas arbores. Tamen in lib.comp.ph.part.frequenter leges κόμμι absolūtē.tragacāthæ coniunctum pro gummi Arabico, quod κόμμι δὲ χιλιόν vocat lib.7.comp.phar.part. à Thebis opinor Aegypti cētiforibus. vti etiam Babylonicum quibusdam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam attingentis. νομίδιον ἀγαθὸν persæpe Actuarius vocat.

Dioscor.

A Mygdalæ amaræ gummi calfacit, astringit, sanguinem reicientibus prodest, impetigines cum aceto illitū tollit, tussi antiquæ medetur, calculosis prodest. Mitius multò est, quod ex Amygdala dulci profluit.

Gummi Lacca
Diosc.

C Ancamum lacryma est Arabicæ arboris, Myrrhæ quodammodò similis, virosi gustus, ad suffimenta vsurpatur, emaciat: lienosos, epilepticos, asthmaticos iuuat, ad dolores dentium efficacissimū. menses ciet. Lachan sæpe Actuario dicitur passim, præcipuè in duplici descriptione dia lachan, vbi scribit, λάχαν νεκρά αρωματόν purgatum.

C Aphura post Dioscoridis, Plinii, Galeni, Pauli seculum inuenta, Aërio & Actuario, & Simeoni, & Arabibus celebrata est, lacryma Indicæ arboris ferulaceæ quidē, sed maximè frequentibus fulgetris, tonitribus, terræmotibus copiosior proueniens. Quæ igni vel sole ex rubro albescit, perlucet, friabilis est, melior tenuior, durantior, quàm crassa, fusca, nigra, assulis ligni sui implicata. Pani calido imposita si madescit, syncera est: si arefcit, spuria: frigida sicca gradu tertio Arabibus dicitur: tamen inistam habet calidam substantiam, acrem, odorem, flammæ ciendæ aptissimam, morbos acutos, cephalalgias à calore, phlegmonas præsertim iecoris iuuare refrigerando dicit Simeon ordine non expresso. καφερά Aët. & Simeoni, & Aëtio, & inde σδαώιον καφεράτον Aët. dicitur.

Dioscor.
Gal. u. 7. simp.

C Erasmo resudans gummi tussi vetustæ medetur, arterias exasperatas lenit, suo lentore morsus experte, colorem commendat, visum acuit, appetentiam inuitat, calculosis ex vino potum prodest. Quæ facultas essentia tenuitatem inesse significat.

Ex

EX Elæa, id est, olea Aethiopica & nostrate inquit Dioscorides, & Italica Plinius, & oleastro lacryma funditur ab elea, vel corruptè pro scammonio similis, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Gummi elemmi
Similis autè hammoniaco, vel gummi, colore nigricans, mordax. Herm.
sus expers, inutilis. Explora an verum sit officinis.

HEderæ lacryma est velut aqueus quidam liquor, sicut Lib. 7. simpl.
Halix omnes lacrymæ. Hæc adeò calidæ est facultatis, vt Dioscor.
obscure adurat, lendes & pediculos interimit, pilis caput nudat: illitu enim est psilothron. odoratissima est.

GVmmi Pruni agglutinat, potum in vino calculos frangit, ex aceto quoque illitum lichenas infantium sanat. Dioscor.
Quæ si præstat, clarum est extenuandi ac incidendi facultatem illi inesse. Lib. 7. simpl.

IUniperi gummi nec Dioscor. nec Galenus memorant, forte quòd ad nihil sit utile, vt Actuarius, Plinius. Subit verò mirari, cur medicis hodie Arabas secutis Sandaracha vocetur, & suffitibus propè omnibus misceant, fluxiones à capite prohibentibus: cùm sit calidum, & planta ipsa etiam umbra, non solo vapore sit grauis. Vernigo dicitur Hermolao, Vernix vulgò, quòd rore verno magis concresecat. Scriptoribus in vsu est multo, & pictoribus.

MYrrha est arboris Arabicæ lacryma, calida sicca ordine secundo, tenuis essentia, multa amaritudine, terget potèter, tamè sine exasperatione, imò lenit: digerit non ignauiter, sed citra rosionem: siccatur valde, tamen sine astrictione: Lib. 8. simpl.
coquit modicè etiam prauos humores, & præter naturam habentes: qua ratione stomachicis in id malum compositis miscetur, sed pauca, & cuius qualitatis medicamentosæ absurditas odoriferis superetur, tamè ea tutius auferri potest. Lib. 1. & 6. c.
Myrrha rubra Actuario, *σύνρυα ἀλνδινή*, Myrrha, verax eidem. ph. par. & 1. c.
Eligenda recens squalore & situ obducta, leuis, tota concolor, ph. gen.
& quæ contracta candidas vnguium modo venas, & læues Lib. 8. eiusdè.
ostendat, glebis minutis, amara, acris, odorata. Quapropter
Lib. 9. c. ph. p.
licæ Paccii Antiochi pauca myrrha miscetur, quæ odorem
f 2 tantum

Dioscor. tantummodò præstet. Omnibus antefertur Troglodytica, viridis, perlucida, mordax: ab hac secunda est, tenuis, bdellii modo faciliè sub digito mollescens, odore grauiuscula, apricis nascens. Mala nigra, aut colore piceo grauis, retorrida, præter modum maturitate exoletæ: omnium pessima pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummiis imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur ἀμινεία nomine Dioscoridi: Galeno autem eligitur Troglodytis, quæ & Minea dicitur à regione, vbi præstantissimam gigni affirmant. Ea gratissimi sit odoris, & nullo vitiata liquore. (Vbi Minea, vel vt bis lib. 9. comp. ph. part. legitur μινναία, videtur eadem, quæ Dioscoridi Aminea improbat) adulteratur enim gummi macerato aqua, in qua myrrha maduerit. Vera enim est rara inuentu, præcipuè sincera: nam in optima myrrha opocalpason inuenitur. ab optima myrrha diuersum, vt in galbano sagapenum, in casia cinnamomū, & horum aliquid medium, quæ à seinuicem discernere is solus potest, qui sæpe ea obseruarit, adeò vt ex vna sola nota sæpe internoscatur. Nam Sagapenum ex Galbano odoris hircini speciem retinet: non habet autem proprietatem odoris cuiusdam, vt propriè dictum Sagapenum. Tamen in hoc sagapeno & congenere galbano parua est differentia ad medicamenti compositionem. Ambo enim conueniunt, quia aduersantur virulentis & deleteriis: sed galbanum minus sagapeno. At opocalpason lethale est intra corpus sumptum: ob id sua ætate multos periisse scribit Galenus vsu myrrhæ, quæ opocalpason habebat, à nonnullis de industria mistum myrrhæ, vt eam redderent laudatissimam. Nam sic mista, collyriisq; indita, pus citra rosionem discutit, ac interdum suffusionem incipientem substantia tenuem, siue ceratum, siue emplastrum, siue aliud medicamentū myrrham opocalpaso mistam recipiens oculo iniicias. Myrrhæ igitur officinarum omnino adulteratæ parum tutus est vsus in sumendis.

Styrax liquidus. Myrrha stacte, id est, stillatitia ex myrrha recente, pingui, & solo lætiore nata, largior exudans cum aqua pauca tunditur, post machina exprimitur, colore pallido, amaritudine præcipua, odoratissima, & pretiosissima res, minima portione efficacissima: eadem præstat quæ myrrha, sed efficacius.

Dioscor. Huius fæx Styrax rubra dicitur Arabum familiæ.

Bdellium

Bdelium est *Αάλογον*, id est, lacryma arboris Sarraceni-
cæ, calfacit, mollit, coquit, discutit mediocriter, hepati-
cis miscetur, calculos renum potu frangit, hernias sanat. Scy-
thicum est atrius, resinofius, ad emolliendum efficacius. Ara-
bicum autem è Petra delatum resinofum, liuescens, diluci-
dius, magis siccans quàm emollientia, nisi recens & humi-
dum sit, & quod tundendo faciliè mollescat. Id enim idem
pollet quod Scythicum. Tertium Indicum addit Dioscor.
sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum.
Optimum est cortice, ligno, sordibus carens, vt taurinū glu-
ten translucens, ob id Bdelium clarum dicitur, lib. 8. comp. *Dioscor.*
ph. part. odore est marini vnguis incensum, gustu amaro, in-
tus pingue, & si tactu subigatur, mollescit: adulteratur gum-
mi, sed id minus est amarum, & suffitu odoratum.

Lib. 6. simpl.
& li. 8. c. ph. p.

Styrax lacryma est arboris Syriacæ, calfacit, mollit, coquit, *Lib. 8. simpl.*
tusses, catarrhos, coryzas, branchos: menses autem mouet
sumptus & admotus. Styracis drach. vnam miscet Androma-
chus arteriacæ 13. lib. 7. comp. ph. part. Probatur flauus, pin-
guis, resinofus, sordescens, albicantibus grumis, acer admodum
& amarus, quamplurimum in sua odoris fragrantia perma-
nens, & qui subactus melleum reddit liquorem. Deterior ni-
ger, furfurosus, friabilis, cano situ obductus. Adulteratur mul-
tis modis Dioscoridi: sed dictis notis dolusprehenditur. *Dioscor.*

Styrax iniiciendus theriacæ, qui ex Pamphilia in arundi-
nibus affertur: hic autem paucissimus est, & tanto discrimi-
ne à copioso hoc Styrace variat, quantum Falernum vinum
ab eo, quod in tabernis venditur. Tamen illius penuria, huius
accipe quod calidissimum, & odore & gustu valentissimū est.
Styrax, vt crocus, myrrha, quantitate sunt deleteria: nam lar-
gius pota quædam dementant, quædam mortem inferunt, sed
mensura apta aliis mista iuuant. *Lib. 1. antid.*
Styrax cala-
mites.
Lib. 5. simpl.
cap. 18.

Sarcocolla arboris Persicæ lacryma pollini thuris similis, *Lib. 8. simpl.*
rufa, emplastica, subamara, citra morsum, proinde sic-
cat, & vlcera glutinat, vnde & nomen commeruit, oculorum
fluxiones inhibet, coquit, digerit, sed minus quàm galbanum,
lib. 4. composit. pharm. particul. Adulteratur gummi misto,
f 3 pulueriz

puluerizata est suspecta adulterii: vera enim est rara. lacte identidem mutato correctâ collyriis miscetur.

Charabe Persis, idest, paleas trahens, ambra vulgò in corollis precatâs frequens.

Succinum seu Succina gutta à succo dicta, Græcis *κλέισσον* esse lachryma populi albæ, vel etiam nigræ quibusdam videtur, ab eiusdem arboris resina Dioscoridi & Galeno dicta: differens, & *πτερυγοφόρος*, id est, paleas trahens, quoque vocatur, quam vim ei quoque Galenus tribuit lib. 1. facult. naturalium: quid tamen esse censuerit, nondum in eo legi. Plinius verò lib. 37. cap. 3. Succinum scribit à quibusdam pinei generis arboribus, ut gummi à cerasis exudare autumnis, & largum mitti ex Germania septentrionali, & insulis maris Germanici. quod hodie nobis est compertissimum: adhæc liquata igni valentiore, quia à frigido intensiore concreuit pineam apertè olet. calidum primo gradu, siccum secundo, stomachum roborat, vomitum, nauseam arcet: cordis palpitationi prodest, prauorum humorum generationem prohibet.

Ambra grisea.

Aμπαρ autem, seu ἀμβαρ, Ambarū seu Ambra Arabū, & Actuarii ac Simeonis recentiorū Græcorum, est odoramenti genus, locis diuersis scaturiens, ut bitumē, sulfur, nobis hodie larga & præstātissima ex littore Aquitanico mittitur, cineritio colore: Indica rufa, pinguis, odorata, quod Succinū orientale vocat Herimolaus. Est Arabibus & Simeoni prælata Arabicæ subalbæ, & tertiæ præter has nigræ, quod à piscibus fontes Ambaris gustantibus deuorata sit, omnium pessimæ. Calfacit, humores incidit, ob id stomachicis à quibusdā additur, cor item & caput roborat. Tamen si ante potū odoratur, ebrietatem accelerat, multò magis si vino imponatur.

Lib. 7. simpl.

THus est lacryma Arabicæ arboris, calidum ordine secundo, siccum primo, modicè astringit, terget imbecilliter, coquit phlegmonas, anodynò est & sarcoticum, cicatricem remoratur, emplastri temperaturam iuuat, acribus mistum vehementiam illorum obtundit, pus mouet, quia calidum emplasticum, nullam euidentem astringendi vim fortitum, præcipuè pinguius & albius. Nam flauius siccatur magis, Adulteratur resina piceæ, & gummi quod non inflammatur, illa autem in fumum abit, thus ardet.

Cortex

Cortex Thuris insigniter astringit, siccat ordine secundo, *Li. 13. method.*
 crassiorum est partium, quàm Thus, minimā habet acrimo-
 niam, ardet igni cum odoris fragrantia. Cortex verò nucis
 & pini quo adulteratur, fumat tantum, & sine odore.

Mannam, seu Mannam thuris (vt lib. 9. comp. ph. part. bis
 leges) propriè vocant micas Thuris ex magnis fasciculis con-
 cussu elisas, à Thure læuigato diuerfas. Nam fragmēta quæ- *Lib. 4. c. ph. p.*
 dam exigua corticis thuris ei mannæ inhærēt, à quibus exi-
 guum quiddam astrictiōis assumpsit, qua differt à Thure,
 quippe quo magis astringit, tamen etiam coquit, lib. 1. comp.
 ph. part. Manna est thuris purgamentum, leui astrictiōe
 præditum, quòd ei corticis thuris paululum sit admixtum,
 lib. 13. meth. Thus enim puris tantum mouendi facultatē ha-
 bet, nullam astringendi vim obtinens, præsertim pinguius &
 albius. Primatum tenet in Thuris genere masculum, quod
 ἄβανον ἀρρην Actuārio dicitur, suapte natura rotundum, indi-
 uiduum, candidum, cūm frāgitur intus pingue, in suffitu sta-
 tim ardens.

TRAGACANTHOS, Tragacantha, vel Tragaganthon, lacry- *Lib. 8. simpl.*
 ma radicibus incisus Dioscoridi, sponte Theophrasto *Lib. 7. simp. in*
 profluens: vim habet similem gummi emplasticam quan- *cācano. Diosc.*
 dam siccantem, acrimoniam leuiorem, arteriæ asperitatem
 lenit cum vino macerata & leuigata, vt cancani radix, vel
 in aqua die vno, lib. 7. comp. ph. part. Tragacanthæ fructus,
 lib. 10. comp. ph. part. Tragacantha alba Actuārio sæpe.
 Præstat perlucens, gracilis, læuis, syncera, subdulcis.

Ex plantis quoq; , & aliis quibusdam vi caloris aquam per
 vaporem educere, neotericum est, vnde Actuārio frequens
 ποδίσταγμα id est, stillatitius rosarum liquor, & ἰντυβίσταγμα
 intyborum. De quibus pauca quædam generatim libro ter-
 tio dicenda putauī.

DE METALLIS.



METALLICA vim medicamentosam habent ma-
 gna sui parte maximam, quædam etiā deletere-
 riam, vt coniectura sit magna, ex his vapores ca-
 loris interni vi elatos plantarum varietatem non
 parum iuuare. Ne putes massam tantam frustra à Deo maxi-

mo conditam, & otiosam, in quibus facultates naturales etiam omnes inesse soli chymistæ testantur, nec meo iudicio malè sentiunt, quod oculus in multis apertè videt: licet plumbo metallorum soli incrementum concedat Galenus.

AVrum metallorum purissimum, pretiosissimum, temperatissimum, in foliola & velut bracteolas percussu multo inter chartas latefcit, eoq; vruntur medici ad naturæ robur, & affectus melancholicos, quâvis in eo principiorum mistio sit firmitior, quàm vt à calore nostro possit dissolui. Aequius multò arte chymistica solutum & potabile exhiberent, medicinam lätificantem, & in iuuenture corpus conseruantem, si Gebero in metallicis exercitatissimo credimus.

ARgentum similiter foliatum est, quâdo auri loco vsurpant, solutum & potabile, vt aurum: felicius propinatur, nisi auro esset multò imperfectius atq; impurius. Argentum à colore, vinum à motu Latinis dicitur, à consistentia vero Græcis *κρύσταλλον* sed hâc arte factam Gal. lib. 9. simpl. illud minerale vult Hermolaus: cùm tam factitiũ ex minio, quàm minerale, seu in argenti fodinarum testis stillatim concretum, siue per se in metallis inuētum, Dioscorides hydrargyron appellet. Cui congener ex aquæ fontibus vomica perpetua scaturit Plinio. Argentum viuum est metallorum omnium cū sulfure materia à calore temperatissimo sic per minima vnitum, vt siccum humido, & humidum sicco equaliter in eo temperentur, Geberus. Vnde opinor, chymistis calore & frigore temperatum quoque dicitur, nō quarto gradu cum quibusdam frigidum, cum aliis calidum. Neque contra chymistarũ placitum pugnare videtur, quod scribit Dioscorides, potum vim habere perniciosam: suo enim pondere interna erodere addit, non qualitate aliqua caustica. Neque verba Galeni lib. 4. simpl. cap. 18. quòd scilicet calore nostro calidum actu redditum per erosionem interimit, & lib. 5. cap. 18. quòd tota sua substantia nobis contrarium sit, & venenum si sumatur: neuter enim id aut calore immodico aut frigore deleterium dicit: sed ille pondere, hic tota substantia, vt scilicet omnino nos lædat necessariò, quantũvis paucum sit sumptum:

ptum: cūm deleteria calore aut frigore sint sola quāritate deleteria. Adhæc Galenus de sola hydrargyro factitia loquitur, cuius quōd interimat sumpta vel admota, se periculum fecisse negat, lib.9. simplicium. Hodie verò vel pueris maximè perspicuum est, maximo mortalium incommodo, quas vires sumptum vel admotum, vel suffitum in scabie Hispana, & eius symptomatis, & multorum artificum vsu vario, habeat argentum hoc semiuiuum, & crudum quouis modo paratum & mistum. Quod verò in metallis perfectis coctum est maximè, id longè omnium est efficacissimum, vti & pretiosissimum, si quis secernere, & secreto nouerit vti. Illud tamen essentiæ esse omnium tenuissimæ, indicant apertissimè celerrima eius in vaporem prætenuem abitio, & in corpus quoduis etiam densissimum penetratio, vt etiam calculū iactilem affrictu non ita multo subeat, intusq; dealbet, & fragilem maximè reddat. Ob id non probo ipsum enulato vnguento, & aliis quibusdam misceri. Argentum viuum sublimatum calore ignis erodente iam præditum, fit eodem quoque deleterium, vt calx & vini fæx vsta. Sublimandi autem (vt chymistæ loquuntur) modum docet Geberus, ex quo & aliis non contemnenda leges, quæ ad cognoscendam plenius argenti viui naturam pertinent.

Lithargyros est purgantis se igni materiæ vitium, seu feruescentis spuma, vt scoria iam purgatæ fæx est, ex plumbo molybdis seu molybdena, ex argento ἀργυρίου, ex auro χρυσίου omniū optima, præcipuè quæ foliata est. Lithargyros moderatissimè omnium terreorum siccatur sine manifestato calore aut frigore, modicè astringit & terget. Eius vsus latissimè patet libris propè omnibus cōpositionis phar. generalium, maximè 2. & 3. Lithargyros manifestè nec calfacit, nec refrigerat, nec humectat, sed siccatur primo abscissu à temperatis: nullam enim qualitatem manifestam gustatu exhibet: nec emplastica est, nec ecphractica, nec repellit quod influit, nec digerit quod parti inflammata est infixum, nec vlcera terget, nec expurgat euidenter, nec rodit, nec carne implet, nec eam supercrescentem absūmit, parum tamen à mediis ad partium crassitiem recessit (licet sit tenuioris essentiæ quàm molybdena) quam & coctione diuturna depo-

Hermolaus.

Lib.9. simpl.

Lib.1.c. ph. gener.

nit fusa vi ignis, & alterata. Ex his enim est medicamentis, quæ tota liquefunt, vt resina, cera, sed non mox vbi ignem attigerit: quæ res multis imponit, eam non fundi purantibus. Cum oxelæo autem cocta citius liquefcit, & cum ærugine quàm cum hydrelæo, vel ænelæo, & quò plus liquoris ad coquendum habuit, eo glutinantius fit medicamentum. Melius eim fit ex Lithargyro medicamētū, quod magis coctum erit, quod ex liquidorum, quæ miscentur, copia contingit. Expers tamen pulchrarum harum virium Lithargyros, medicamentis miscetur, vt phœnicino, dia chalciteos viribus eius nec commodans, nec incōmodans, sed materiæ ad enīplasti pharmaci compositionem idoneæ rationem obrinet. Cruda etiam per se femorum ex itinere attritus iuuat parum siccando.

Lithargyros absolutè, interdum tamen vt in melinis à colore cydonii emplastris Lithargyros *χρυσίτις* dicitur, libr. 2. comp. ph. gen.

Lib. 4. c. ph. p.

Dioscor.

ARrhenicon à vetustis Græcis, ab huius ætatis hominibus Arsenicum, Latinis Auripigmētum: in iisdem metallis, vt auro, argento, quibus Sandaracha gignitur: ob id eadem gleba ambo sæpe mista vidimus: optimum existimatur crustosum, *χρυσίον* (sic Galeno 1. lib. & 9. comp. ph. part. & Dioscoridi dicitur) id est, aureo colore micans, nulli materiæ permistum, in squamas tanquàm bracteolas fissile: alterum globosum, pallidum, & colore Sandarachæ imitans. Vrendo multum sulfur exhalat, in argenti speciem fufum concrefcit, sed intus rubet, causticum est, crustasq; cum vehementi vredine & violento morfu excitat, hyperfarcofin absumit, astringit, & rodit, depilat tam non vitum quàm vstum: quod tenuiorum est partium, miscetur digerentibus & tergentibus.

Dioscor.

Sandaracha Arsenico non solis natalibus, sed etiam tota natura affinis, vt coctione sola naturæ videatur hæc Arsenicum vincere: id enim vstione Sandaracha fit, vt cerussa trita, mota, probè vsta, in Sandarachæ pictoriam abit Vitruuio lib. 7. Adhæc Sandaracha licet rubra sit, aqua tamen soluta luteum colorem intensum facit: floridum autem colorem luteum, reddit Arsenicum. Probatur rufa, saturatio, cinnab

cinnabaris colore, sulfur viuum redolens, friabilis, aliena materia vacans: Auripigmentum rubrum dicitur Serapioni. Eadem chymistis Arsenicum rubrum dicitur, vt Arsenicū croceum est Auripigmentum. Arsenicum autem absolute his est album naturale & fossitium. Risagalum autem (quod vocāt) in genere est Arsenici in iisdem fodinis inuentum. Exedunt Arsenicum sandarachæ, Petræ Asiæ flos. Arsenicum & Sandaracha & chalcitis vsta emplastro reddunt flauas vel rufas. *Lib. 4. c. ph. p.*
Lib. 2. c. ph. g.

Sandarachæ drach. semissem, & alumen scissile & rotundum miscet Andromachus stomaticis, lib. 6. comp. ph. part. & misyos Cyprii drach. 8. apud quosdam legi scribit, ibidem. Vide ne cum Arabibus Sandarachan voces gummi iuniperi, ne'ue vires illius huic attribuas.

AEs vsum astringit, reprimit, acre est: ob id tenuat, trahit, vlcera purgat, siccatur, cicatricem inducit carni duræ, in molli lauandum, probatur rubrum, contritu cinnabarin colore imitans: nigrum verò plusquam decet exustum est. *Lib. 9. simpl.*
Diosc.

Squāma æris vi & ictibus ex clauis & panibus æreis excussa, astringit, reprimit, tenuat, rodit, mordet carnem, detrahit, & liquat. Probatur crassa, rufa, præsertim æruginosa. *Diosc.*
Lib. 9. simpl.

Flos æris fit, cum æs in fornace fusum in receptacula delabitur per canales, ministris aquam clarissimam vt refrigeretur affudentibus: quando flos subito exilit, milii effigie, brevis, grauis, splendens: cum teritur, rufus, friabilis, multum astringit & mordet, tenuioris essentiae, & magis tergentis quam æs vsum, & squamma æris. Adulteratur æris squamma aut limatura. *Diosc.*
Lib. 9. simpl.

Diphryges, quasi bis tostum, est perfecti æris velut fæx subsidens & cohærens inæ fornacum parti, tanquam vstorum in foco lignorum cinis, ablato ære visitur. Duobus aliis modis fit Dioscoridi & Plinio: modicè & astringit, & acre est, vt æs vsum, vehementer siccatur, vlcera rebellia sanat, ochra vsta adulteratur. *Gal. lib. 9.*
simpl.

Scoria est omnium metallorum spurcitia, recrementumq; & velut sterco: siccatur, sed omnium maximè Scoria ferri leuissimè trita.

Aerugo

*Viride æris,
Verderis vul-
gò, vel Verdet.
Lib. 9. simp.
et li. 6. c. ph. p.*

Lib. 3. c. ph. g.

A Erugo est æris velut rubigo in æreis vasis, laminis, squammis, scobibus, lapidibus concreta decem diebus aceti acerrimi vapore, aut acescentium vinaceorum contactu, post decussa vel derafa. Est acris, mordet, detrahit, liquat carnem, etiam duram, digerit, vehementer siccatur. Adulterandi & adulteratam noscendi rationem à Dioscoride traditam sciens omitto, quod larga eius synceræ copia toti Galliæ à mulieribus Monpessulanis suppeditetur. Aerugo vstu (& lota) neruo vulnerato prodest, non vsta autem iusto est mordacior.

*Lib. 4. c. ph. p.
Lib. 9. simp.
Lib. 6. c. ph. p.
Lib. 3. c. ph. p.*

C Halcanthus, hic aut hæc, vel hoc Chalcanthum, essentia est eiusdem & naturæ cum Chalciti: hæc autem nativa est, illud ex hac factitium, & in hanc tandem per se rediens: vehementissimè astringit, & calfacit non instrenuè, putridis vlceribus congruit, gargareonem etiam scirrhotentatum irritat. Adhæc quum medicamentum id est vehementissimū, validis vtrisque viribus astringendi & calfaciendi præditum, vitanda eius per se vehementia, sed mitioribus mistis obtundenda. Vstum verò & lotum multò moderatius redditur, lib. 4. comp. ph. part.

Lib. 9. simp.

S Ori, Chalcitis, Misy, acria, vrendo escharas excitant, & nonnihil astringunt, essentia cōsistentia & situ differunt. Nam Sori in fodina infimum ac crassissimum: & quia lapidosius ac vehementius compactum, in humore non liquefcit, friando nigrius ceu melanteria apparet, ac scintillat vt Misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu virus olet, subpingue est Diosc. Misy grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, quod friando auri colorem imitatur, & stelæ modo splendet, Diosc. summum & tenuissimum, & à calore ingenito magis elaboratū, & siccius. Proinde ægrius liquefcit, & corporibus duris admotum ob tenuitatem minùs ea mordet, quàm Chalcitis, tametsi æquè calidum. Eadem ratione Chalcitis vsta minùs mordicat, & minùs astringit, non minùs tamen siccatur. Chalcitis situ & essentia est media, æri similis, friabilis, non lapidosa, promptissimè liquefcit. ea vsta melior est quàm non vsta: quia tenuiore est substantia, vt alia omnia vsta, non tamen acriore, quod aliis multis vstis accidit.

Diosc. Gal.

dit. Vsta autem omnia lauando mitiora & minùs mordacia euadūt. Soreos pars extima & summa in chalcitin, & chalciteos partes extimæ in Misy tandem transeunt: in metallica fodina, & quo loco seruantur, quomodo æri, innascitur ærugo. Hæc Sori, Chalcitis, Misy valenter tergent, Misy etiam modicè particeps est facultatis exedentis. Chalcitis cruda *Lib. 4. c. ph. p.* mordax est, vim autem eius vrendo minuimus, idonea est columellæ inflammata, quando vehementer inueterauit, & curatu contumax est. Chalcitis vsta est eligenda, quæ vrendo *Lib. 6. c. ph. p.* cineritia euaserit, non *Lib. 1. c. ph.* *gen. & in The* *riace.* *ωχρῶς & ὑλός*, qualis vstione fit à multis. Modus vrendi in Diofco. Chalcitis vsta non minùs efficax, sed minùs mordax.

CAdmia est corpus racematim & densè concretum in rudibus ferreis, ex fuligine æris in fornacibus candentis egesta flatu, & lateribus camerisque fornacum ferratis inhærente: est colore spodij, fracta quæ, cinerulenta, & æruginosa, quæ optima est. Fit etiam ex argenti terra, & cocto lapide Pyrite. Siccat vt terrena omnia, mediocriter terget, igneæ facultatis & mordentis aliquid habet, quam lauatio adimit, vlcera carne implet in carne molli. Melior & tenuior hotryitis, id est, racemosa in summo collecta, quàm placitis, id est, crustacea in imo & lateribus. Cadmia etiam lapis est in montibus & riuis Cypri repertus, alia omni cadmia multò efficacior, inuētū rarus. Lapide calaminari dicto hodie æs tingunt ex rubido in albidum, quo lebetes ferè fiunt. *Diofco.*

Vm æs perficitur detrita cadmia cumulatius inspersa *Diofco.* fauilla in cameram integram effertur tenuissima, quæ in Pompholygem ceu bullas quasdam coit: fit & sine ære ex solis cadmiæ fragmentis in ignem coniectis & perflatis. Ea dum fit, quæ excrementi portio in pauimentum percussa recidit, Spodos est seu Spodium, grauius, & impurius, & minùs efficax Pompholyge. Pompholyx lota omnium propè *Lib. 9. simp.* citra morsum siccantium præstantissima, ad vlcera ob id cancrofa, & alia maligna, & oculorum fluxiones efficacissima.

PLumbum frigidum humidum, ob id liquor quiuis frigidus (vt oleum omphacinum, rosaceum, melinum, myrtinum,

tinū, semperuiui, cotyledonis, intybi, lactucæ succus) in mortario plumbeo, pistillo plumbeo ductus dum crassescat, seipso frigidior euadit, optimumq; fit remedium phlegmonarum incipientium, & fluxionum aliarum in inguina, pedes, articulos alios, & vlcera rebellium, & cancerorū. Lamina plumbi lumbis instrata veneris insomnia sedat, ganglia diffecat illigata. Plumbum vsum & lotum vlcera rebellia, chæronia canerosa carne implet, ac cicatrice tegit.

Lib. 1. c. ph. g.

Lib. 9. simp.

Molybdena substantiæ est crassioris et frigidioris, quàm Lithargyros, non terget tamē, ceterà vsum habet propè eundem in emplastris, licet varium colorem afferat. Amboliquantur tardius cum hydrelæo, celerrimè oxelæo.

Lib. 9. simp.

Lib. 1. c. ph. p.

Cerussa aceti acris vi ex plumbo soluta refrigerat, siccat, castringit, emplastica est, candefacit, hæc lota plumbo vsto loto viribus proxima: vsta transit in Sandyca, fitque tenuior, nondum calfaciens, Phycos cerussæ frigiditate seruata tenuitatem assumpsit, qua vis eius adiuta in profundum corporis penetrat. Cerussa Rhodiaca, vel illi similis ex ciuitate Dicæarchia olim dicta, nunc Puteolis: præfertur si emplastrum vis eximiè candidum fieri, quia albidior, scuior, tenuiorum partium his, quæ alibi nascuntur. Sal ex Cerussa ad multa efficacissimus, & oleum ex Cerussa.

Gal. lib. 1.

c. ph. g.

Lib. 4. c. ph. p.

Lib. 9. simp.

Sulfur omne calidum, tenuis essentiæ, trahit, terget: salua, vel lotio, vel oleo veteri, vel melle, vel terebinthina exceptum, venenatis ictibus impositum sanat. Psoras, lepras, lichenas cum terebinthina tergendo & dissipando per sanat. Nobilissimum est *ἄσφελος*, id est, viuum, & ignem nō expertum: ignem expertum quo virentius, oleosius, pinguius, eo melius. Ex Sulfure oleum chymistis efficacissimum trahitur, fumo eius ardentis in campanam vitream recepto, in oleum concreto, & in catinum subiectum destillante: sed quia ex multo sulfure paucum ascendit, pretiosum est: fit & aliter.

Sulfur iidem sublimâdo (vt illi appellant) purgatissimum & clementissimum efficiunt, etiam pretiosum eadem de causa. Cuius vsum non est quòd vereare quorundam imperitorum exemplo: cùm Galenus viuum Sulfur impurissimum diamo

diamoro stomatico medicamento ad digerendum misceat, bis lib. 6. comp.ph.part. Nocet Sulfur achoribus: quia plus quàm par est, eos calfacit, & digerit. *Lib.1.c.ph.p.*

Alumen ab astrictione vehementissima Græcis *συνήρη* dicitur, crassarum est partiū, maximè liquidum, & Placites & Plinthites dictum à crustæ & lateris forma: minus strongylon & astragalotes, id est, rotundum in astragali modum: minimum schistum, id est, scissile non in fila sed digitis friabile. Omne alumen in aqua soluitur, & igni liquefcit, tardius scissile, quod sine bullis tandem mollescit, idem aquæ innatat, linguæ & cuti integræ est mordacissimum, adulteratur segmentis lapidis amianthi: sed hæc acrimonia carent, & ex pingui aliquo ardent rediuiuo corpore, aqua merguntur, & integra manent, in filaque dissiliunt. Alumen scissile colore candidum & præstantissimum, idem tenuius & vtilius, lib. 6. comp.ph.part. Et quia rarum inuentu, carius: liquidum contrâ, crassum & vilissimi pretij, quia in omnibus regionibus inuentu est facillimum, lib. eodem sexto. *Lib.1.c.ph.g.*

Spuma nitri, aphronitrum, nitrum, potenter tergent cuti affricta: sit autem nitrum ex tenuibus partibus constans: quod autem lapidosum est, vrendum ac diligenter leuigandum. *ἀφρόνιτρον* seu *νίτρον* id est, Spuma nitri ab Aphronitro differt, (sic *χαλκὸν ἄνδρ* à *χαλκάνδρ* & *ἀκάνδρ* *λευκὴ* à *λευκανάνδρ* & multa alia similiter) illa enim alba est farinæ triticeæ similis, eiusdè cum nitro facultatis & naturæ, sed essentia tenuioris: hæc autem in glebas coactum & congelatum, amarum, in balneis sordes terget, & ichoras pruritus exci-
tantes digerit. Nitrum præsertim bernicium seu beronicum potiùs. lib. 8. meth. fccat, digerit: sumptum autem in corpus incidit, tenuat crassos & lentos humores multò potentiùs quàm sal: amarum enim est, cap. 3. lib. 4. simpl. vsum verò tenuitatem substantiæ adeptum spumæ nitri proximū est. Nitrum rubrum lib. 9. comp.ph.part. Aphronitrum magis quàm hæc incidit, stomacho inimicum est, ob id non de-
uoratur, nisi grauius vrgeat necessitas: Nitrum verò sumitur, & aluum subducit. Omnia hæc hodie desiderantur, quorum loco supponunt officinæ salem petræ purgatum, in pa-
nes coa

*Gal. in disposito-
litico.*

*Lib. 4. fauit.
tuend.*

nes coactum. Id mentiri satius esset cineribus betæ, brassicæ, & aliorum nitroforum.

- Lib. 9. simp.* **S**Al, tam fositius, vulgò sal gemmæ, quàm marinus, terget, astringit modicè, validè siccatur, digerit, lib. 6. comp. ph. part. Per se, & cum galla læui attractu iuuat gargareonem inflammatum iam durescentem in scirrhum: non autem initio, neque dum augefcit, aut cum multo calore viget: quòd si corpus sit plethoricum, aut saltem caput plenum, si initio adhibetur inflammato gargareoni, extrema laboranti noxa infertur. Sal astringit magis quàm tergeat: siccatur autem non minùs quàm nitrum, aut nitri spuma: sed hæc non astringunt, ob id ceratis mixta vlcerum sordes tergent: Sal ob astrictionem id non præstat. Sal Armeniacus terget, subacer est, leuissimè astringit, humores acres in superciliis inspersus confumit, à quibus pili malè nutriti excidunt. Hammoniaco sali similem forma schistum lapidem docet Dioscorides. Sal Hammoniacus valenter digerit, lib. 6. comp. ph. part. noster tam nigricans quàm albicans factitius est.

- Antimonium.*
Lib. 9. simp. **S**Timini, id est, Stibium siccatur, astringit, oculorum collyriis liquidis & siccis miscetur, illorum valenter astringit, lotum soluitur, & naturam assequitur propè rosionis expertem, fositium melius. Quod enim ostèdunt, igni coctum est, id què purius, vel fæculentius & scoriosum. Oleum ex Stibio pretiosissimum. Mulieres oculis gratiam Stibio conciliant, ipsum palpebris specillo inducentes quotidie, sic ne oculi membranam intus contingant.

- Lib. 9. simp.* **C**Hryfocolla tam metallica quàm factitia, valenter digerit, & siccatur, carnem liquat sine valenti morfu. Chryfocolla, Spodium, Pompholyx, Psoricum, metallica sunt admodum tenuis essentia citra calorem. Nostra omnis est factitia, aurique ferrumini fundendo celeritatem addit, vnde illi nomen.

- Lib. 9. simp.* **C**Ypsum siccatur, vt cætera terrea, emplasticum est: cogitur enim ac lapidescit liquore aliquo vt albumine maceratum, sanguinis eruptionem cohibet, cum tenui farina pilis leporum

porum vel similiter mollibus exceptum : vstum minus est emplasticum, tenuium partium, siccius est, ex oxycrato repellit. Nostrium verò Gypsum, vti calx, vrendo emplasticum magis euadit.

PVmex sarcoticis miscetur, dentes polit, facultate deterforia, & asperitate vt smiris, testæ, cornua animalium vsta: vstus tenuiorum fit partium, & acrimoniam sumit, quam lotionem deponit. Nunc scriptoribus propè solis ad papyrum expoliendam cum gummi iuniperi est vsui. *ibidem.*

CYanus hic aut hæc, acer est, cathæreticus, id est detrahens, digerit potentius quàm Cinnabari, & subastringit. Vim purgantem melancholiam suprà & infrà, ac melancholicum succum ipsi illoto præbet Mesues communem cum lapide Armeno, ob id ambos valere censet aduersus omnes melancholicos affectus, maniam, melancholiam, epilepsiam alteram, elephantiam, caneros, alphos nigros, quartanas, hæmorrhoidas. Sed & alias ei vires miras tribuit, vocatq; lapidem lazuli & stellatum, quòd velut stellæ quædam aureæ in eius fracturis cernantur. Is vrendo cæruleus magis euadit si verus est: malus verò nigricat vstione. Tam hic quàm sequens nostratibus medicis in vsu hodie sunt rarissimo. *ibidem.*

ARmenius lapis illotus suprà & infrà atram bilem vacuat datus à drach. vna ad scrup. quatuor: lotus autem etiam quinquagies tutior est, ac tantum infrà vacuat à scrup. quinque ad scrup. sex, Alexander Trallianus in melancholia, & post eum Mesues in simplicibus.

Dentalem lapidem addunt, qui dens piscis alicuius videtur forma & interna cavitare. Antalem addunt nescio quem, & vnde dictum.

CAlx viua vehemèter vrit, adeò vt crustas efficiat, & mox vbi est extincta. iam diu extincta non est caustica amplius, sed calida sicca: carnem tamen liquat: lota ter quater sine morfu strenuè siccatur.

DE LAPIDIBVS.

*Gal.li.9.simpl.
et li.10.c.ph.p.*



APIDES in spongiis reperti, triti, ex vino poti, lapides renum rumpunt, non autem vesicæ, quia tenuioris sunt essentiæ sine insigni calore. Vesicæ autē calculos rumpere scribit Dioscorides, si ex vino bibantur.

Lib.9.simpl.

IAspis virens stomachum & ventriculum tactu suo iuuat. Omnes Iaspidum species femoribus appensæ partum accelerare traduntur Dioscor.

Lib.9.

SApphyrus potus istos à scorpione iuuare creditur, intestinas vlcerationes potu emendat, Dioscor.

Lib.9.

LApis Iudaicus, qui in Iudæa nascitur leuissimè tritus potus renum lapides frangit, addunt quidam & vesicæ. Pueris datus cum lacte, vrinalia & intestina purgat. Est nobis multus Dioscoridis elegantem picturam explens.

*Lib.9.simpl.
Geet Gallis.*

GAgates lapis colore atro, odore dum vritur bituminis, siccatur, glutinat, digerit admotus, in corollis precariis & falinis frequens.

Lib.9.simpl.

MAgnes siccatur hæmatitæ modo, & astringit, ad enterocelen vtiliter sumitur, & admouetur. Magni est miraculi in eo tanquàm mundo aliquo polorum cœli rationem inesse.

Lib.9.simpl.

Hæmatites à sanguinis colore dictus, frigidus, astringens, ex crescentia reprimat, oculorum vulnera persanat, sanguinis expuitioni valet, siccatur humores, sed minus quàm cadmia. Nam ex humida substantia non terrestri constat, & super eodem medicam cum liquore tritus, in succum soluitur: per se verò in corpus simile minuitur, ut schistus lapis, non in fragmenta terrestria, ut cadmia.

Lib.4.c.ph.p.

Schistus lapis hæmatitæ vim habet persimilem, sed infirmior.

Smiris terget, dentes puros in dentifricio efficit, & eo annularii scalptores expurgant lapides: ad erodendū & vrendum utilis. Nunc in vsu est vitrariis laminas vitreas diuisuris.

PYrites lapis de quo æs perficitur, æris aspectu scintillas leui percussu edens: crudus & coctus calfacit, terget, digerit. Validæ autem est facultatis, Gal.lib.9.simpl. Marcasita æris quibusdam dicta putatur.

E cote

Ecote Naxia quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit Dioscorides.



PYropus lapillus, id est, Rubinus, plurimus est in insula maris Indici dicta Zayló, Ludouicus Romanus Patritius.

ERanus lapillus in Euphrate inuentus, Turchica vulgò, Ludouicus Romanus Patritius.

COrallus lapis Actuário dicitur, λιθόδενδρον aliqui vocarunt, fruticis forma cinnamomi æmulus crescit ad promontoria in mari, astringit & refrigerat, contra sanguinis reiectiones magnoperè efficax. Rubrum & nigrum tantum facit Dioscorides, albus tamen etiam visitur citra visionem.

AEtites lapis veluti prægnans, cum quatitur alio in vitro sonante, grauidis continet partus, Diosc. Id vsu quotidiano probatū Gallis est sursum alligantibus: cum verò partum iuuare volunt, foeminibus adhibent, tanquam foetum ad se trahat, vbi vbi fuerit.

Lapis Aquila.

AMianthus lapis è Cypro alumini scissili similis, quique pro eo propè solus venditur. Ex hoc telæ còtextæ flammis iniectæ ardent sed flâmis inuictæ splendidioreseunt. Ellychnii loco hodie ad ostentationem lychniis adhibent, & ob id Ellychnium immortale vocant, Menche sans fin.

Sigillum Lemnium efficacius sanguinis ex quauis parte eruptiones cohibet, quàm Samius Aster: hic contrà tenax & viscosior, quàm Lemnia terra: ambo moderatè tergent. Lemniæ etiam adstrictio quædam inest. *μύλη & λίμνια*, lib. 7. comp. ph. part. in arteriace 14. Andromachi. Ea nobis est vera Constantinopoli delata.

Cimolia terra digerit, siccat sine morfu, maximè si elota sit. Eius loco vtimur hodie ferri & molæ retrinentis in subditam aquam congestis, quod à Cimolo insula è Cycladibus vna non afferatur.

CRetica terra admodum imbecilla est, multum aëriæ habet substantiæ, terget sine morfu, ob id vasa argentea etiam polit. Creta nobis hodie dicitur.

Lib. 9. simpl.

A Armenia terra colore pallido vel luteo, promptissimè in summū leuorem calcis modo soluitur pistillo, aut quouis liquore mista, arenosa substantia caret, summè siccatur: ob id est optima sanguinis expuitioni, dysenteriae, ventris fluori, catarrhis, & fluxionibus à capite in thoracem, & inde nascenti asthma, & phthoæ, quia vlcus in ea siccatur, & tussim sedat: vlceribus etiam putribus oris, fistulis ani remedio est. Et in pestilentia Romæ maxima, quotquot bolum hanc Armeniam biberunt, celeriter curati sunt. Quibus autem, utpote incurabilibus, non profuit, omnes interiire, à nullo alio adiuti. Bibenda ex vino albo consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè febris careant, aut ea levis sit: sin grauis sit, multum diluto: quanquàm pestilens parum calet. βῶλ & ἀρμενίη & πύλον, id est lutum, ἀρμενίον Actuar. sæpe.

Lib. 1. c. ph. g.

Lib. 11. simpl.

A Sphaltos hic aut hæc, lib. 1. antidotorum, id est, bitumen, verum est nigrum & splendescens: dum aquis innatat, molle: cū siccatum est, pice sicca durius efficitur: calcificatur ordine secundo. Optimum est ex mari mortuo, stagno falso in Cœlosyria.

Ioannem Baptistam Montanum Veronensem medicum egregiam nauare operam in medicamentis metallicis etiam arte chymistica parandis, Simon Thomas medicus longè doctissimus Georgii de Seluæ Vaurenfis Episcopi vnde quaque absolutissimi, affirmavit.

DE ANIMALIBVS, ET EORVM PARTIBVS.



SANGVIS hirci quadrimi, bene habiti, aliquandiu nutriti vino albo, fœniculo, fœfeli, lauro, & cæteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulari, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, testuslinteo raro, sole siccatus, etiam cum myrrha, foliis lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur Tralliano, Auicennæ, & cæteris practicis. Huic quamdiu ab animali calet, coquendi abscessus vim tantum tribuit, Gal. lib. 10. simplic. qualem caprino, taurino, & cæteris calidis humidis modicè. Quòd si hircinus sanguis adamantem frangit,

git, sed calidus tantum ab animali: sic lapidem calidus tantum epotus fregerit. Quod & sanguinem vulpinum ex vena secta potum præstare audio. Ne autem coaguletur, Xenocratis exemplo, miscere possis acetum feruefactum aut coagulum. Hirci quoque, capri, cerui, leporis, sanguinem sartagine frixum, dysenterias & celiacorum profluuium sistere tantum docet Dioscorides, non addit calculum frangere, quæ vis tenuibus conuenit, cum dictorum animalium sanguis substantia crassa & terrea, & cum calore siccatoria dysenterias sanet. Sanguis ex secta vena sinistra profluens lieni affecto infricatur Archigeni, lib. 9. comp. ph. part.

*Gal. lib. 10. in
sang. vesper-
tilionis.*

Sanguis Draconis veterum, & Cinnabaris vera, hodie ignorantur: qui verò sanguis draconis ostenditur, factitius est ex sanguine hirci, bolo Armenia, & succo sorborum, vel aliis. Quo tamè rectius uti possis, quàm cinnabario neotericorum, ex sulfure viuo, & argento viuo simul vstis, loco cinnabaris Græcorum, quæ vires habebat easdem cum hæmatite lapide, & tam rara erat etiam ætate Dioscoridis, ut versicoloribus pictorum lineis vix satisfaceret.

*Δράκοντος αὐτὸ
Δράκοντος καὶ
λούμνον αἵμα
ἄκταρ.*

LAc lauat, terget ferò, emplasticum est butyro & caseo: ob hæc acres & mordaces fluxiones obtundit, recens utendum. Butyrum, & Caseus etiam veterata vsurpantur. Butyrum etiam minimum terget, ut decoctum glycyrrhizæ: coquit item & digerit, bubonas, parotidas, oris phlegmonas in pueris & mulieribus, gingiuas puerorum cum dolore dentientium crebro illitu tenuat, quantum mel: idem lacti canino, & leporis cerebello tribuit Archigenes. Expuitionem Butyrum promouet [maximè cum melle aut saccharo] in pleuritide & peripneumonia, quos affectus etiam coquit.

*Lib. 10. simpl.
Lib. 7. c. ph. p.
Lib. 5. c. ph. p.
& lib. 11. simpl.
de leporis
cerebro.*

Caseus recens refrigerat, repellit, siccatur, vulnera etiam magna glutinat. Ex vetustate verò acer, cum pernæ decocto subactus tophos eliquat & aperit.

Coagulum omne ex lactis in ventriculo primo corruptione acre, digerit, siccatur. Lac aut sanguinem in ventriculo coagulatum dissoluit: leporinum omnium est præstantissimum. Quis igitur menses immodicos cum Practicis & Medicorum vulgo queat sistere, cum calidum sit vitandum, ubi sanguis fluit, aut fluxurus est?

Aph. 19. lib. 15.

Gal.li.ii.simp.

Adeps seu Pinguedo omnis calfacit, humectat magis vel minus, pro varia animalium natura. Leoninus calidissimus, siccissimus, id est, minimum humidus: potentissime omnium digerit ob acrem multamque caliditatem, & partium tenuitatem, ob id scirrhis & inueteratis tumoribus tantum aptus. Pardinus ei proximus, pardino vrsinus, taurinus vrsino vicinus, sed tanto quam suillus calidior siccior, quanto minus leonino est calidus ficcus: ab utroque enim ex æquo distat in amborum medio constitutus. Suillus autem omnium propè humidissimus. Caprinus, præcipuè hircinus, crassior taurino, ob id celerrimè concrescit. Inter taurinum & suillum fuerint vulpinus alopecias sanans, caninus, melinus, felinus, cuniculinus, camelinus, equinus, vaccinus, vitulinus. Anserinus maximè tenuium partium, ob id in volucrum genere præstat ad scirrhi curationē: gallinaceus illi proximus. Adeps humanus omnium est temperatissimus. Iidem vetustate calidiores & sicciores euadunt, ut oleum, mel, vinum. Reponitur aut incuratus, lotus, siccatus in umbra, vel exemptis pelliculis fusus sole vel igni in vase duplici. Adeps cerui nullo medicamentorum mollientium est inferior, lib.i.cōp.ph.g.

Gal.li.ii.simp.

Medula calfacit, rarefacit, emollit, scirrhus quarumvis partium, præcipuè ceruina, & post hanc vitulina. Taurina, hircina acrior & siccior est. Recens utilior est, sed etiam reponitur, ut adeps. Vtraque fumatur hyeme, vel æstatis exitu, cum appetit autumnus, Dioscor. Loco sicco & edito, & septentrionem spectanti reponitur, cum foliis lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant: quæ iniuria in locis humidis meridiem spectantibus eis accidit. sunt qui reponant bifariam adipum modo.

Cerebella Passerum vere vel autumnis captorum prolificis remediis miscentur, vel recentia, vel cum vitello oui & melle, siccata sole vel cinere calido.

Lib.ii.simpl.

Ossa præcipuè humana vsta admodum digerunt & siccant. Eadem nescientibus ne auersentur, pota epilepticos & arthriticos multos sanarunt. Sed epileptico os bregmatis, arthritico articularum ossa exhibendum censent practici sexu etiam

etiam obseruato. Os cranii humani donec albescat vstum
potum epilepticis succurrere hodie est certissimum.

Os à corde cerui humanum cor totius substantiæ simili- *Arist. cap. 4.*
tudine roborare Actuarius cum Arabibus consentit: sed ab *libr. 3. de par.*
aliorum animalium maiorum corde potius fuerint, quæ tam *anim. Gal. lib.*
multa proferunt pharmacopolæ, quàm à corde cerui. An ve *6. vsus partiũ.*
rò cartilaginosa hæc substātia magis præstare id queat, quàm
cordis aut arteriarum corpus, ipsi viderint.

Os Sepiæ dentificiis aptissimum.

EBur tota substantia cor roborare, & conceptum iuuare,
practicis scribitur, frigidum siccum primo gradu.

Cornibus cerui & capræ vstis, & (si opus est) lotis vtimur *Lib. 11. simpl.*
ad dentium candorem, gingiuas mollitie fluidas, dysen- *Lib. 4. c. ph. p.*
teriam, fluxiones in oculos, oculorum vlcera, quia tergent si-
ne rosione: tamen nec dolorem leniunt, nec coquunt quia fri-
gida sicca.

Cornu Rhinocerotis hodie frequenter vtimur contra di-
cuitum affectus pestilentes, aut venenosos, aut dysente-
ricos, & puerorum nobilium lumbricos. magno enim ob ra-
ritatem emitur. Quin & aqua, in qua huius cornu portio ali-
quandiu maduerit, pota idem præstare probatissimum est.

Mumia nomen & res barbara, hominum scilicet liqua-
men aloë, myrrha, balsamo in sepulcris conditorum,
calida sicca tertio gradu, astringit. Serapionis autem Mumia
est Pissasphaltus, id est, pix cum bitumine Iudaico, quia hæc
duo redolet Dioscoridi.

Tunicam interiorem ventriculi secundi gallinarum mi-
ro quodā modo lotam & siccata & potam stomachi-
cis augere coquendi facultatem: & ventrem mergi, vel recen-
tem elixum vel siccatum & sumptum, falsum esse expertus
est Galenus. Vnde subit admirari in ea hæresi falsa medicos *Lib. 11. simpl.*
omnes etiam hodie permanere. Putant, opinor, eam vim illi
esse, quod ea similis sit tunicæ internæ ventriculi nostri,
sed vi tanta coquēdi prædita, vt lapillos conficiat: sed æquius
fuerit, eam tunicam ex struthiocamelo sumere, quippe cui *Pl. ca. 1. li. 10.*

mira sit natura coquendi, quæ sine delectu deuorarit, vt ferum & ossa veruecum integra. Vnde & pelles eorum cum plumis mollioribus concinnatas stomachicis applicant. An non vident harum pellicularum temperamentum vitari siccatione, & vim illam coquendi viuissimam inesse, non superesse mortuis: nec fortasse pellibus illis insitum, sed potius à carne multa crassa densa pelliculam hanc vndique ambiente?

Lib. 11. simpl. **I**Ecur lupi in medicamentum ex eupatorio hepaticum sæpe indidi, nec multo efficacius ob id comperi. Hepaticos tamen ipsum tota substantia iuuare sufficiens se habere experientiam scribit libro 8. comp. ph. part. Puluerem quoque ex eo in hydropo cum vino albo in dies aliquot mane potum, inter secreta quædam remedia reponunt nonnulli.

Hepar tamen vulpis aridum ex oxymelite potum splenicis imperat Archigenes apud Galenū, lib. 9. comp. ph. part.

Splen onagri aut equi syluestris tostus & tritus idem ibidem pollicetur. Hepati calido sicco salubre existimo hepar raia, cithari, id est, rousselæ, & hepati, id est, aquilæ maris, & si qua sunt alia in piscibus similia.

Gal. lib. 11. sim. pluc. **P**vlmonem vulpis siccatus potumque asthmaticis Galenus, phthificis vero ob eandem totius substantiæ familiaritatem saluberrimum omnes prope practici inculcant. Plura de his in libro sequente de ratione medicamenta componendi leges initio, vbi facultates composituro noscendas declaramus.

Gal. lib. 11. sim. pluc. **R**enes scincorum, crocodilorum terrestrium, tanquam pendendum ad venerem intendentes quidam bibunt: alii sumen quoque & caudam assument: vnde compositio est Actuario diascineu.

Lib. 11. simpl.
Lib. 3. c. ph. p.
Diosc.
Lib. 11. simpl. **C**astorium, seu testes castoris calfaciunt, siccant, sunt tenuium valde partium, coquunt dispositiones contumaces & scirrhasas. Eligendi qui ex vno principio committuntur, & quibus est intus liquor cerosus, friabilis, odore grauis & virus olente, gustu acris & mordaci. Ex quibus duobus suspicari possis, substantia esse nobis aduersissimos: nulli autem vel admotum vel sumptum est perniciosum castorium.

Lutræ

Lutræ animalis fibro similis testes idem pollere addit Herm. Pontici castores sunt præstâtissimi, quod & Virgilius innuit lib.1. Geor. vbi virosa Pontus castorea mittere dicitur. Nec *Bieure, fiber*
 inepti qui ad Matronam Galliæ fluuium crebrò capiuntur, *metathesi di-*
 mirabili spectaculo animalia, cauda piscosa, soleæ æmula, pi- *ctus Plin. ca. 30.*
 lo supernè canino: alibi Lutræ pedibus anterioribus anseris, *libr. 8. & cap.*
 sed vngatis, simiæ posterioribus, auribus minimis, rotundis, *2. lib. 32.*
 dente validissimo, adunco, prælongo, seta oris cornèa, archi-
 tectura in fossa sua mirabili. Castorium nigrum foetidum,
 rancidum, die vno necare affirmat Auic. Castorium è Persi-
 de fermè adulteratum ad nos defertur: syncerum enim tan-
 ta vi odoris est præditum, vt olfacienti vesicam castorii, san-
 guinem è naribus eliciat. Persæ autem adulterandis rebus *Ludonicus Ro-*
 sunt exercitatissimi. Seruatur annis decem. *man. Patr.*

Felle animalium ob acrimoniam & calorem solo vix vti-
 mur, præterquam ad aperiendas hæmorrhoidas, sed col-
 lyriis, trochiscis, aliisq; remediis miscemus. Fella piscium ocu-
 lis sunt tutiora, vt eorundem hepata sicco hepati salubriora. *Lib. Tobie.*

Sordes gymnasiarum & balneorum colligi desierunt, his
 stamen multò efficacior ad digerendum est aurium sor-
 des planè biliosa.

Oesypus est succidarum lanarum pinguitudo, calfacit, *Diosc.*
 explet vlcera præsertim sedis & vuluæ, ac emollit. *ὄσσυ-
 πον & ὄσσωπον ὑγρόν* apud Paulum aliquoties legitur, vnde
 opinor practicis cōsuetudo appellandi hyssopum humidum,
 pro œsypum, volētibus ab hyssopo herba separare: *ὄσσω*
 autem Galeno cum Diosc. semper dicitur. Lana succida &
 fordida contusis utilis ob œsypū: lota verò est vice linamenti
 carpti: vsta autem acris calida sicca, tenuium partium. *Lib. 11. simpl.*

Stercus canum & luporum, osibus, ac puerorum pane, &
 lupinis triduo educatorum, Galenus ceu certissima mul-
 torum affectuum remedia prædicat: ob id sicca sunt seruan-
 da in vsu medicorum.

Moschus Aëtio, Paulo, Actuario, Arabibus animalis Ga-
 zelle dicti dorcadi similis, est pus in vmbilico maturū,

Dioscoridi & Galeno incognitus. Cætera aperte declarat Ruellius, calfacit, siccatur, ordine tertio Simeoni: tenuiū est partium, odore aromatico, spiritus instauratur, imbecillas partes, cor firmat, lipothymiam & vires resolutas sanat, ob id compositionibus multis analeptici miscetur: quibusdam mulieribus uteri præfocationem affert, aliis in pectore contra hanc mirè prodest, utero valde gratus, ut cum oleo cicino inunctus pudendo, venerem excitet. Melior est subflauus, quàm nigricans, & qui pelui humectatæ immixtus leuior euadit, quàm qui grauior. Indicus est melior Aphro. Ex Catay tamen niger præstantissimus hodie affertur. Citrinum Auicēna præfert hodie incognitum, nam ferrugineus est. Quibusdam male olet, aliis caput frigidum iuuat, calidum ferit, & in eo epilepsiam excitat, pallore corpus inficit, odore in humido crasso perennante viuacissimus. Serapio cōtrā scribit, cerebrum calfacere, siccare, roborare.

Serapio.

Vulpes tota in oleo percocta oleum facit vulpinum.

Cancrorum fluuiialium vstorum cineris drachmæ duæ cum drachma vna gentianæ ad morsum canis rabidi datur Astuario, in diacarcino antidoto. Idem Gal. lib. II. simplic. ubi partibus decem cineris cancrorū addit partes quinque gentianæ, & thuris partem vnam. Cancrorum caro ex lacte, vel lacte ebutyrato cocta, hæcticis analeptica est.

Gal. li. 7. c. ph. par.

Aselli sub aquariis vasis delitescentes in vase fictili super prunas tosti donec albescant, triti melle cocto excepti dantur mistri mēsurā, (trium cochlearium Aēt.) ante cibum in spirandi difficultate ab Asclepiade, tanquam extenuandi & digerendi facultate præditi. Qua verò notione ad ipsorum usum venerit, explicatu difficile est.

Lib. 2. cō. ph. p.

Oleum decoctionis eorundem capiti perflusum dolorem eius diuturnum à frigore aut crassis humoribus sanat.

Cantharides probantur in frumento inuentæ versicolore, & quæ luteas in alis transuersas habent lineas, corpore promisso, crasso, blattarum modo præpingues, inertes, ac imbecillæ: quæ vnius sunt coloris. enecantur vapore aceti per lineum,

lineum vasis, in quo sunt, operimentum. Totis vititur Gale- *Lib. 11. simpl.*
 nus ad psoras, lepras. Hippocrates caput & pedes aufert, li- *Gal. in theria-*
 bro de fœminarum morbis. Hæ vesicam vlcera solæ, vre- *ce ad Pis.*
 ticis autem salubriter miscetur.

M^{Εαφα ὤμων} Aët. id est, Sericum crudum, minutim conci-
 sum, tritum, spiritum & sanguinem purgare, virtutē
 vitalem roborare creditur Serapioni & aliis: eius infusi ex-
 pressum idem præstat, vt ostendit diacoccon cōpositio. *Cōfectio alhe-*
 Sericū propriè quod arborum foliis Seres Scythiæ populi de- *mes.*
 pexebant ad vestes, Græci recentiores etiam ad serum, id est,
 bombicum vermium fila transtulerunt: quæ etiam Setæ à se-
 tarum equinarum forma dici possunt. Gosopium autem est
 coto dictus Bombasa Italis. Sericum putat Musa frigidum,
 vt folia mori, quibus vermes nascuntur, nec roborare cor cum
 Serapione & Auicenna, quia inodorum est. Chermes idem
 ex herbæ similis bipinnellæ radice excauata capi in Polonia
 sæpe, rem à cocco baphico diuersam, quo charmesinus color
 floridus tingitur, non autem cocco: tingitur autem cum alu-
 mine, galla, & aliis, ob id pannus ille non capiendus, sed po-
 tius coccus, quem Arabes Chermes vocant. Coccus astrin-
 git, abortum prohibet.

Cinis recens hirundinum in diabefasa recipitur. Pulli *Lib. 6. c. ph. p.*
 hirundinum cum pennis in fictili super prunas vsti dia- *Gal. lib. 6. cap.*
 chelidonium stomaticum ad anginas Andromacho faciunt *ph. p.*
 apud Galenum. Hirundinum stercus acre & digerens, vt
 aliorum animalium, magis, minus.

B^{λάτις & βλάτιον βύαντες} appellatur Actuarius in au-
 Brea Alexandrina diamargarito calido. Vnguis odoratus
 vel aromaticus, lib. 1. comp. ph. part. conchylii tegumentum
 odore in castorium quadatenus inclinante suffitus gratia ad-
 hibetur, Diosc.

VNiones seu Margaritæ velluntur ex quodā concharum
 genere læui, minimos ex mytutorū cōchis extrahi. Cor
 roborare, & putredini circa ipsum resistere creduntur, frigidi
 sicci. Ob hæc remediis imbecillorum febricitantiū, pestilen-
 tium,

tium, miscentur integri potiores his, quos ars pertrudit.

Lib. 11. simp.

Viperarum caro siccat, valenter digerit, mediocriter calfacit. Vis eius ad cutim properat, & ad eā expellit corporis excrementa, à quibus in multum cacochymis ingens numerus pediculorū prouenit, & à cute velut squamma abscedit, et decidit epidermis, ad quam protrusi sistuntur crassi & terrosi humores, à quibus psoræ, lepræ, elephantes nascuntur. De his plura in theriace dicemus.

Ex prædictis aromata sunt, amomum, cinnamomum, cassia, calamus odoratus, nardus Gallica & Indica: partes balsami, crocus, folium, foliū malabathri, ladanum, aspalathum, id est, xylaloë, macer. Addunt recentiores tanquā pretiosissima, ambram, vnguem odoratum, caphuram, cubebas, doricum, galangam, caryophylla, moschum, macis, nucem moschatam, santalum triplex, cornu monocerotis, zedoariam.

In his quæ odorata magis sunt, in suo genere præstantiora censentur, vt Galenus in antidotis. Sapore autem si explorabis, ne multa continenter gusta, sed vel os intereā abluere, vel papyrus mande, vel tempus interpone, donec prioris aromatis sapor exoleuerit, vt non prioris reliquiæ indicium tibi falsum afferant posterioris aromatis. Hæc cum sint essentia tenuis, celerius exanimantur, præsertim aëre calido, parum fideliter operculata & inuoluta, aut etiam iam comminuta. Ob id vtenda cum vegetissima sunt, nondum verò cariōsa, foraminulenta, exoluta, & emortua.

Ex his item purgatoria sunt, Agaricus, colocynthis, cucumer agrestis, elleborus vterque, tithymalli, & aliæ multæ lactariæ, daphnoides, opopanax, polypodium, sagapenū, sarcocolla, dracunculus, scammonium: & quæ Arabes ac neoterici addiderūt, euphorbium (huic enim nec Dioscorides, nec Galenus vim purgatricem tribuunt) cassia fistula, myrobalanus quintuplex, hermodactyli, lapis Armenus Alexandro Tralliano, & cyaneus, manna, rha barbarum, tamar Indi, turbith, senna & alia quædam Mesuæ tradita.

Hæc autem purgatoria quā prædicta omnia maiore cura & studio deligenda, reponenda, nec ita diu seruanda, vt deteriora

teriora euaserint. Adhæc quæ in horum quibusdam vis est malefica & vehementior, est mitiganda.

Ablutione, in Aloë & cæteris.

Formatione in Trochiscos, in Agarico, Colocynthide, Sagapeno.

Infusione, in Myrobalanis omnibus.

Coctione, in Malo cydonio & maxa in Scammonio: in Malo citreo & maza in Euphorbio.

Mistis aromatibus, vt Spica nardi cum Rha barbaro, quam si omiseris cum Medicis Parisiensibus, nihil peccaueris, quod fatis sit mite Rha barbarum, nec Spicæ viribus magnoperè egeat. Turbith, zinzibere, vel spica, vel mastiche: hæc enim malefica omnia corrigunt.

Affatione, aut ficcatione in sole, in squilla.

Iure Capi vel Galli veteris, vel vino musteo, in Senna, Polypodio.

Sorbitione aliqua medicamenti, præsertim valentioris, reliquias detergente & extrudente, vt iusculo carniū, pisorum, aqua hordei mellita vel saccharata, vino, oleo, in cucumere agresti, & scammoniatis.

Alia in his mitiora domari non postulant, nisi si quando morbum aliquem corporis auctura videntur: ob id casisæ fistulæ in fluore alui misceatur mastiche, vel aliud stomachicū.

Tamar Indis in ventriculi intēperie frigida miscemus calida stomachica. De his omnibus plura toto propè lib. 3.

Cætera ad purgantium medicamentorum naturam pertinentia fusiùs hîc eram declaraturus, nisi Ioannes Tagaultius Parisiis Doctor Medicus longè doctissimus, eam ipsam operam ex Mesue, & aliis eius rei peritioribus nobis diligenter contulisset.

Simplicia alia Dioscoridis, Galeni, & aliorum plurima, hodie parum cognita, fecissem notiora & certiora, nisi hac gloria merita Gulielmum Pelissierium Episcopum Monpessulanensem, doctissimum, diligentissimum, integerrimum, fraudare noluissem. Adde quod ea hoc loco potissimum tractanda censui, quæ in describendas postea cōposiciones frequentius recipiuntur, vt ex cognitis simplicium viribus, totius facultatem lector intelligat.

F I N I S.

METHODVS MEDICAMENTA COMPONENDI

ET AB ALIIS COMPOSITA EXPENDENDI ac iudicandi, quibus affectibus

medeantur, & an quod titulis pollicentur, præstare possint,

Liber II.

*



OMINES cùm simus, errare non est difficile. Hinc Archigenes priorum errata quædam coarguit, & Galenus Archigenis. De Galeno aut dicere ausim, quod is de Hippocrate passim inculcat, scriptũ scilicet esse ab eo nihil perperam. Nos verò Galeni umbrã vixdum assequutos medicorum propè reliquorum conditionem subire nõ fuerit mirum: sed lectorem rogamus, vt quicquid laude dignũ in his laboribus nostris commendarit, Galeno præcipue tribuat, vitia autem nostro assuat capiti. Quamquã si quid iudico, aut nulla sint, aut perpauca, & quæ nos fugerunt: nisi nasutus aliquis calumnietur, multa sæpe hîc exempla congeri, nulla vel utilitate, vel necessitate: interdum ea desiderari. Præter hæc illa passim non magis cohærere, quàm sine calce arenas. Sed id vitio non verterit, si institutum nostrum intellexerit fuisse, vt hæc tanquã idonea rei propositæ testimonia etiam vt in manum venirent scriberemus: aliquando tamen ordine certo digestissimus, vbi ordini erat locus. Neque enim Hippocratis Epidemia, tanquã scopas dissolutas, sparsa & interhiantia exempla quisquam damnarit, ex quibus tamen ille tam diuinos excerptit aphorismos, & prognostica Medico maximè necessaria. Quomodò ex his exemplis nostris vniuersalia illa theoremata ad componendi rationem maximè necessaria colligere possis, aut hæc per illa inducendi methodo comprobare. Quòd si non videantur ad plenum absoluta, quæ ad medicamenta componendi methodum pertinent, cum anni posteriores docta & elaborata magis

gis afferre cōsueuerint, tum virorum doctorum animaduersionibus admoniti, tum iudicio lectione Galeni plurima firmando, meliora aliquando reddemus. Methodus verò medicamenta componendi hunc habet scopum, vt siquando librum consuetorum nobis medicamentorum compositiones scriptas cōtinentem perdiderimus, perditis similia possimus componere, ex formula quadam mutationis ad propositi inuentionem nobis cognita, quam multis particularibus compositionibus exercuerimus. Non modò autem rectè pharmaca componere docet hęc methodus, sed etiam præstat, vt quę à veteribus medicis sunt scripta composita medicamenta, promptè expendamus, & his omnibus etiam citra limitationem pronuntiatis, commodè vtamur. Melius enim est, maiorum experientis probata medicamenta à nobis sumi rationem his vtendi scientibus. Empirici verò cū ignorent, qua ratione composita sint pharmaca singula, perditis descriptionibus, alia componere non possunt. Quòd si naturam scirent affectuum curandorum & eorum magnitudinem, & methodum cognoscerent inueniendi vires simplicium medicamentorum, & curationis scopum, non desiderarent modum curationis & compositionis. Hunc autem laborem eo nomine sumpsimus, vt Galenum à calumnia liberaremus, quem falsò insimulant sues quidam stolidi, quòd operibus de compositione medicamentorum *κατὰ τὸν δὲν ἡγεῖ γένει* catalogum tantum compositorum à se & aliis medicamentorum recenscat, sed componendi rationem nusquàm libris prædictis tradat. Probamus enim hanc methodum ceu animam quandam locis probè omnibus interspersam. Quam rem vt tibi verissimam esse magis persuadeas, loca indidem signauimus hīc quàm plurima: addidimusque libros illos Galeni, si quis indidem relegerit, esse dignissimos, qui à medicis in vsu frequentiore habeantur. Ex his item & aliis non paucis probabimus aliquando, neque Galenum fuisse, neque Galeni studiosos esse operum Medicorum, seu, vt cum illis loquar, praxis imperitos. quod vitium Arabistæ quidā impostores Medici nomine indignissimi, & Galeno, & Galeni familiæ impingunt: idque imperitis quibusdam pharmacopœis persuadent eò facilius, quòd illi Galenicæ schedas fere auersentur, quia veterum more scribantur, hoc est, purius, & breuius, &
quan

quantum fieri potest, paucissimis simplicibus constantes. Illi verò lucri helluones nihil de ægrorum salute solliciti, ea tantum laudant Medicorum rescripta, quæ sumptuosa sunt ac pretiosa: ob id quòd magna simplicium idē pollentium turba sunt coagmentata: quod Arabistarum istorum publicum est vitium, ægris sæpe noxium, semper sumptuosum, nota certè Censoria, aut paulò seueriore alia castigandum: ea etiam ratione, quòd Auicennæ sui principis dogma deserunt, imperantis parsimoniam medicamentorum potiùs quàm multitudinem, vbi vnicus est nobis scopus, nec multi affectus complicati.

*Initio simplic.
In lib. sanstat.
tuenda.*



MEDICAMENTVM est, quod corporis nostri naturam alterare potest ac immutare prima, secunda, tertia, quarta facultate, seu tota sua substantia, idque ad sanitatem faciendam (nam ad tutandam medicamenti opus nequaquam est) siue ipsum sumatur, siue admoveatur. Medicamēti, verò significationem hoc loco minùs latè fundimus, quàm Galenus, pharmaci etiam deleteria complectentis, quæ nemo rectè medicamenta vocarit, nisi siquando illorum quædam castigata & aliis mista vim ipsorum obtudentibus corpori admoveantur, & quædam horum etiam in corpus recipiantur: quod in compositis medicamentis audies. Simplex medicamentum, cui nulla alia substantia opera nostra accessit: compositum verò cui accessit.

*Lib. 1. phy.
Lib. 1. alimēt.
Lib. 2. sim. c. 13.*

Compositio medicamentorum est ipsorum viribus variorum cum ratione à Medico facta mistio. Qualis naturæ in re eadem perfrequens cernitur, cum pauca liceat inuenire non medicamenta solùm, sed etiam alimenta, quæ substantiis pluribus, sed singulis elementa quatuor sortitis nō consent, iisq; natura diuersis, & plerunque etiam contrariis: vt in aloë substantia est vna terrea, crassa, cruda, frigida, astringens: altera terrea quidem, sed calore interno multum tenuata, amara, calida, cholagoga: sic in Rha barbaro, Alumine, Chalcanto, Chalciti substantiæ insunt duæ contrariæ. In Rosa, Agarico, & aliis permultis etiam tres: sunt & quibus quatuor naturæ insunt. Ceterum hæc omnia Medici vocare simplicia consueuerunt, quemadmodum & quædam verè composita, sed quæ

*Lib. 4. sanit.
tuenda.*

quæ paucioribus constant simplicibus, quàm alià eiusdem generis composita. Hac ratione dia trion pipereon simplex Galeno dicitur, quamvis constet trium pipereon ana drachmis quinquaginta, & anisi, thymi ana drachmis octo. Minus idem fuerit simplex, si zinziberis etiam drachmas octo recipiat. Compositius quoque fuerit, si horum trium pondus duplum, hoc est, drachmas sexdecim recipit. Præter quæ omnia quod compositum dicitur, etiam recipit ami, fefeli, libyfticum, enulam, spicam nardi, cassiam, & alia id genus, quæ ipsum vehementer medicamentosum reddunt. — Sic Actuario & practici Oxymeli simplex & compositum, Oxosacchar simplex & compositum, & alia permulta eadem ratione dicuntur. Quomodo opinor, vena, arteria, musculus Galeno lib. de differentiis morborum partes vocantur simplices & primæ, cum reuera sint compositæ vena & arteria ex fibris & membranis, Galen. lib. de inæquali intemperie : musculus ex carne simplici, fibris neruorum & ligamentorum, venis, arteriis, tunica, Gal. de motu musculorum, & in anatomicis passim. Sed ex paucissimis compositæ partes dictæ, simplices videri queant, maximè compositis organis collatæ. Simplicia igitur medicamenta propriè vocamus, quibus mistio nulla à nobis accessit, etiam si sint ex substantiis natura diuersis composita. Quæ verò minus à nobis composita sunt, catachresticos etiam simplicia vocamus. Composita enim medicamenta nobis hoc loco vocantur, quæ minister naturæ Medicus, ac imitator ex variis simplicibus diuersa pollentibus commiscuit : non quidem tota per tota (id enim naturæ solius, ac Dei munus est) sed per partium minimarum viciniam & contactum nonnunquam tam exactum, præsertim coctione longa, sed blanda, & veluti totius fermentatione, vt à vera mistione parum absit ; mirum ni etiam à nobis mista quædam ægrius separantur, quàm aliqua vi naturæ confusa, vt in lacte, rha barbaro, aloë, & plerisque aliis videre licet. Nec abs re addidimus, miscenda esse viribus diuersa, non autem quæ idem possunt. Quod etiam hodie celebribus medicis in consuetudine est, quum id ad sumptuum magnitudinem magis sit, & remediorum multitudinis ostentationem, quàm ægrorum salutem, aut compositionis vsum. Sed id vitii non recipiendum esse, post abundè docebimus : simulq; excusabimus celebres illos

ac priscos Medicos, si quando in eum errorem incidisse videbuntur.

Dicamus iam quæ maioribus nostris fuit medicamenta componendi non dico vtilitas, sed necessitas. Deinde quæ medicamenta tam sumenda quàm admouenda methodo certa composituro sint necessaria. Post hæc, in quibus medicamenta componendi ratio consistat. Præterea exemplis aliquot celebribus vniuersalem hanc methodum exercebimus. Postremo, qua ratione quis rectè compositis uti queat, perstringemus.

Medicamenta componere Medici sunt coacti multis de causis, quas singulatim percernere visum est, ut lector diligens nihil hanc in rem commodum desiderare possit.

Lib. 1. c. ph. p. Ut remedia inueniendi prima indicatio ab affectu ipso præter naturam sumitur, sic ab eodem prima componendi medicamēta ratio est profecta. Si enim solis simplicibus medicamētis omnes affectus præter naturam curare liceret, nullus vnquàm vsus foret compositorum. Simplex verò affectus simplicem exhibet indicationem, complexus compositam. Quod si vno simplici remedio præsentem affectum simplicem curare possumus, id adhibemus compositione neglecta. Si verò id simplex quod nobis ad manum est, valentius aut inualidius, quàm affectui conuenit, aut colore, odore, sapore, consistentia, vel aliis post dicendis, à scopo nobis proposito est alienum: mixtionis iam insurgit necessitas eorum, quæ vires minuant, vel augeant, vel coloris, odoris, saporis, consistentiæ absurditatem corrigant.

Exemplum necessariæ compositionis morbo simili.
Li. 1. simp. c. 3. Duæ igitur primæ & principales causæ compositionis videntur, affectuum natura contrariorum complicatio, & simplicium tam simplicem quàm complexum affectum expugnatorum penuria, & præter has temperatura, partis figura, situs, sensus, aeris natura. Ut si affectus sit intemperies totius vel partis vno gradu calidior, vno gradu frigidiora, ut profligaretur, postularet: haberet autem fortè ad manum Medicus tantum duo simplicia, vnum temperatum, & ob id imbecillius: alterum secundo gradu frigidum, idemque valentius, quàm proposito affectui conueniret: utriusque æqua portione mixta medicamentum fecit frigidum primo ordine,

ne, malo præfenti idoneum. Quomodo vinum per se fitim non extinguit, quia calidum: nec acetum, quia ficcum: nec aqua per se, quia tardius permeat & distribuitur: mixta autem aqua alterutri horum certa proportionem, fitim probè extinguit. Nam hæc vini caliditatem, & aceti siccitatem sua frigidity & humiditate corrigit. Tam vinum autem quàm acetum essentiæ suæ tenuitate ipsi aquæ celeritatem & permeandi promptitudinem impertit. In œdemate pituitam, quæ in partem affluxit oxycratum ex spongia admotum vacuat, quorum nullum per se id præstiterit.

*In organico li.
2. ad Glauconē
in communi.*

Cum vlcus cauum curaturus habet solum ceram siue ceratum, & æruginem, non etiam thus, irim, aristolochiam, farinam erui, radicem panacis, & alia vlceri cauo idonea. Cera autem & per se, & magis etiam cum oleo Rhodino in ceratum liquidius effusa, vlcus facit sordidum, quia nec terget, nec siccet, quæ duo carni gignendæ ad vlceris cavitatem implendam sunt necessaria. Aerugo autem sola erodendo & extendendo, vlcus magis cauat, & phlegmonem excitat: utrunque ergo per se vitandum est, ac ex ambobus mixturam cera valentior, æruginem imbecillior facimus. Sed quoniam ceratum paulò est inferius idoneo sarcotico, ærugo autem multo valentior, multo illi cerato, ut libræ vni, liquidiori modicam æruginem, ut partem decimam vel duodecimam, hoc est, vnciam, pro corporis differentiis miscbimus. Nam cuiusque quantitas ante experientiam à nemine inueniri potest, coniectura tamen iudicari potest, ut primam experientiam nullus valde infastus sequatur euentus. Pars verò æruginis decima acrius medicamentum facit, ob id est idoneum carni gignendæ in corporibus validioribus, duris, siccis temperamento, ut agricolarum, nautarum, venatorum. Duodecima imbecillioribus & mollibus vel natura, vel victus consuetudine, & humidis, & candidis corporibus, qualia sunt mulierum, eunuchorum, puerorum conuenit.

*Lib. 1. c. ph. g.
& lib. 3. meth.*

In quo exemplo simplicia vtraque & inter se sunt maxime contraria, & affectui per se sunt nocentissima: mixta tamen quo dixi modo, sarcoticum, colleticum, & epuloticum efficiunt præstantissimum, quale etiam est dia chalciteos Galeni: cum cera per se, multò magis adeps, atque adeò oleum ipsum ob humiditatem multam & lentorem in vlcere sor-

dem cumulet, & chalcitis ficcior, acrior, erodentior cavitatem augeat. Optima verò medicamenta maiores ex contrariis miscuerunt ratione ipsa monstrante viam, & compositionem inueniente : de cuius virtute experientia posterior decernit. In hoc autem & aliis propè omnibus medium est parandum potius, ceu ad mediam temperaturam aptatum : ad temperaturas verò vtrinque à media recedentes, si vires medicamenti sint imbecilliores, augenda est ærugo vel chalcitis, & si vis, mel addendum : si validiores, ærugo chalcitisq; minuenda magis & minus pro effecti eius portione, vel augendum ceratum, adeps, & cætera. Coniecturam enim tuam vsus & experientia docebunt. Si enim carne impletur, bonum: si forde, est infirmius: si cauum magis fit, & erosionis sensum æger sentit, ac pars calidior, rubentior, tumentior apparet, est valentius : & in aliis eadem ratione compositis idem faciendum, vt pòst fusius audies.

Est etiam cùm affectus emplaston medicamentum exigit, qualem consistentiam cùm nullum simplex medicamentum per se facere possit (non enim bitumen, non cera, non resina, non pix, non propolis, non ladanum talem vsum præbent, multò minus ærugo, cerussa, lithargyros, molybdena, vel aliud metallicum, nec herbæ etiam solæ emplaston medicamentum faciunt) mistura opus fuit, vt simplicia in vsu hoc esse possent, alioqui ob conditionem suam & naturam in id inepta. Propterea primi emplastrorum autores ratione optima, ex oleo quoque metallica coxerunt, & liquabilia liquefecerunt, & herbas contusas, & cretas adiecerunt.

Quædam præterea componimus affectui præfenti contraria ex naturæ imitatione, cuius ritè agentis Medicus perpetuò est minister, vt clysterem in aluo astricta ex hydromelite & oleo, interdum ex oleo solo cum sale componimus, in quibus durum siccitate stercus emolliendi, id est humectandi est facultas : deinde viæ ipsius per intestina oleo lubricandæ ad liberiores descensum : postremò aut mel aut sal mordendo, expultricè ad opus suū excitat, vt bilis flaua in sanis corporibus stercorei mista. Tales sunt crebri clysteres Gal. in lib. sanit. tuendæ, & therapeuticis : horumq; ratio ea redditur Aphrodisæo in problematis. Huc pertinet, quòd multis simplicibus etiam curando affectui simplici vel compositio idoneis, sæpe

sæpe facultates aliæ insunt affectui noxiæ: cùm rarum sit simplex medicamentum, quod ex variis substantiis, & sæpe contrariis non sit temperatum. Quo casu eas mistione aliorum inducimus: sic scammonio, cholagogo alia miscemus frigida, crassa, astringentia, partes principes roborantia, vt calori tenuitati, dissolutioni, partium principum noxiæ à scammonio imminenti occurramus. Sic opium castorio, hyoscyamum allio, cæpa, semine raphani, mandragoræ corticem absinthio, sinapi, frigida scilicet calidis obrundimus: & in theriace, mithridatio, aliisq; multis similiter.

Secundo loco medicamentorum compositionis vsus est maximus, in affectibus complexis diuersas simul facultates interdum contrarias desiderantibus, vt repellendi simul & digerendi, incrassandi & tenuandi, incidendi, tenuandi, tergend, qualia sunt multa composita polychresta, vt theriace, mithridatios, & alia non pauca.

Si est igitur hydrops frigidus humidus affectus cum febris calido sicco morbo implexus, vtriusque per sibi contraria remedia est habenda ratio, si æquè pollent, si alterutrum magis vrgeat, illi attentius prospiciendum, altero tamen affectu interea non neglecto. Sic vbi vlcus est cum phlegmone quæ hanc curant refrigerantia, vlcus mordent, & insuppurabile reddunt: quæ verò vlcus tergent siccantque, phlegmonem exacerbant. Componendum igitur fuit medicamentum, in quo vtriusque talis habeatur ratio, vt neutri magnoperè incommodetur: sed tamen eo casu phlegmones maior est habenda ratio, quippe citra cuius curationem vlcus nunquam sanaueris. Idem statuendum est, vbi affectus causa adhuc præsens in corpore, & ipse affectus, naturæ sunt diuersæ: vt in quotidianis & quartanis febribus causa est materia frigida, morbus calidus: vtriusque enim habenda est ratio, sed maior vrgentioris. Composito etiam medicamento sæpe opus, cùm morbi eiusdem permultæ sunt causæ: vt si succus & multus, & crassus, & lentus faciat obstructionem: crasso tenuans, lento incidens & tergens, & fluxile reddens, multo vacuans contrarium debetur. Quæ omnes facultates cùm raro in vno sint medicamento, simplicibus multis simul mistis perficiendæ fuerunt. Sic cùm venena calida simul & frigida sunt expellenda de corpore, vel aduersus hæc corpus

est muniendum. Qua etiam de causa theriace multum contrariis est commista.

Exercere sese potest quisque exēplis plurimis per omnes affectus naturæ diuersæ complicatos, vt intemperies partium magnarum aut etiam principum inæquales, sine materia & cum humoribus, simplices & compositas: vt incommoderationum differentias sibi connexas, vt solutionis continui species secum compositas, vel etiam cum aliis prædictis morborum generibus. Si verò naturæ sint eiusdem affectus, vt causa & morbus calida (vt in tertianis) vt intemperies calida ventriculi, & hepatis, & partium vicinarum: minus est necesse composito vti, si ad manum est quod refrigerare quantum affectus ipse postulat & partis natura, vt ad iustam temperiem reducatur.

Lib. 2. c. ph. p. Qui igitur primi composuerunt medicamenta propria & familiaria aduersus impactā partis alicuius angustis meatibus materiam, vt humorem crassum & lentum, interdum etiam spiritum flatulentum & vaporosum ad curationem longius tempus requirentem, eguerunt varia medicamentorum mistione, quorum quædam impactam materiam tenuent, & meatus dilatent, per quos materia illa excernatur: alia partem affectam roborēt, ne talem materiam aut gignat, aut aliunde recipiat, & vt quod extenuatum est excernat, impactum coquat & tenuet: alia quæ substantiam affluentem repellant: alia quæ receptam coquant: alia discutiant. Quod si singulis eis effectis peculiare habes compositum medicamentum in affectibus curatu difficilibus, secundum Hippocratis consilium inspice, in quonam horum medicamentum simplex calidum sit copiosius, & in quo frigidum humidum siccum, aut tenuium partium, aut crassarum: deinde ex successu remedii loco affecto prius admoti, coniecta an in eodem perseuerandum sit, vel ad aliud transeundum, etiam eorum quæ idem pollicētur, vel ambo miscenda, vt medium quodammodo facias.

Tertia causa componendi medicamenta fuit totius corporis natura, & partium ad quas ea ferri volumus, & per quas transitura sunt: vt si habeo medicamentum liberandæ obstructioni idoneum, ea autem est in liene, aut hepate, aut renibus, miscenda sunt liquida, tenuia, & totius substantiæ similit

militudine ipsi parti familiaria, quæ medicamentum, aut medicamenti facultatem ad partes deducant, easq; roborent, si robore pars ipsa egebit, ob actionis præstantiam: ut eupatorium hepaticis, asplenium splenicis, nephriticis cestron aut cicer miscendum: de quibus postea: sic stœchas agarico mista pituitæ ex cerebro purgationem iuuat, hyssopus verò ex thorace. Præterea naturarum quædam proprietates hac vel illa compositione recreata, ab alia abhorrens, composito nos uti sæpe coëgit: & item coloris, odoris, ac potissimum saporis gratia, & studium seruandæ diu mistionis. Tres hæc causæ necessitatis componendorum medicamentorum sufficere possunt, sumptæ ex natura & affectus, & corporis affecti, & medicamenti affectum illum in hoc corpore sanaturi. Quæ verò minores sunt compositionis utilitates, plurimæ ex aliis indicationum differentiis sumendæ, in ratione componendi dicuntur. Præter quas omnes una hæc maxima est, ut compositis tibi consuetis, amissis similia reponas: utq; compositionis rationem in compositis veterum agnoscas, & quorundam ipsorum facultates ab illis non definitas inuenias, aut etiam falso adscriptas refellas. Cognitis enim simplicium facultatibus & qualitatibus, poteris virtutem compositorum à veteribus medicamentorum inuenire, & similia componere. Hinc etiam cognosces affectus corpori ex medicamento successuros, & prænosces: & his iam factis atque faciliè cognitis, remedia idonea inuenies ratione compositionis inuentrice, cuius facultas experientia probanda est, quanuis ante hanc coniectura quoque artificiosa colligatur: ut si corpora sicca sunt & valida, valentius medicamentum posse sustinere confidis: si imbecilliora & molliora vel natura vel victus ratione sint, ea non ferent. Sic cum à pulmonibus & thorace materiam crassam lentam expectorare oportet, potulariore opus est, atque liquidioribus eclegmatis vtendis inter medicamenta arteriaca, siue illa sint acris & mordacia vehementer ex aro, pipere, casia, cinnamomo, galbano, resina terebinthina, & aliis eius generis incidentibus, & tenuantibus, & tergentibus: siue tantum moderatè tergentibus consent cremore ptissanæ, amygdalis. Nam quæ emplastica sunt exactè, & morsus expertia, ex passo Cretico, gummi, traga-

Lib. 2. c. ph. g.

Lib. 1. c. ph. p.

*Initio lib. 7. c.
ph. par.*

cantho, glycyrrhiza, arteriæ asperitates tantum læuigant, nō etiam expectorant.

*Lib. 1. c. ph. g.
& intro libr.
6. c. ph. p.*

NVnc mihi dicenda sunt, quæ compositrō certa metho-
do medicamenta sint cognoscenda, illa nimirum tria:
affectus omnes corporis præter naturam, in quos medica-
menta componimus: corporis ipsius naturā, sine qua nec affe-
ctus illos ad vnguem nosse, nec probè & tutò vri medicamen-
to queas: tertio simplicium omnium medicamentorum fa-
culrates pernoscendæ sunt, primæ, secundæ, tertiæ, quartæ,
id est, causæ medicamētorum effectrices, seu naturales quæ-
dam eorum potentiæ corpus nostrum immutantes. Nam
cū primus & præcipuus componendi medicamenti scopus
sit affectus præter naturam, nullo simplici remedio curabi-
lis, illius tota natura tanquam vngues & digiti cognitissima
esse debet: si calidus scilicet aut frigidus, humidus aut siccus,
vel horum coniugatione intemperatus, & quoto ordine est
vnusquisque talis. Item si cum materia vel sine materia, si
causam habet desitam vel adhuc præsentem, & eam vel he-
cticam vel sphericam: adhæc si profundus est morbus vel
sublimis, prope partem momentaneam vel longè ab ea, &
alia propè innumerabilia, partim, pōt dicenda in ratione
componendi, partim ex curandi indicationibus sumenda.

Quòd si natura affectus incognita vel neglecta aduersus
ipsum medicamenta componis, cū scopo certo composi-
tionis careas, illi es similis, qui oculis clausis telum, quo for-
tuna feret, emittit. Is enim vt scopum vel nunquam vel ra-
rissimè, idque fortuitò, attinget: sic medicamentum in
hunc affectum exactè non cognitum si componis, illum vix
vnquam sanaueris: mirum nō etiam plurimum auxeris, cū
medicamenta sint rara, quæ nec profint, nec obsint, sed ferè
salubria sint, aut insalubria: paucissima, & rarò neutra. Se-
igitur quisquis est medicinæ studiosus, diligenter exerceat
in morborum, causarum, symptomatum cognitione, vt per-
specta horum cuiusque natura, statim concipiat ex theore-
mate illo Hippocratico contraria contrariorum remedia,
quo genere remediorum sit opus, calidone an frigido, hu-
mido vel sicco, renuante aut incrassante, molliente vel du-
rante, vel alio reliquorum similium. Deinde in ipsis simpli-
cibus

lib. de flatibus.

alibus tanquam promptuario longè vberissimo & copiæ cor-
 ou plenissimo, summa cura, præcipuoq; studio vestiget, quæ
 quibus affectibus sunt, quantum opus est, contraria. Id quod
 si in vno aliquo non inest, duobus aut pluribus simul mistis
 efficiat. In quo studio nemo se vnquam feliciter geret, cui
 simplicium omnium natura (vt idem de reliquis salubribus
 causis tibi persuadeas) non sit tanquam sua domus cognita.
 Nam præterquam quòd illis simplicibus vti rectè nequeat,
 neque etiam possit ex his probè aliquid componere, aut
 aliorum compositis rectè vti : nemo enim composito vnquam
 rectè vtetur, viribus simplicium id componentium ignora-
 tis : cùm illius vires ex horum viribus propè solis sint æsti-
 mandæ : quomodo partes in nobis organicæ seu composi-
 tæ, vt rectè vel malè habeant, id ex simularium seu simpli-
 cium magnitudine, numero, figura, situ, & connexionione ac-
 ciipiunt. Quis igitur pœna non sola ignominia nota dignos
 non putet, multos huius ætatis Medicos, etiam hominum
 opinione celebres, qui neglecta simplicium exquisita obser-
 uatione, contenti sunt facultate compositi vtcunque cogni-
 ta. Illis enim satis est scire, catholicum humores omnes pur-
 gare, diaphœnicon bilem flauam, diacnicum pituitam, dia-
 scennam succum melancholicum, coccia catapotia cerebrum,
 optica oculos : neque sunt solliciti quibus horum quodque
 simplicibus constet, & quanta singulorum mensura : neque
 curant hi, si vires habeant composita, quas titulo pollicen-
 tur. Cùm tamen simplicia sint & natura & tempore prio-
 ra compositis, & ab illis hæc omnem propemodum habeant
 facultatem : nisi si qua ex contrariis composita (quorum ma-
 xima turba est) facultatem componendo acquirant non mo-
 do diuersam, sed etiam sæpe contrariam simplicibus per
 se vsurpatis, quod in sarcotico ex ærugine & oleo, & dia chal-
 citeos emplastro ostendimus. Adde quòd vis quædam diuer-
 sa, sed ferè exigua ex ipsa compositionis & nostræ coctio-
 nis ratione nonnunquam proficiscitur : magna verò quibus-
 dam ex coctione à mistorum calore natiuo tandem perfe-
 cta, vt in theriace & mithridatio audies. Quæ medicantium
 consuetudo si recipitur, quid miramur medicinam paucis
 admodum mensibus percipi ? quid miri est, idiotas ad medi-
 cinam faciendam conuolare, cùm physiologiæ totius, præ-

terea utriusque sint ignari, ut reliquam quorundam ignorantiam taceam.

Iam patere cuius arbitror, medicamenta composituro cognitissimam esse affectus curandi, & remedii curantis naturam oportere. Qui enim morbum, ac morbi causam, & utriusque naturam pernoverit, deinde simplicium medicamentorum omnium, aut saltem plurimorum & usurpationum vires omnes, in singulis morborum speciebus recte componat, & salubriter utatur tum simplicibus tum compositis medicamentis, si simul naturas corporum & aeris inspexerit. Mollioribus enim & humidis, ut pueris, eunuchis, mulieribus, mitiora debentur medicamenta: duris autem & siccis, ut venatoribus, messoribus, nautis, agricolis, validiora: mediis horum, mediocria: & in carne sicca ulcus, sicciora: in molli, minus sicca, tam sarcotica quam colletica & epulotica requirit. Et in cognatis cuique intemperaturis mitiora, in contrariis valentiora requiruntur, quoto scilicet ordine quisque per morbum à sua natura recessit: & aëre calido minus calida, & frigido minus frigida, quam affectus requirit, medicamenta sunt adhibenda, & in reliqua oppositione ad portionem.

Quæ verò ad affectuum præter naturam cognitionem pertinent, hinc audire ne expecta, sed ex lib. de differentiis & causis morborum & symptomatum, & de signis partium internarum affectarum, & aliis Hippocratis & Galeni libris huc pertinentibus require. Vti quæ ad cognoscendam cuiusque naturam sunt necessaria, ex libris physiologicis repetenda tibi sunt, quorum omnium catalogus in ordine librorum Hipp. & Galen. tibi abundè suppeditatur. Quæ autem ad simplicium medicamentorum cognitionem sunt necessaria, paulò fusius explicabo, ne quid cupido lectori desit ad compositionis peritiam, etiam si multa satis attigisse tibi Galenus videri possit libris quinque primis simplicium. Ex quibus, & aliis aliquot eius locis ad hanc rem idonea paucis perstringe te tibi constituimus.

Noscenda est medicamenti simplicis facultas quadruplex, prima, secunda, tertia, quarta, (à quarum singulis sua prodit actio) & quæ medicamenta quibus locis abundant, & quibus item locis, atque conditionibus aliis sunt meliora.

Facult

Facultas medicamenti prima reliquarum communis est tanquam basis (præterquam quòd quartam iuuare non videatur) ex ipsis elementis nullius interuentu prodiens, ipsisque omnium maximè tributa: generatim quidem est calfaciendi, refrigerandi, humectandi, siccandi, & per horum coniugationem, calfaciendi humectandi, calfaciendi siccandi: refrigerandi humectandi, refrigerandi siccandi. Particulatim verò efficiendi id ipsum in principio, medio, fine ordinis primi, secundi, tertij, quarti. Ea verò qua ratione sit tactu & gustatu tanquam tactu quodam exploranda & iudicanda, abundè docet Galenus lib. simplicium. Etiam sæpe secundas facultates, nonnunquam & tertias: est quando & quartas in quibusdam simplicibus profecutus. Omnes enim eas recensere in omnibus operosum fuerit: cùm etiam permulta sint, quorum facultas tertia parum cognita est, plurimorum quarta adhuc omnino incognita, cognoscenda quibus, quando, quantum Deus voluerit, vt Auenzoar pulchrè dicebat. Satis fuerit (quod ad primas facultates attinet) cognoscere calidum frigidum humidum siccum ordine primo, obscurè: secundo, manifestè: tertio, vehementer: quarto, summè tactum nostrum & gustatum afficere, idque in horum singulorum ordinum principio, medio, fine, sic vt ordines sint 12. medicamentorum tum calidorum, tum frigidorum, tum humidorum, tum siccorum, id est, calidiorum, frigidiorum, humidiorum, sicciorum temperato. Noscat etiam Medicus, quæ medicamenta celeriter etiam vbi adnota corpori nostro sunt, vel in ipsum recepta, virtutem statim amittant, quæ diu eandem seruant. Vt euphorbium caducam & statim euanidam admotum parti caliditatem habet: arus & alia quæ caliditatem humiditate multa & lentamersam habent, tardiùs eam exerunt, sed diutiùs excitatam seruant. Item euphorbium recens linguam vrit, trimum & quadrimum adhuc vegetum est, annis sequentibus exoluitur. sic Thapsia post annum est admodum imbecilla, bima prorsus exoluitur. Quæ omnia multis Galeni locis tibi clariora simul & credèda magis reddere visum est.

Nisi quis exactè & distinctè simplicium vires noscat, non cognoscit compositum, nec in quali ordine sit efficax, vtrum scilicet vehementissimum vel clementissimum, vel medium, vel inter hæc constitutum, vel si ex contrariis constet.

Nullus

Cap. vlt.

Lib. 5. simp.

Lib. 3. c. ph. g.

Lib. 7. c. ph. p.

*Initio lib. 8.c.
ph.p.*

Nullus cum ratione & methodo medicamenta componere, aut compositis uti potest, nisi simplicium medicamentorum vires memoria teneat, & omnium quæ in methodo mendi docentur, meminerit.

*Lib. 1.c.ph.g.
& p.*

Medicus prudens & peritus noscat naturam affectuum qui curantur, ægri naturam, & medicamentorum facultates, non generatim solum, sed secundum quantitatem, id est, quanto recessu calidum, frigidum, humidum, siccum, tergens, & cætera: ut quotidie coniiciat, quali remedio opus est, ut præcedens medicamentum intendas vel dissolvas, quantum affectus requirit: & sic curatio rectè absolvitur. Neque enim sufficit nosse hoc calfaciendi aut refrigerandi facultatem habere, sed quo recessu, siue quantam habeat eam facultatem diffinire oportet.

Lib. 1.c.ph.g.

Nam resine omnes calfaciunt, idque sibi habent commune, sed maioris & minoris rationem non exiguum sortiuntur, uti & liquores non pauci calfaciunt: sed *δωδς* panacis collatione *δωδς* Cyrenaici aut Medici parum calfacit. Anethum etiã, ruta, cæpa, omnia sunt calida medicamenta, magno tamē inter se variantia discrimine. Ob id curadæ parti admodum refrigeratæ, multum calida admoveamus: parum refrigeratæ, modicè calida: insigniter refrigeratæ, vehementissimè calida. Proinde quatuor calfacientium, ut refrigerantium, & humectantium, & siccantium ordines statuimus, & in his singulis principium, medium, finem. Itaque sunt ex his quæ ob caloris vim vrunt, vel exulcerant, alia septica, id est, putrescentia sunt, alia simulatque corpus attigerunt, suam potestatem ostendunt: alia horis duabus, tribus, quatuor: alia die vno, alia etiam nocte, vel maiori etiam spatio post applicationem agunt. Hæc quoque in refrigerantibus, humectantibus, siccantibus similiter noscenda ei sunt, qui medicamentum probe confecturus est. Quod ob id etiam scitu maximè est utile, ut siquando valentiore medicamento egebis, ad quod digrediarè, cognoscas. Qui autem particulam simpliciter calfaciendam iubet, non magis piper, aut sinapi, quàm thus capiet: eodem modo & in secundis facultatibus, si tergendam solum iubet, non magis mel, quàm glycyrrhizam vel aloën capiet.

Lib. 2.c.ph.g.

*Initio lib. 6.c.
ph.par.*

Qui medicamenti vim, qua operando iuvat, ignorat, eo rectè uti non potest.

*Initio lib. 7.c.
ph.p.*

Omniū simplicium medicamentorum facultatis notas habere

habere oportet eum, qui compositum aliquod volet efficere. Idem illis rectè vtetur, quæ alij composuerunt, & indistinctè scripserunt: distinctè autem scriptis meliùs quàm alij vtetur.

Rationalis enim Medicus pro varia affectuum natura medicamentum mutat. Quam rem is solus præstabit, qui omnium simplicium medicamentorum facultates cognoscit. Solus enim qui omnium simplicium vires nouit, sciet quando hoc vel illo medicamento certo ordine vtendum erit, & quantum id à medio recedere debeat.

Simplicium facultatibus & qualitatibus cognitis, quisque potest inuenire, qua sint virtute prædita, quæ à veteribus sunt composita, & talia ipse componere, & inde affectus qui medicamentis superueniunt, potest prænosse, & præsentibus succurrere. *Lib. 1. c. ph. p.*

Poterit idem solus distinguere, quibus affectionum differentiis remedia sine distinctione scripta conueniunt.

Non satis igitur est nouisse medicamentorum facultatem simpliciter & in genere, vt hoc calfacere, illud refrigerare (quod solum Dioscorides docuit) sed quoto quodque ordine id præstare possit, quod Galenus in plurimis definiuit.

Veterum quoque Medicorum præstantissimi ipso vsu edocti optimas medicamentorum compositiones effecerunt ex singulorum natura, compositionis artem inuenientes: quæquæ intensæ qualitatibus ipsis sunt, aliorum mistura remittentes: similiter acria hebetantes, & vt summam dicam, pro reliqua cuiusque vitij differentia, & hominum temperie medicamentis artificiosè vtentes. *Gal. in theriaca ad Pisonē.*

Comperta enim morbi cuiusque natura & differentia temperamenti tum ægri, tum simplicium medicamentorum cognita, sic composita præparamus singulis hominibus pro corporis ipsorum statu congrua, & unicuique morbo contraria. *Ibidem.*

Quandoquidem semper memineris oportet, omnem qui præter naturam incidit excessum, contrario excessu esse corrigendum: hucque omne curationis consilium dirige. Quod si præterea corporum curandorum naturam noueris, & singulorum remediorum facultates, vniuersæ iam artis peritus es, & valetudinem sanis probè tueberis, & ægrotis pristinum statum restitues. *Lib. 5. sanit. tuendæ.*

Facultas secunda est, quæ primas simplices facultates vel coniuga

coniugatas nullius alterius interuentu sequitur, vt facultas molliendi humectationem primò sequitur: durandi, siccationem: rarefaciendi, attrahendi, aperiendi, tenuandi, calfactionem: densandi, repellendi, claudendi, crassandi, refrigerationem. Vires & qualitates secundas in acerbis, austeris, acidis, dulcibus, falsis, amaris, acris, digerentibus, astringentibus, contrahentibus, repellentibus, ex alto trahentibus, reserantibus, tergentibus, sensum stupefacientibus, scribit Gal. lib. 3. comp. ph. part.

1. A calfactione igitur procedit actio propinqua, tenuatio crassorum, quæ si liquida sunt, in vaporem tenuando versa, exhalant: interdum intra corpus, & sunt pituitæ, aquosa, flatus, inflationes, palpitationes, & cæteri affectus similes: interdum foras, vacuanturque halitu vel insensili vel sensili, cum sudore. Si verò sicca fuerant crassa illa quæ tenuantur, aut etiam humida, sed minùs exhalantia, tenuioris substantiæ euadunt. Sic ex austeris acida iam tenuia, ex acidis dulcia tenuiora, ex dulcibus salsa tenuiora, ex falsis amara adhuc tenuiora: omnium post hæc si saporem caloris indicem spectes, tenuissima sunt acria. Sic quæ veterascent, à suo calore tenuata magis euadunt: sic ex vino acetum, ex lacte coagulum, ex maza fermentum, calore externo corrumpente, tenuiora vt calidiora euadunt: & psoricum in fine lib. 9. simpl. putrefactione 40. dierum sub fimo fit tenuius: & vnguentum ex nucibus viridibus sub terra putrefactis tribus mensibus, Heras apud Gal. lib. 1. cõp. ph. part. tenuius efficit. Sic cocta omnia & vsta euadunt tenuiora: sic humores in nobis crassos calorificis causis salubribus, vt labore, cibo, potu, medicamento calido, aëre calido tenuamus. Tamen quædam frigida tenuibus partibus prædita, vt acetum, cortex nucum viridum Galeno in diacaryo, caphura recentioribus, & alia quædam vim quandam tenuandi à tota substantia etiam habeant, nisi malis in his frigidis substantiam quandam calidam eandemque tenuem inesse. Sed crassam aceti partem calidam, tenuem potius frigidam innuit Gal. lib. 1. simp.

2. Calidum deinde fundit & liquat à frigido concreta: paucos quidem, vt niuem, grâdinem, glaciem, pituitam in nobis crudam, adipem, resinas, gummi, levis calor fundit: multo autem & diuturno frigore concreta, vt succinum, crystallum, metalla

metalla multus calor : in metallis tamen magna maioris minorisq̃ue ratio versatur. Nam plumbum & stannum citissimè, aurum & ferrum tardissimè, æs & argentum medio inter hæc tempore igni liquantur. Sic scirrhos à frigido concretos calidum fundendo velut sub sole emollit.

Cap. 6.

Lib. 5. simp.

Idem fundendo mollit prædicta omnia concretione à frigido dura, & nostrum corpus: ob id motus leues pulmoni aut aliis partibus corporis, aut etiã toto corpori ante iustam exercitationem ad has partes præmolliendas imperantur, vt mollitæ, tensioni per motus violētos vehementi citra noxam obediant: alioqui enim non præmollitæ, citoq̃ue ac vehementer tensæ rumperentur.

*Lib. 2. sanita.
tuenda.*

Idem fundendo & liquidiora ad motumq̃ue promptiora reddendo excrementa, obstructa liberat, nisi præ copia aut lentore in via hæreant. Fluxiones etiam aut excitat, aut gemit: ob id æstate catarrhi Aph. 21. lib. 3. & in diaria ab æstu cap. ultimo lib. 1. feb. & hypochondriis, calorifica admoueri, & balneum in febribus non probè vacuato corpore, & viscere aliquo imbecillo prohibet in fine lib. 11. methodi. Ob id etiam in magnis fluxionibus corpore multum pleno purgationes veremur, ne purgantium medicamentorum (quæ omnia sunt potestate calida) calore liquatum tenuatumq̃ue excrementum, largius in partem affluat, & in diaria à frigore cum catarrho vel coryza, interdicitur balneum ante horum coctionem.

Aph. 24. lib. 1.

Li. 8. methodi.

Aph. 14. lib. 5.

li. 2. loc. affect.

Idem fundendo semen, actumefaciendo venerem excitat, fundendo sanguinem & meatus dilatando sudores, vrinæ, menses, hæmorrhoidas ciet. Eadem ratione laxat tensa & rigida concretione, & quia vacuat, laxat etiam tensa plenitudine. Mobiles enim magis non spiritus solos, sed reliquas quoque materias faciat calidum, hinc calido sicco cerebro & spiritu animali natura aut temperamento acquisitio, aut febribus homines sunt vigiles, insomnes, deliri, præcipites.

Eadem vi focus ex aqua tepida nervis noxius lib. 6. methodi: quia eorum substantiam, vt aliarum partium nervosarum à frigido concretam dissolvit. Ventriculum item ratione eadem tepida euertit, vomitumq̃ue ciet, & vsu multo calidum facit neruorum incontinentiã, seu tremorem, & mentis torporem, & carniū effœmationem.

Aph. 16. lib. 5.

Idem

Idem calor fusa tenuataque si diutius exercet, digerendo aut aliter vacuando, tandem siccat: quod ostendunt liquores, succi, gummi, & resina omnis aut vetusta, aut vsta. Eadem ratione medicamenta omnia purgantia, & causæ reliquæ calorificæ emaciant, tum quia vacuât, tum quia calorem nostrum vel augent vel in'endunt: qui maiorem substantiæ nostræ facit dissipationem. Ob id biliosi sunt graciles, & quos calor emaciat, pallidos facit aut nigros: si verò corpus utcumq; succulentum est, coloratos sanguine & spiritu cum calore per corpus sparso.

Aph. 6. lib. 4.

li. 8. meth.

Idem præproperè siccando vna est causa nostri & senij & interitus acerbi, aut etiam naturalis, quando paulatim lenta morte nostrum consumit humidum substantificum: sed calidi effectum hoc per accidens non primo, pòst dicitur.

3. Calidum rarefacit densa, & poros, ac meatus omnes, & capacitates, & ora ipsa tam vasorum quàm aliarum cavitatum aperit, fistulat spiritu calido, & dilatat in prima formatione, & quoties corpus incalescit. Qua ex re fit, vt viris nempe calidioribus omnia hæc sint maiora & latiora quàm fœminis: & quò viri aut fœminæ sunt calidiores, eò sunt meatibus capacioribus: quò minùs calent, astrictioribus. Hinc articularum latitudo cordis caliditatem, venarum, hepatis sequitur. Hinc viam facturi calculo vel fœtui calorifica damus sumenda, & apponimus. Hinc sudores æstiuï quamplurimi & balnearum, & calida sunt quæ vrinas, sudores, & menses mouent, & quæ digerunt per rarefacta corpora inter humorem vacuandum & medicamentum digerens constituta. Hæc quidem præstat calor temperatus, aut non ita vehemens: Ardens verò ac igneus, vt à balneo feruente, cuti incidens eam claudit & densat, quòd ille occurso blando naturæ est iucundus, eamq; ad se suscipiendum inuitat: còtrà verò hic acrior, & naturæ grauis est, ob id ab eo fugiens intrò, poros contrahit, ne se hostilis ille calor sequatur: quomodò tantum per accidens densat, vti calore multo siccatum, vt paulò antè dixi, etià densum redditur. Hinc clibanus calidior panem vndique adurit, intus non coquit, initio alimentorum, & ouum aquæ feruenti immissum vix duratur.

*Galen. in arte
medicæ.*

*Lib. 3. sanit.
tuendi. & lib.
7. meth.*

4. Calidū trahit & foras si admotum est, intrò si sumptū est euocat materiam à se tenuatam per meatus à se apertos.

Quapro

Quapropter admotum resoluit ac digerit, sumptum obstru-
cta referat, vacuat, purgat humorem omnem, sed primum se-
qui paratiorem, deinde alium: nisi etiam substantiæ totius si-
militudine ac proprietate sibi familiarē non calore solo tra-
hat, qua sola quædam etiam frigida trahunt ex corpore spi-
cula. Dolores eadem ratione sedat à materiæ qualitate vel
quantitate factos, hac materia dolorifica per resolutionē va-
cuata, ac proinde tumores dissipat. Apophlegmatismis &
errhinis eadem vi tractrice calidum est aptum, & quia con-
creta in cerebro, excrementa liquat. Sic suffitus aromatum
muliebria ducit: sic radix cyclamini, & alia non pauca um-
bilico admota aluum subducunt: ventriculo autem ad vom-
itum trahunt. Sic trahendo calor immoderatio fluxionis vna
est causa: sic partes corporis omnes alimentum sibi familia-
re trahunt, calore scilicet, sed etiam substantiæ totius simili-
tudine. Sic succinum attritu calfactum citius & potentius tra-
hit paleam, papyrus, & alia leuia & minuta. Sic sol, & alia
corpora cœlestia in mediam regionem aëris trahunt halitus,
vapores, & alia quædam corpora. Sic partes nostræ nimis te-
tæ ob calorem inde collectum immodicè replentur, & ca-
put in æstu cucurbitulæ ritu attrahit: unde coryzæ, & catar-
rhi, & fomenta oculorum, & viscerum partes replent. Quid
quod sumpta calida non tantum trahunt, sed etiam prorsus
propellunt, ut quæ flatus dissipant per ructus aut crepitus:
quæ sudores, vrinas, menses, hæmorrhoidas promouent: quæ
fœtus mortuos & secundas depellunt, quæ partes adiuuant.
Id autem præstant, quod meatibus interclusa dum magno im-
petu ad dicta loca feruntur, vnà secum propellunt, aut si vis,
rapiunt dictas prius materias: aut quomodò fortasse ignis in
bellicarum machinarum meatu derepente excitatus puluere
ignipotente, ac loco carens idoneo & capaci, aut fistulam
æream frangit ac dissipat, aut glandem metallicam longissi-
mè iaculatur, ne corpora duo locum vnum occupent. Ca-
lore quoque cucurbitula corpori admota cum flamma mul-
ta, si magna est: pauca, si parua, è profundo potenter attra-
hit fuga vacui multum adiuuante, quando si aër vel ore pa-
rum probè commissio, vel exiguo foramine (quod attracti
vaporis emissarium quædam magnæ habent) ingreditur,
nihil aut minimum attrahunt. Et vitri fundum cucurbitu-
læ

*Lib. 2. feb. cap.
15. & lib. met.
11. & 13.*

*Lib. 11. meth.
et Aph. 33. li. 6.*

læ æmulum palmæ parum humectatæ paulatim & velut trahendo, sed firmiter affixum sine flamma cucurbitulæ modo firmiter palmæ adhæret, & attrahit. Neque enim tam paucotempore calor magnus à flammula excitatur: neq; calor alius multò maior tam validè attrahit quàm cucurbitula.

5 Calor natiuus coquit alimenta & humores coqui habiles, partiq; nutriendæ perfectè assimilat: impactos autem nec difflatos vertit in pus, aut puri respondentem substantiam, quæ in febrium coctarum vrinis apparet, nisi tam sit praua, vt nullum à calore natiuo cultum recipere queat. Quò autem copiosior fuerit hic calor, eo valentius alimenta coquit: ob id pueri plurimo egent alimento, quia plurimum habent calidi innati, Aph. 14. lib. 1. Eadem ratione adolescententes & pueri præsertim viuiores ieiunium non ferunt, Aph. eodem: & per hyemem pluribus alimentis opus est, quia ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, Aph. 13.

Lib. 5. simpl. cap. 5. & 8.

Cap. 85. artis medi.

Cap. 5. lib. 5. simpl.

Lib. 2. temp. et in toto li. 1.

aliment.

Lib. 4. c. 10.

simpl. & lib.

2. fa. nat.

Lib. 5. capit.

20. simpl.

lib. 1. Idem calor lac ex sanguine pituitoso coquit, & semen ex sanguine perficit, cap. 16. lib. 4. simplic. & cap. 20. 22. lib. 5. simplic. Calor natiuus moderatus coquit quantum appetit: remissior autem plura appetit quàm possit coquere, nisi manus palma ventriculo admota, vel pueri carnosì non facile sudantis venter, aut catellus pinguis, calorem illum foueat & augeat: at vehementior & acrior idem, & velut igneus ac febriculofus coctu facilia, vt pisces saxatiles, corrumpit: coctu difficilia, vt bubulam, chondrum coquit. Idem calor natiuus si moderatus est, primum ac principalissimum est naturæ instrumentum ad generandum, augendum, nutriendum. Idem calor dulcorat: nam sapor dulcis à calore fit moderato, vt in melle, chylo, sanguine, fructibus apparet, & lacte, quod coquendo quantum sibi de sapore dulci deest, assequitur.

6 Calor præter naturam & parti externus ac alienus corrumpit, vt victa partis natura à fluxione in magnis phlegmonis fit cancrena, aut etiam sphacelos. Eius caloris externi causæ quinque docentur libro de causis morborum, & cap. 4. lib. 1. febrium. Hic corrumpit, minuit, emaciat, atrophiam inuehit, graueolentiam, substantiam alienam, odores, colores, saporos in nobis præter naturam excitat, malorum nobis omnium & mortis est autor: vt natiuus ille per se etiam vitalis

talis est, ac quicquid in rebus subsistit, id augetur, roboratur, sanum est, ac vivit dum proprio calore regitur. licet per accedens interitum tandem quoque afferat, summa scilicet in partibus siccitate excitata. Vterque tam natiuus scilicet quam externus simul mixtus partim coquit, partim corrumpit olida putredine, ut in phlegmone suppurata, & febribus putridis salubribus, si æque ambo pollent. Si verò inæqualiter, pro vincente calore fit alteratio, coctio quidem magis natiuo: putredo autem potius externo dominante. Idem vehementior tam internus quam externus mordet, rodit, rubrificat, carnem deterit, vrit, elicharam inducit, quod declarant herpes exedentes, carbunculi, & caustica cuti & potius carni admota. His autem externis tam sumptis quam admotis, si substantiæ contrarietas cum nostra accesserit, corpus nostrum eo modo mutant, quo à corpore mutatur alimentum: sunt enim deleteria nocentissima, præcipue si sumantur.

Lib. meth. 11.

Lib. 3. temperament.

7 Calidum internum & externum moderatum partibus natura frigidis, ut cerebro, spinali medullæ, ossibus, dentibus est amicum usu moderato, Aph. 18. lib. 5. non autem immoderato, Aph. 16. lib. 5. Nam pars omnis intemperata à similibus suæ intemperaturæ causis promptè offenditur, iuuatur autem modico contrariorum usu. Moderatum autem cuique intemperaturarum magnitudini suum est, ut si parum perfrigerata est, modicè calido opus est: si plurimum, ipsum elementum ignem requirit. Idem rebus splendorem inducit, ostendit color vividus adolescentium, sanorum, potorum, iratorum, hilarium, & melancholia humor ob adustionem splendida, cum humor melancholicus nigredinem habeat obscuram, Aph. 21. lib. 4. ut sanguis extincto calore natiuo nigricans. Externus autem calor nunc qui foris corpus tangit, intelligitur, interdum alienus ob vehementiam à nostro & insito, siue is ab aëre sit ambiente, siue balneo, siue in corpore nostro non transpirante, vel alia de causa excitatus sæuiat.

Cap. 23. artis medic.

8 Calor homogenea cogit, heterogenea separat, parvus & parum diuturnus imperfectè, vehemens & diuturnus perfectè, ut Arist. cap. 4. lib. 4. Meteor. Quod an sit propria & perfectissima caloris actio, ut frigoris, tam homogenea quam heterogenea cogere, an potius caloris calfactio, frigoris refrigeratio, abundè docuimus nostro commentario de tota qua-

tuor elementorum natura.

9 Calor tam internus quàm externus per accidens refrigerat, vacuata ex corpore vel parte, materia calida. Ob id venus Hippocrati calfacit, humectat agitato corpore, & fufis à calore humoribus, refrigerat fíccat Galeno lib.3. sanit. tuend. non modò femine calida & humida, & fpiritu vitali plena, re excreta, fed per cutim multo calore natiuo & fpiritu cum humore & vapore excreto. Sudor item acceffionibus superueniens, aut febribus continuis & ardentibus, Aph. 58. lib. 4. Aut etiam folum exhalatio putrium fuccorum aut vaporum per cutem infenfílis, Gal. lib. 8. 9. methodi. Sic medicamenta quamuis potestate calida materiam febrium putrem vacuando refrigerant, licet per fe calfaciant: fic phlegmone fotu mitefcit, quòd calore tepido tenuata fanguinis eius parte, & per cutim ab eodem rarefactam vacuata tenfio minuatur, & aliquid calidæ materiæ foras trahatur, & fanguis minus iam impactus, liberius tranfpiret. Sed fi corpus eft impurum, noua fluxione excitata dolor repetit vehementior, Aph. 31. lib. 6. Sic balneum aquæ dulcis fuliginofa per cutem excrementa vacuans fine febre, & in acceffionum declinatione refrigerat, & laconicum calidum refrigerat, & ignis modicus refrigerat calfactos, quibus intus calida funt excrementa, & aër æftius fudantes, aut faltem vaporoso halitu madidos refrigerat, & frictio mollis multa, & exercitatio, & cataplafmata, linimenta, emplaftra, & calida alia adnota. Quæ omnia vacuantia fi immodica funt, etiam calore natiuo & noftra triplici fubftantia calente multum vacuata, frigida & fícca corpora noftra relinquunt: vt mox audies, & prius leuiter attigimus.

10 Calor per accidens fíccat refoluta, & in vaporem verfa fubftantia vel excrementofa, vt in dictis exemplis, vel etiam partis propria, fi diu perfeueret fotus, balneum, aër calidus, præfertim fi paulò valentior fit calor: nam vehementiffimus exrenus adufta fuperficie & denfata humidum intrò cogit, nec finit expirare, vt antè dictum eft. Hinc animalibus omnibus, atque adeò plantis ipsis corruptelæ ac interitus eft connata neceffitas, immodicè videlicet fíccatis à fuo calore natiuo humidum fubftantificum depafcente citius, fi acrior & vehementior, & humiditas illa pauca, parum lenta & craffa: tardius, fi contraria adfint. Idem oftendunt digerentia omnia,

*Initio sanit.
tuend.*

omnia, exercitatio vehemens & diuturna: frictio multa non dura, febres ardentes & acutæ, venus immodica, intempestiva: hæc enim & sudore, aut madore, & feminis vacuatione ficit: refrigerat, vt prius diximus, longa in sole æstiuo mora animalium, & rerū aliarum humidarum. Siccat eadem ratione omnis immodica vacuatio, quacunque parte fiat, etiam si per accidēs fiat, vt per inediam. Ob calorē etiam non solam siccitatē semen agni & rutæ, & quæ similiter immodicē calent, virorū genituram absumunt: sic & ignis ipse res genitas non sola siccitate per se, sed etiam calore per accidens ficit.

II Calor per accidens humectat fufis his quæ à frigido concreuerunt: ostendunt id catarrhi per febres ac solis æstus, vt per frigus comprimens. Sic scirrhus concretione durus calorificis mollescit & humescit, nix, grando, glacies, calore quouis humida & liquida fiunt, & butyrum, oleum, adeps, resina, & quæ alia frigore concreuerunt, calore soluuntur. Sic venus calfacit & humectat Hippocrati, vt antè diximus, dum feruet scilicet ac exercetur, vt labore alio corpus sudore madescit. Galeno autem refrigerat, siccata vacuata per virgam & poros calida & humida substantia. Sic panis durus modicē assatus tenerescit, quod humiditas aquosa non modò à farina absorpta ab igni extrahitur, sed à frigido etiam concreta calore colliquatur.

I Refrigerationem sequuntur contraria. Nam frigus crassat, & crassiore reddit substantiam, vt indicant sapor acerbus & austerus à frigido crudo in substantia crassa & terrea: sic terrea omnia ob frigiditatem sunt substantiæ crassioris: & quo frigiditas maior, & diuturnior adest, eo crassiore reddit materiam: quod ostendunt lapides & metalla, pituita in nobis vitrea, humor melancholicus, ossa & partes aliæ in nobis multum terrenæ facis habentes. Sic medicamenta & alimenta crassæ essentiæ ægrè penetrantia, si liquida sint, ægrè comminubilia, si sicca sint.

2 Frigidum gelat & glaciatur, ac durum concretione facit, vt glaciem, niuem, grandinem, crySTALLUM, succinum, & gummi reliqua, ac resinas, butyrum, adipem, sanguinē extra vasa præsertim (hinc à frigido liuores, Aph. 17. & 20. lib. 5.) pituitam, metalla, & cætera id genus. Sic scirrhum tam per se

Li. 14. meth. natum ex affluxu aut congeſtione pituitæ, craſſæ aut humoris melancholici, quàm ſuccedentem phlegmonis, & eryſipelatibus immodicè refrigeratis coagulauit frigidum. Pigros facit ſpiritus, & tanquam congelat. Hinc ſenibus & moribundis ſenſus omnis & motus imbecillus & tardus, & actiones reliquæ animales, vt vitales, naturales, adiuuante tamen imbecillitatem hanc eorundem ſpirituum inopia. Ob id etiam frigus ſomnolentos facit, ſtupeſcit ſpiritus à frigido congelatos, & ſpiraculis in neruoſa ſubſtantia contractis à frigido & denſatis, per quæ ſpirituui via erat ad partes ſentientes & motas: ſemen ſupprimi, & omnem hæmorrhagiam contractis etiam ab eodem meatibus, per quos & ſpiritus ferri & aliæ materiæ debent. Id oſtendunt frigore torpentes partes ac ſtupeſactæ, aut narcoticorum contactu, animalia hyeme latentia mortuis ſimilia, hypnotica ſumpta, & fronti ac temporibus admota, noctes hybernæ ſomnificæ, Aph. 15. lib. 1. Vſus frequens caſei mollis, & lactucæ, & cæterorū ſomnificorū, quæ etiā ſemen gigni prohibent, & genitū ſupprimunt. Quod lamina plumbi lumbis admota etiā præſtat, & radix nymphææ, & alia omnia frigida. Pituita itē multa toto in corpore præſertim capite redundans, quo largior & frigidior, eò ſomnolentos magis & propè ſtupidos reddit.

Lib. 2. loc. affect.

Cap. 22.

Lib. 5. ſimpl.

Lib. 2. temp.

Frigus etiam glaciando impinguat: nam à frigiditate partium neruoſarum ex ærea ſanguinis ſubſtantia per vaſorum tunicas exudante & exhalante fit adeps. Oſtendunt mulieres & caſtrata animalia ob frigus obefiora. Tenſa & rigida durat & glaciatur, maximè ſi erant humida, vt linea madefaſta, funes nautici ſub gelu hyberno declarant. Quid quòd vaſa ſamiae, aſciæ, dolabræ, & alia id genus ferramenta in gelu mox rumpuntur: illa ſi liquorem habent, hæc ſi ligno adigas non præcalfaſta. Hinc à frigido diſtentiones & conuulſiones, Aph. 17. & 20. lib. 5.

3 Frigidum denſat poros cutis & meatus omnes corporis internos, tam occultos quàm manifeſtos: ob id calfaſti, ſi derepente refrigerentur ſiue potu largo frigida internis poris, ſiue reliſtis veſtibus, aut aliis calorificis, externis denſatis, omnino febricitant: ob id febricitantibus noxiuſ eſt aëris frigidi ad cutim occuſus, & frigida potus, niſi dictæ

Lib. 9. meth. ibi conditiones adſint. Mulieres item & ſpadones, quia viris frigid

frigidiores, meatibus his omnibus sunt angustioribus. Ad hæc hyberni aëris, & aliorum frigidorum contactu pori nobis contrahuntur: & venarum angustia, hepar: arteriarum, & sæpe thoracis, cor frigidius declarant.

4 Frigidum repellit & intrò protrudit admotum: foras, sumptum: ob id fluentibus materiis opponitur. In ventriculum enim fluente sanguine refrigerantia & astringentia damus, sed minus, quàm si sanguinis in eo coagulationem non timeremus. Idem frigidum admotum, aut foris incidens ex alto, tum contrahendo meatum, tum materiam velut glaciando, & sanguinis feruorem extinguendo fluxiones sistit. Hinc ferrum, ebur, frigida alia contusionibus recentibus applicamus, affluxurum sanguinem repulsuri: & eadem inter scapulo è regione magnorum vasorum, vertici, fronti, naribus applicamus fluente per eas sanguine immoderatus. Sic in artus fluxiones incipientes regerimus: si verò in partem penitiorē fluat materia, vt ischion, tunicam costas succingentem: aut si à parte principe fluat materia, vt in parotidibus à cerebro transmittente: aut si venenosa, pestilens, crassior, impactior sit materia, nec frigida nec astringentia adhibemus, sed digerentia magis, minus pro variis indicationibus hanc in rem necessariis: fluxionem verò in hepar, ventriculum, lienem etiam admotis repellimus, in thoracem & pulmonem sumptis, libro II. methodi. Frigidum eadem ratione catarrhos excitat compresso cerebro, & contenta in eo materia ad partes subiectas compulsa: flante etiam Aquilone frigido & sicco vento, alui duræ Hippocrati Aphorif. 5. libr. 3. Quòd autem vulgus vespere nudis pedibus super frigidam aream aliquantisper ambulando aluum sibi concitat, sed etiam colicos dolores vehemētissimos, vt in duobus vidi hoc mense Maio: id accidit à frigido resoluta vi retentrice ventriculi, ac intestinorum. Facile enim penetrabile frigus, vt calidum, per continentes sibi partes permeat, vt etiam cerebrum tandem attingat. Quod indicat torpor per calamum trementem, & lineam à torpedine pisce ad piscatoris manus transiens, vt in libro loc. aff. docet Galenus. Eadem vi succos biliosos ventriculo innatantes absinthium, aloë, rha barbarum, tamar Indi, prima subacerba deorsum pellunt, quos tria prima etiam clementer

Aph. 23. lib. 5.

*Cap. ultimo
Lib. 1. feb. &
lib. 8. meth.*

ex partibus vicinis attrahunt. Qui autem partibus affixi sunt humores, astringenti sua qualitate prædicta omnia tenacius affigunt, nisi amaro sapore anteuertant tergere, vt lib. II. method. de absinthio: sed vix passæ, præsertim nostrates, acidæ magis, clibano siccatae, bacculæ oxyacanthæ, & similia pituitam multam in os alliciunt ex cerebro, quod partes oris ab his fugentibus, siccantibus, contrahentibus inanitæ attrahunt, iuuante in id situ partis permittentis sublimi & liquidioris pituitæ prompto ad inferiora decubitu.

5 Frigidum coctioni tum alimentorum tum humorum in tumoribus tam cum febribus quàm sine febribus, & in venis, ac totius corporis habitu aduersatur & resistit. Nam vlcera & tumores omnes reddit insuppurabiles, Aph. 20. libro 5.

Hinc frigidorum ventriculorum coctio tardissima, sed appetentia plurima. Hinc etiam hydrops omnis frustrata & abolita sanguificatione, hepatis actione, refrigerati per se aut consensu aliarum partium. Frigidum etiam rem coqui coeptam, vt sic dicam, recrudat: ob id leguminibus coqui coeptis affusa, deinde frigida percoqui prohibet. Eadem ratione aqua puteana coqui promptè nequeunt legumina, nisi hæc antè cocta sit: nam ob crassitiem glaciata in intro permeare ad coquendum non potest, vti calore aliquo iam tenuata: qualis est fluuiialis, præsertim si longiusculè absit à fontibus, hiq̃ue orientem potius quàm septentrionem spectent. Sic fructus omnes ac semina autumnii frigus intempestiuum & immoderatus percoqui prohibet. Quod verò frigori tribuimus, idem calori imbecillo (quem ferè frigus vocamus) tribuendum est plantarum & animalium interno, atque etiam externo.

6 Frigidum est inimicum cerebro, spinali medullæ, nervis, atque adeò neruosis omnibus, & natura frigidis partibus, quibus calidum est amicum, Aph. 18. libro. 5. Nam pars omnis intemperata, sed adhuc intra fines sanitatis, à similibus suæ intemperaturæ causis promptè offenditur, transiitq̃ue in morbosam intemperiem. Modico autem contrariorum vsu ad mediocritatem transmutatur. Frigidum eadem ratione calidis partibus amicum ostendit inspiratio: & si febris est, aut citra febrem intemperies cordis calida, quo calor est maior, eo frigidior aërem expetit: sic & arteriarum distole,

stole, expiratio quoque & systole dictas partes refrigerant, quanquam per accidens vacuantes calida & fuliginosa excrementa, si tamen frigidior aër, nec antè fractus gargareone, & aliis oris partibus in cor trahitur, lædit, vt docet Gal. in vsu gargareonis. Item in vulneribus thoracis aut capitis penetrantibus chirurgiam exercere oportet in aëre calido.

Sic frigidum, qualis est nix, glacies, thoraci nocet, tusses mouet, à quarum violentia ruptis vasis, sreatum sanguinis excitat: cui nisi citò & tutò prospiciatur, phthisis, & hectica, & mors tandem superuenit. Cerebro item per refrigerantia compresso, destillationes, vt paulò antè dixi, fiūt, Aph. 24. lib. 5. & ipsum à sudore, pluuia, vel alio refrigeratum nec recalsactum, largam gignit pituitam, tum ex suo alimento, tum ex susceptis à corpore toto vaporibus, quos crassando promptè, affatim vertit in aquam: vt nostra capitella terrea, plumbea, vel alia materia, si linteo aqua frigida merso circundentur, largiorem aquam per capitellæ nasum mox profundūt. Mulieres refrigerato capite ab oleo Heræ ex nucibus viridibus factò in raucitatem, grauedinem, destillationem inciderunt, lib. 1. comp. ph. part. Multæ puellæ abluto sæpe per lixiuium capillo, vt flauescat, nec siccato, in morbos à capite frigidos & graues sæpe incidunt: præsertim quibus id erat frigidius vel natura, vel post natiuitatem.

7 Frigidum præter naturam & vehementius, tam internum quàm externum corrumpit, & enecat non animalia modo, sed plantas quoque permultas, & (quod semel vidimus miserabili hominum calamitate) inter ipsas triticum ipsum. Vites enim frequenter penetrabile frigus adurit, sic vt quædam moriantur. Hinc multi iter agendo per niuosa loca mortui riguerunt, & quibusdam partes mortuæ deciderunt, extincto in his calore natiuo à frigore valentiore. Sic cor aut cerebrum frigere, mors est, vt paulò antè dicebamus. Cor enim caloris natiui fontem semper feruere oportet, cerebrum frigere nunquam oportet, vt lib. de vsu pulsuum & partium. Ob id Hippocrati lib. 1. prognosticorum expiratio per morbos acutos frigida maximè est lethalis: minus lethale est in eisdem morbis extremas partes frigere: magis genitalia, & nares, & aures, & partes alias capitis, quòd genitalia etiam inter principes partes referat Galenus cap. 9. artis me-

dicæ: hæ autem frigidum cerebrum declarant. Sic interna frigiditas eodem calore vel extincto (vt Aph. 21. lib. 5.) vel foras expulso (vt cap. 5. lib. 4. meteororum Arist.) corrumpit.

Idem frigidum denigrat & obscurat. Indicat sanguis refrigeratus in parte aliqua per ecchymomata, aut aliter effusus, vel extra corpus aperto vase emissus: ostendit idem sanguis melancholicus. Mortuis quoque, timidis, tristibus, vigilibus, longo carcere clausis, decolorationem quandam & pallorem inducit, coloremq; plumbeum, vt initio lib. 12. meth.

Aph. 21. lib. 5.

& lib. 3. temp.

Aph. 15. & 18.

lib. 1.

Lib. 9. method.

Frigidum per accidens calefacit, carnosum enim ætate media, in meridie affusa frigida calefacit calore primùm intro compulso, deinde eiusdem intus aucti ad cutim reuocatione. Quæ reuocatio si non fiat, sed paulatim calorem intus colligat, coctionem iuuat: ob id ventres hyeme & vere natura calidissimi: si verò imbecillus est calor, eum extringuit. Ob id cuti febricitantium occurrens frigus eamq; densans, calore febrili transpirare prohibito, & inde intus aucto febris augeat. Hinc diariæ, & interdum putridæ à cute per frigus densata, & prohibitis ob id excrementis diffuari, vt in febribus, & 8. & 9. methodi abundè docet Gal.

Frigidum etiam siccatur non ex prima facultate, sed per accidens, humectante materia quæ fluit, & quadantenus quæ fluxit in vicinas partes per frigus admotum expulsa. siccatur quoque per accidens, dum calorem expellit, quod is multam simul humiditatem sibi pabulum educit, Galenus libro 5. simpl. cap. 4. & Arist. cap. 5. lib. 4. meteororum: & Gal. lib. 1. comp. ph. gener.

*Cap. 4. libr. 5.
simpl.*

Frigidum per accidens humectat, compressam à se humiditatem in vicinas partes regerens: eandem à cerebro in partes subiectas deprimens, ac in corpore densato humiditatem intus multā concludens. Quo fit, vt nobis hyeme interna non modo calidiora sint, sed etiā humidiora ab aëris nos ambientis frigus, effluuium nostræ substantiæ largius prohibens.

Frigidum etiam per accidens nos humectat, non consumpta ab eo humiditate superflua aut etiam naturali. Quæ res quosdam impulit, vt negarent temperamentum frigidum simul & siccum posse consistere: quod tamen reuera aliquandiu consistit, semper non consistit, vt libro primo temp. docet Galenus.

Has calidi & frigidi actiones ferè auget essentiæ tenuitas, moratur crassities: utrūq; enim cum tenui essentia promptius in profundum subit, citius mordet ac vlcerat, in minima friatur, nisi lentor aut durities iuncta repugnet, cum crassa contra: hinc caustica crassæ essentiæ sunt dolorifica magis.

Horum effectuum calidi & frigidi singulorū testimonia adscribere potui, sed non visum est, quod illa nimis multa essent, & quod sint testibus fidē faciētibus, etiā puero perspicua. Ex problematis omnibus, & libris Hippocratis & Galeni proferre non fuerit difficile: cum in has qualitates primas & reliquas duas omnium propè effectorum causæ reducantur vel primo vel secundo & aliarum qualitarum interuentu.

Siccitas & humiditas magis materiales sunt qualitates, minusq; efficaces, ob id earum actiones minus latē patēt, quàm calidi frigidi: tamen ociosæ non sunt, sed aliquid etiam agunt (vt in quatuor elementorum actionibus primariis & secundis probauimus) & actiones aliæ quædam primas has siccationem scilicet & humectationem sequuntur.

Siccatio enim durat: quandoquidē omne siccum si modicè calens siccum permanet, durum est. Id ostendit lutum æstiuo sole duratum, lateres etiam igne siccati. Ossa item, cartilagine, ligamenta, & reliquæ corporis nostri partes solidæ, id est, crassæ & duræ, & animalium cæterorum, atq; adeò plantarum omnium: maioris tamen & minoris ratione in singulis horum generibus latissimè fusa: ac etiā in vno alicuius corpore, in quo sunt ossa siccissima, ob id durissima, & quo sicciora sunt, eo etiam sunt duriora caro & adeps & nerui sensifici minimum sicca & dura: in medio horum reliqua est latitudo magis & minus siccarum partium. Omnes verò tandē adeò siccantur, vt rigidæ ac inflexiles duræq; fiant à calore nostro humidū depascente, & à siccitate in nobis ignea, sed multo largiore terrea. Vnde sanitatis tuendæ scopus est non mediocris, siccitatem illam præproperā frangere, ac ne tam citò fiat prohibere humectante victu. Idem ostendit conuulsio ex inanitione omnis seu siccitate, qualis plurima & periculosissima morbis acutis superuenit. Item lapides, metalla, terrea denique omnia ob id dura, quod sint sicca, & quanto duriora, tanto sicciora, & contra: dum vt dixi, modice calentia talem retineant duritiem, cum terra ipsa elementum si vsquam inueniat

Lib. 7. meth.

Lib. 2. temperamēt.

Li. 1. prognost. Hippo. Gal. in lib. de nat. hu.

ueniatur, sit adamante durior ob siccitatem summam.

*Cap. 4. lib. 5.
simp.*

Ibidem.

Lib. 1. c. ph. g.

Siccum autem quia bifariam siccatur, duobus etiam modis duratur. Primo, humorē in poris & spatiis contentum ebibendo. Deinde alterando & ficiorem reddendo partium essentiam, consumendo scilicet ipsarum humiditatem. Possis alias ficcationes duas addere dictas lib. 7. methodi, sed remotiores sunt, & quæ possint sub harum priorē cōtineri. Quod autem ficcans secundo loco diximus, id est, quod etiam propriē durum efficit. Nam durum repletionē est renitens: durum coactione est congelatum & coagulatum. Siccantia enim propriē & primariō nominantur, quæ digerunt, & temperamentum ad ficiorem statum perducunt, qualia sunt omnia vacuantia præsertim insigniter, siue per se vacuent, ac nostram substantiam dissipent, ut medicamēta purgantia, hæmorrhagiæ omnes tam spontinæ quàm medicæ, urinæ largiores, ut in diabete: sudor profusior, ut in cardiaca affectione: semen largius, in venere: siue per accidens, ut inedia, aut victus tenuior, & quæ calorem acriorem reddunt, ut labores immodici, usus acrium, salforum, & reliquorum immodicē calidorum. Adde omnes animi affectus, aërem calidum, siccum, & cætera, quæ corpus per se aut per accidens quouis modo vacuant.

Lib. 11. simp.

Humectationem sequitur mollitio. Omnia enim humida sunt mollia, si cum calore tantum modico humida perseuerent. Ob id sanguis, pituita, & reliqui humores, quia liquidi consistentia sunt (licet horum quidam siccant) etiam molles sunt, & adeps mollis, magis quidē humidiorum animalium, qui propriē pinguedo dicitur: minus verō mollis & crassior terrosiorum, qui propriē adeps vocatur. Caro item mollis eunuchorum, puerorum, mulierum, utpote humidiorum: duriuscula, fossorum, nautarum, agricolarum. Sic lutum & terra imbre irrigata mollescit, rubigo ferramentorum, oleo: rubigo dentium, aqua diacalciteos: adamas & calculus in nobis, sanguine hirci calido: vnio & testa oui, aceto: ebur zytho vel oxycrato, id est, posca mollitū fit tractabile: metalla quoque singula suum habent emolliendi genus, quod tractabilia magis ea sine igne reddat: quanquam ea etiam tum humida verē non sint.

Humectatio & ab ea mollitio fit vel penitissimē in totam partem

partem nostram, idque per solam nutritionem, vel superficie tenus & per spatia rerum humectatarum inania, non autem per totum, qualis ea quæ fit à balneo vel fotu aquæ dulcis, vel olei maturi. Hæc enim spatia quidem inania humore suo replent, & madorem quædam solidis partibus addunt: earum autem substantiam totam non reddunt humidiores, seu humidum earum substantificū non verè instaurant. Quanquàm est credibile, tenuiore eius madoris parte humidum ipsum quadantenus recreari. Vera autem partium humectatio per solam fit nutritionem, hoc est, vacuatæ triplicis nostræ substantiæ repletionem, lib. 4. simpl. cap. 9.

Harum autem facultatum quasdam ratione prima & sola inuenimus, alias sensu interdum vnico: est quando etiā duobus & tribus & quatuor. Neque enim calcem & niuem, quòd candida sint, rosam quòd rubra, vt calidam aut frigidam dicas, sufficit: sed tactus visui additus calcem calore causticam, niuem frigore glaciantem inuenit, & nobis id firmiter persuadet: ac inde saporem aliū esse falsum, alium acrem, alium amarum, aut dulcem gustatus iudicat, vt calidum frigidum humidum siccum tactus. Multorum item probationem ex odore molimur, & facultatis eorum robur ex vehementi exhalatione deprehendimus, vt virtutis imbecillitatem ex odore remisso. Propterea quæ in odoratorum genere sunt odoratissima, illa in eodem præstantissima putantur, vt post audies. Alia calidi, frigidi, humidi, sicci significata, & singulorum exempla non protuli fuga sermonis prolixioris.

Coniugatas inuicem actiones primas calfactionem aut refrigerationem cum humectatione vel siccatione, quæ sequantur secundæ vel tertiæ actiones, ex prædictis simplicibus colligere non erit difficile. Sunt autem facultates & actiones tertiæ, quæ vltius procedendo propè particulatim appellantur: vt sarcotica, colletica, epulotica, vretica, vomitoria, ecco-protica, errhinos, apophlegmatica, menses ciendi aut sistendi facultas, seminis generatrix, extinctrix, prouocandi, reprimendi. Quales magna ex parte primas simul & secundas sequuntur: vt sarcoticum siccum ad primum gradum: detergens, colleticum siccans & astringens: epuloticum siccans, ad secundum gradum valenter astringens.

Gal. in theriaca ad Pisonē.

Lib. 3. method.

Est

Est quando in neutram possis aperte reiicere hanc tertiam: vomitorium enim est hoc, illud ut bulbus vomitorius, nux vomica, agaricus, elleborus albus, non ob aliquam qualitatem primam vel secundam, sed quia vel substantiæ suæ raritate innatant, vel stomacho sua substantia sunt contraria.

Sed quæ ex secundis desiderari possunt, & quæ ad tertias pertinent tum facultates tum actiones, sic accipe ex libro 5. simpl. Gale. quorum exempla ex libris simplicium sequentibus collocupletare possis.

Tenuantia sunt calida, tenuium partium, ut cinnamomum, piper, zingiber, casia, aristolochia.

Plato in Timæo, & lib. 1.

usus part.

Cap. 3. lib. 5.

simpl.

Corpus durum molle

Crassantia frigida, crassarum partium, ut malicorium, balauftium, galla.

Durum est, cui caro nostra temperata cedit.

Molle, quod cedit carni eidem, id est, cuti.

Absolute seu in summo, terra dura, aer, & aqua mollis.

In victoria seu excessu, os durum, caro mollis.

In collatione ad symmetrū, vel quoduis obuium, vel seipsum dum habebat secundum naturam, id est, durius mollius: quo significato hic audiendum est.

Valido & longo motu, solis æstu, medicamentis siccantibus, sumptis vel admotis, inedia per accidens siccante, febre ardente aut longa, affectibus animi, vigilia, etc. causis siccantibus.

Siccitate, quæ proprie siccum dicitur, à

Humectatione

Corpus durum, id est seipso dum sanum erat, durum

Cócretione, quod proprie durum dicitur, à

Vehementer frigido humore in partem affluente, vel in ea ob frigidam intemperiem nato, vel à frigidis admotis in ea congelato.

Calfactione

Fit molle.

Repletione, quæ proprie renitens dicitur, à

Largi & superflui humoris aut vaporis in partem aliquam affluxu

Vacuatiõe per frigida, calida, sicca

Tensio

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------|
| Tēſio articu li vel alteri ⁹ | { | Siccati pluſculum, humectatione | } | Laxa tur. |
| | | Refrigerati immodicè, calfactione | | |
| | | Inflammati, vacuatione humoris | | |
| | | Scirrhum patientis, emollientium | | |
| | | vt œſypi uſu | | |

Cutis etiam tenditur à ſubiectis ei muſculis tumentibus, *Cap. 10.*
vel à carnis copia. Partes etià aliæ tenduntur repletione qua-
uis, laxantur à cauſis contrariis. Articuli verò ferè laxantur
humectatis ipſos ambientibus ligamentis & tendonibus.

Rarefaciens eſt, quod poros cutis dilatat, calidum modicè, *Cap. 13.*
ſiccum minimum, tenuium partium : vt chamæmelum, al-
thæa, oleum vetus, chamæmelinum, ricininum.

Denſans huic contrarium, poros contrahit, frigidum a-
queum non terreum, non aëreum, non aſtringens: vt aqua fri-
gida, ſemperuium, portulaca, tribulus viridis, lens paluſtris.

Anaſtomoticum, id eſt, ora venarum & arteriarum ape- *Cap. 13.*
riens, eſt calidum, acre, mordax, craſſarum partium, & terre-
num: vt cyclaminus, allium, porrum, cæpa, fel taurinum.

Stenoticum, id eſt, eadem ora conſtipans & contrahens, eſt
frigidum, aſtringens, craſſarum partium, non acre: vt bolus
Armenia, & terrenorum corporum magna portio.

Attrahens, ſuccos ex alto vehementiùs euocat, calidum, te- *Cap. 16.*
nuum partium : vt dictamnus, thapſia, ſagapenum, ferment-
tum, ſimus columborum & anſerum, fæx vini viſta, calx vi-
ua, ſandaracha, quæ etiam incidunt, digerunt, rodunt: attra-
hens ſimilitudine totius ſubſtantiæ medicamentum purgans
& alexiterium poſt dicetur.

Repercutiens, ſuccos occurrentes in altum repellit, frigi-
dum eſt, craſſarum partium : quod ſi etiam aſtringit, multò
magis repellit, vt acerba, auſtera.

Modicè repellunt roſarum folia, flores, ſuccus, ericæ fru- *Initio lib. 4.*
ctus, palmulæ, capreoli vitis, germina & folia rubi, canirubi, *c. ph. p. &*
aſpalathi, cyperus, malobathri folium, radix ſpicæ nardi, cro- *lib. 6.*
cus, lycium, hypocithis: magis acacia, omphacium : maximè
malicorium, balauſtium, galla omphacitis, rhus vterque, fru-
ctus myricæ, ſpina Aegyptia. Succus tamen ex nucum vigen-
tium corticibus expreſſus maximè aſtringēs, tenuiſſimæ eſſe
ſubſtantiæ oſtenditur, quòd lanarum ſubſtantiā totā &
manus contractantium penitus tingat & contumaciſſimè, ita *Lib. 6. c. ph. p.*
vt ge.

vt generosissimis absterfionibus elui nequeat. Astringentem enim substantię tenuitas iuuat maximè, quòd astringentia ob substantiæ crassitiem in altũ corpus penetrare non possunt, & densata astrictaque ab his superficie corporis cui admoventur, viam sibi ad interiora præcludũt, ob id partes inflammatas minùs iuuant.

Cap. 10.

Emplasticum, id est, illinens, quòd poris corporis illitum tenaciter hæret, est glutinosum, terrenum non acre, vt butyrum, adipēs, oleum, resinæ, gummi: sic aloë, bolus Armenia, gypsum, farinæ addito liquore emplastica euadunt. Eadem sunt emphractica, id est, obstruentia poros suo lentore, quos tamen aloë sumpta amarore terget & aperit.

Cap. 11.

Eccatharticum, id est, poros omnes expurgans, est acre, partium per adustionem tenuium, nõ glutinosum, vt nitrum, aphronitrum, abrotanum, orobus, lupini amari, amygdalæ amaræ, & cætera nitrosa & amara, etiam si parum astringant, vt absinthium: sed hæc & similia poros cutis non purgant, internos latiores purgant.

Hæc eadem sunt ecphractica, id est, obstructionem tollentia pororum, tum internorum, vt hepatis, lienis, venarũ: tum cutis. Præter ea (vt nuper dixi) quæ etiam astringunt. Hæc etiam sunt rhyptica generatim dicta.

Rhyptica speciatim fordem à cute & vlcerebus tantum tergent, non etiam obstruata liberant, quia sunt amaris imbecilliora, salsa scilicet & dulcia: vt sal, mel, hordeum, faba, amygdala dulcia.

His contraria sunt emphractica, id est, obstruentia multitudine, crassitie, lentore. Dulcia quoque hepar & lienem promptè obstruunt, quia ceu iucunda citò ab his rapiuntur ante coctionem.

Lib. 1. c. ph. p.

Tergentia etiam pilos tenuant, vt nitrum vstum, nitri spuma, fistiles testæ, pumex, buccinorum & purpurarum & cæterorum ostreorum testæ vstæ, tritæ, tenui cribro cretæ: sic ossa sepia etiam non vsta, alcyonium, struthij, bryonia, dracontij, aristolochiæ radix, veratra, furfur, beta, lixiuium.

**Initio lib. 7.
c. ph. par.**

Tergent modicè, farina fabarum, hordei, ciceris, semen lini torrefactum: magis terebinthina, thus, mel despumatum, amygdalæ amaræ: valentiùs erui farina, semen hormini, radix ireos, & panacis. Valenter tergentia omnino etiam digerunt,

Lib. 2. c. ph. g.

runt, ob id valde siccant.

Anodynum, id est sedans dolorem, vacuata doloris causa, *Cap. 18. lib. 5.*
calidum primo gradu, tenuium partium: ut chamæmelum, *simpl.*
panis calidus, lac, adeps anseris, gallinæ, suillus, 1. lib. pharm. g.
Narcoticum autem frigidum, crassum, ut opium, mandrago-
ra, papauer, hyoscyamus nomine tantum abusuè anodynum
dicitur, quia tactum stupefacit, sine quo non est dolor.

Odyneron verò, id est dolorificum, quicquid affatim alte-
rat, aut continuum soluit.

Suppurantia in pus vertunt humorem tumefacientem & *Cap. 2. 5. 6. 7.*
carnem contusam: sunt calida quantum pars suppuranda, ita *8. lib. 5. simpl.*
ut essentiam caloris augeant, qualitatem non intendant, nec
obundant. Sunt & humida, sic tamen ut nec augeant, nec
minuant humiditatem partis naturalem, quod saltem sit ma-
nifestum & sentiri queat, sed aliquid excrementi in spaciis
vacuis contenti per halitum digerant. Sunt denique em-
plastica, porisq; obstructis essentiam caloris augent: ut hy-
drelæum, panis cum oleo, pix, adipēs, medullæ, gummi, radix
althææ. Agunt igitur caloris quantitate: emollientia autem
caloris qualitate: sunt enim calidiora nobis, & humiditatem
excrementitiam, & naturalem partium humorem modicè
desiccant, phlegmonas & alias dispositiones coquit myrrha,
crocus, castorium, thus, fœnigræci cocti succus, quæ & dige-
runt, præsertim myrrha.

Escharoticum, id est crustificum, ignis modo & cauterii *Cap. 14.*
corpus colliquat, & sæpe escharam facit, est calidum siccum
quarto gradu, crassæ essentiae, dolorificum: ut calx viua, fæx
vini vsta: quamuis enim vrendo tenuiora seipsis euaserint,
crassa tamen adhuc sunt essentia. *In fine lib. 5.*

Septicum, id est putrefaciens, etiam causticum & vrens, *Cap. 14. lib. 5.*
parum vehementer, est calidum siccum minus, essentiae ta- *simpl.*
men tenuioris, exiguo morfu, & dolore aut nullo: ut arseni-
cum, sandaracha, chryfocolla, aconitum.

Cathæreticum, id est superficiem solam detrahens, & hy- *Ibidem.*
persarcosin absumens, unde & sarcophagon quoque dicitur,
est calidum siccum minus quàm septicum: ut flos Asiæ pe-
træ, æris squamma, æs vstum non lotum.

Sarcoticum, id est carnem gignens in vlcere cauo, est sic- *Cap. 15. lib. 5.*
cum ad primum gradum, detergens modicè & sine morfu, *simpl. & lib.*
3. meth.

k non

non astringens : vt hordei farina, thus, & quæ plurima lib. 3. methodi describuntur.

Ibidem. Colleticum, id est glutinans carnem in vlcere, est ficcius sarcotico, astringit, non terget : vt omnia acerbæ & austera.

Ibidem. Epuloticum vel synuloticum, id est cicatricem vlceri inducens, siccat & astringit magis quàm colleticum, non terget, vt æs vstum in dura carne : in molli autē lotum, malicorium ficcum largius inspersum, & puluis tenuissimus cathartici-
corum paucus, vlceri inspersus cuspidē specilli.

Cap. 21. Vreticum seu diureticum, id est vrinas mouens, mediocres quidem eccatharticum, plurimas verò acrius, calidius, ficcius medicamentum : vt semen apii, petroselini, fœniculi, dauci, & quæ lac augent, ac menses cient.

Cap. 20. & 22. Lac gignunt ex sanguine { Pauco, victus calidus, humidus, plenior.
Pituitoso, calida primo vel secundo gradu, nō
siccatia, vt eruca, anethū, fœnicul⁹, virētia.
Bilioso, purgaria bilē, vict⁹ calidus, humidus.

Menses mouentia calida sunt magis, quàm lac gignentia, & sicca modicè : vt sabina, calaminthe, pulegium, daucus, & alia permulta : quorū catalogus exprimeretur in syrupo arthemisiæ.

Semen gignentia & prouocantia calida flatuosa, bene nutriendia, vt bulbi, fabæ, scincus, satyrion, eruca.

Semen extinguentia & corrumpentia, refrigerantia, desiccantia, totis substantiis contraria : vt nymphæa. Sic ruta, agnus, suo calore seminis substantiam consumunt.

Semen supprimunt frigida alimēta, & medicamenta sumpta & admota : vt lactuca, blitum, atriplex, cucurbita : quæ ipsum cogunt, incrassant, stabile reddunt.

Cap. 19. lib. 5. Cathartica, id est purgatoria, vel communiter quæ excrementa quouis modo vacuant (vt bechica, errhina, apophlegmatismata, vretica, menses mouentia) vel per excellentiam, quæ vomitu aut ventris deiectione humorē sibi familiarem trahunt, non solo calore sed qualitate quæ in substantiis sunt, proprietate, seu totius substantiæ similitudine, & simili elementorum quatuor mistione. Quæ res sola experientia cognoscitur, quamuis in quibusdam color aliquid eius insinuet, id tamen non certò, vt aloë, rhabarbarum, flaua & amara bilem flauam & amaram trahunt : & myrobalanus, citrina. Cnicus autem & elleborus albus, & turbith album, & agaricus

cus albus, pituitam : elleborus niger, myrobalanus Inda & nigra, humorem melancholicum. Trahit autem medicamentum humorem, non trahitur ab humore: quia ob calorem suum est potentius in attrahendo : sunt enim omnia sic purgantia potestate solida. Eadem si non purgant, cocta in humorem transeunt, qualem attrahunt: nisi quod horum quædam in nobis corrupta in venenum abeunt.

Aph. 24. lib. 1.

Hypercathartica, id est superpurgantia, sunt ex his valentiora viribus aut quantitate, & quæ vacuato humore sibi familiari, eam deinde trahunt, qui ob tenuitatem, calorem, liquiditatem, est ad sequendum paratior: postremo sanguinem naturæ maxime familiarem. Morsu enim suo venarum ad ventrem pertinentium ora laxat & aperiunt, vasaq; ipsa reddunt imbecilla ob fatigationem & intemperiem. Hæc aliis sunt vacuanda vel obtundenda, ut cesset hypercatharsis.

Cap. 26. 27. lib. 3. simpl.

Bechica sunt tam quæ tussim excitat, ut cap. 17. lib. 2. quam quæ eam sedant, ut cap. 1. lib. 5. & bechicæ hypoglottides in compositione med. part.

Ecstatica, id est mentem alienantia, ut croci magna copia, solanum manicum.

Euchyma sanguinem bonum gignentia, hoc est, rubentem, crassi & tenuis medium.

Cacochyma, quæ biliosum, vel pituitosum, vel melancholicum, vel aquosum gignunt.

Epicrastica, quæ paulatim bonum succum sufficiunt in locum mali paulatim vacuati, unde epicrasis, Gal. lib. 9. meth. Sunt etiam quæ obtundunt aliorum malignitatem vel morbum, ut vicia passa mordentes mediocriter stomachum humores obtundit, lib. 2. alimentorum.

Exasperantia, quod lenius vel mediocre in cavitatibus fuit, & excrementis, ut acerba, austera, cruditas parientia.

Lenientia asperatas cavitates, ut ova mollia & recetia: item dulcia asperam arteriam læuem faciunt, & cancani herbæ radix, gummi, tragacantha, glycyrrhiza, vina dulcia.

Gal. in simp. et lib. 7. c. ph. p.

Quæ ex dictis facultatibus qualitates primas, vel simplices, vel coniugatas nullius alterius interuentu sequuntur, ut molliens caliditatem, humiditatem : durans frigiditatem, humiditatem : laxans, humiditatem: tendens, siccitatem : hypnotica frigiditatem, secundæ sunt : etiam si adsit substantiæ tenuitas

vel crassities adiutrix, vt crassans, repellens, alstringēs, stipans, frigidam, crassam : rarefaciens, digerens, attrahens, anodyna, hydrotica, vretica, calidam, tenuem substantiam sequuntur: aperiens, detergēs, expurgans, caustica, calidam crassam. Præter quæ multis etiam adest substantiæ similitudo, vt in purgantibus, lac & semen generantibus facultatibus, quæ rectius in tertias reiciuntur, vt quæ primas simul & secundas sequuntur: qualis etiam sarcotica calida attrahens, detergēs, siccans: epulotica siccans, alstringēs: colletica siccans, cogēs, & cætera, quæ suprâ retulimus. In quibus exempla plura si requiris, ex libris simplicium sequentibus quintum sufficere possis.

Facultates

quartæ.

Cap. 1. & 12.

lib. 5. simp. &

lib. 10. simpl.

Magis etiam procedendo, ad particulares peruenitur facultates, quæ à partibus vocantur cephalica, cardiaca, stomatica, stomachica, hepatica, splenica: vel à morbis partium, ischiadica, nephritica, podagrica, colica, pleuritica: vel ab effectis, bechica, *λιδωρ τρυπηλική*, id est, calculos comminuens, sarcotica, colletica, epulotica, cathæretica, cathartica, carnem super ossa nuda creans, foetum corrumpens, foetum extrahens, ad chœradas discutiendas, ad epilepsiam, spasimum, & alia propè infinita similiter dicuntur. Tamen sarcotica, colletica, epulotica, tertiæ dicuntur, lib. 6. comp. ph. gen. & aliæ ex tertiis inter quartas recenserî eadem ratione possunt: vt lac, semen, menses, vrinas, sudores respicientia. Reuerâ enim quædam horum ambigunt, & vtrique generi vicina sunt. Ob id Auerrois. v. col. cap. vltimo tertiam & quartam in vnam miscet. Alii quatuor hæc facultatum genera aliter distinguunt, vt primæ sint calfactrix, refrigeratrix, humectatrix, siccatrix: secundæ, quæ primos effectus primarum sequuntur, vt vis aperiendi, claudendi, erodens, glutinatoria: tertiæ, quibus medicamenta vnam partem magis, quam aliam respiciunt: quartæ sunt à virtute & forma occulta seu specifica, vt purgatrix, venena expellens. Quibus vreticam & hydroticam mirum est per hos adiungi. In quorum multis sufficit dicere hoc hactenus calidum, frigidum, humidum, siccum, tenuium partium, vel crassarum, amarum, vel alio sapore præditum. Hic enim certius medicamentorum temperiem & facultatem declarat.

Sapor enim acerbus terreus, ob id frigidus, crassæ substantiæ, refrigerat, crassat, densat, constringit, repellit in superficie potius.

Austerus

Austerus illi temperamento & facultate in ipso sita, proximus est & insipidus.

Acidus, aquosus, frigidus, tenuis citra calorem, incidit, tenuat, mordet, obstructiones liberat, repurgat.

Dulcis, calidus modicè, coquit, maturat, laxat, rarefacit.

Oleosus, aqueus & aëreus, humectat, laxat, mollit.

Salfus, terreus, calidus, hinc digerit, terget, illinc cogit, contrahit, densat: utroque fccat, & salsa à putredine vindicat.

Amarus, terreus, per adustionem tenuatus, calfacit, fccat, tenuat, terget, incidit, expurgat, menses mouet, crassa expectorat, epilepticis prodest.

Acer, igneus, calidus, tenuis, calfacit, tenuat, incidit, trahit, digerit, purgat menses, vrinas, sudores mouet, vrit, exedit, liquat, crustam facit.

Facultates autem à partibus nominatæ sunt, non quòd omnibus partis, quam nomine designant, affectibus conueniãt, nec quòd ita vni parti conducant, vt nihil aliis partibus prosint, sed quia frequentissimè & magno cum fructu ac potissimum partem iuuant, à qua nomen sunt mutuatæ: vt cephalicæ caput, oticæ aures, ophthalmicæ oculos, odonticæ dentes, stomaticæ os, stomachicæ stomachum, pleuriticæ costas, hepaticæ hepar, splenicæ splenem, nephriticæ renes, arthriticæ articulos, ischiadicæ coxam, podagricæ pedes: & aliæ simili ratione.

Adhæc quæ medicamenta humores vel alterant, vel totius substantiæ similitudine vacuant, id æqualiter in toto corpore præstant. Ob hæc illis facultates illæ à partibus nominatæ sunt miscendæ, cum in ipsis partibus humorem coquere, vel ab his vacuare volumus: vt oxymeli pituitam coquit, incidit, tenuat, vacuat ex æquo in omnibus corporis partibus: cum pæonia verò aut bethonica coctum id valentius in capite præstat: cum capparibus aut tamarice in liene: cum eupatorio in hepate. Quæ igitur capiti tota sua substantia sunt familiaria, vsu maiorum probata, & practicum quos vocant, sunt ferè hæc.

C E P H A L I C A .

CALIDA SIMPLICIA.
Bethonica

Maiorana
Salvia vtraque

k 3

Ruta

Ruta vtraque
 Calaminthe vtraque
 Satureia
 Hyssopus
 Pulegium
 Melilotus
 Chamæmelum
 Stœchas vtraque
 Lauri folia & baccæ
 Acorus verus
 Pæonia vtraque : sed mas po-
 tior fœmina
 Aristolochia omnis
 Cubebæ
 Nux moschata
 Moschus
 Ambra
 Colocynthis
 Castorium.
 FRIGIDA SIMPLICIA.
 Rosa
 Viola
 Myrthi folia, flores, baccæ
 Salicis folia, flores
 Nymphææ vtriusque flores
 Caphura
 Quæ verò his sunt frigidio-
 ra & narcotica, sunt vsu

periculosa.
 Hyoscyami folia, & flores &
 semen
 Mandragoræ radicis cortex
 Cicuta, præsertim maior &
 cruda
 Papauer, præsertim nigrum,
 & ex eo opium
 Nymphææ folia recentia.
 FRIGIDA COMPOSITA.
 Electarium de gemmis
 Aurea Alexandrina
 Elect. *Ἀνδρομύτων*
 Dia castorii
 Diambra
 Pliris duplex
 Aromaticum, rosatum
 Tinnitui aurium oleum bala-
 ninum, philosophorum, eu-
 phorbii, laurinum profunt.
 Saccharum & mel
 Rosatum,
 Violatum,
 Nymphæatum.
 Dia moron verò, & dia ca-
 ryon Phlegmonis oris con-
 ueniunt.

PNEVMONICA, THORACICA, PLEVRITICA.

CALIDA SIMPLICIA.
 Glycyrrhiza
 Vuæ passæ
 Amygdalæ dulces, & ex his
 oleum
 Strobili, id est, nuclei pinei
 Pistacia recentia
 Dactyli

Auellanæ
 Saccharum & mel
 Hyssopus, Prasium
 Iris, Calaminthe
 Origanum, Brassica
 Enula, Squilla
 Radix maluæ & althææ
 Crocus, Myrrha

Spica,

Spica, Pulmo vulpis.

Agaricus.

FRIGIDA SIMPLICIA.

Hordeum

Lac vaccinum

Amylum

Semen bombacis & papa-
ueris

Viola

Iuiubæ

Sebesten

Psyllium

Adiantum omne

Mora

Santala

Gummi acaciæ

Tragacantha.

CALIDA COMPOSITA.

Dia penidion

Dia hyssopi

Dia prafii

Dia dios

Dia calaminthe

Dia iris

Linctus de pino, de squilla, de
brassica.

FRIGIDA COMPOSITA.

Dia penidion sine spe-
ciebus

Saccarum violatum

Dia tragachantum frigidum

Electarium resumptiuum.

C A R D I A C A.

CALIDA SIMPLICIA.

Amomum

Cardamomum

Cinnamomum

Xylaloë

Cubebæ

Caryophyllum

Doronicum

Enula Campana

Buglossum vrunque

Ozimum

Polium

Rosmaris

Mentha

Melissophyllum

Cortex citri

Crocus

Moschus

Ambra

FRIGIDA SIMPLICIA.

Rosa

Viola

Nymphæa

Aurum

Argentum

Sapphirus

Hyacinthus

Smaragdus

Vniones

Corallium

Ebur

Santala

Succinum, Caphura

Terra sigillata

Belletzicæ myrob.

Os à corde cerui

Semen oxalidis

Sericum crudum

CALIDA COMPOSITA.

Diambra

Dia margariton calidum

Exhilarans Galeno adscripta

k 4 Elect

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Electarium de gemmis | Syrupus rosatus & violatus |
| Confectio alkermes | Dia margariton frigidum |
| Aromaticum rosatum | Electarium trium fantal. |
| FRIGIDA COMPOSITA. | Frigidi fructus conditi |
| Diarhodon sine speciebus | Trochisci de bolo |
| Saccharū rosatum & violatū | Trochisci de caphura. |

STOMACHICA, GASTRICA.

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| CALIDA SIMPLICIA. | Melones |
| Amomum | Pyra |
| Cardamomum | Cydonia & cæteri austeri |
| Cinnamomum | fructus |
| Zingiber | Portulaca |
| Piper omne | Lactuca. |
| Nux moschata | CALIDA COMPOSITA. |
| Macis | Diacydonium Gal. |
| Caryophyllum | Diagalanga |
| Xylaloë | Diacuminum |
| Spica, Casia | Dianisum |
| Cortex citri | Dia rion peperon |
| Salvia | Oleum cnici & piperum |
| Mentha | Zingiber conditum |
| Abfinthium | Cepulæ myrob. conditæ |
| Maiorana | Cortex citri conditus |
| Anisum | Aromaticum rosatum |
| Cuminuin | Elect. stomachicum. |
| Mastiche. | FRIGIDA COMPOSITA. |
| FRIGIDA SIMPLICIA. | Saccharum & syrup. rosatus, |
| Rosa, Viola | violatus |
| Malum granatum triplex | Cydonia, aut persica, aut fru- |
| Cucumer | ctus alii austeri conditi |
| Cucurbita | Diafantalon. |

HEPATICA.

| | |
|----------------------|--------------------|
| CALIDA SIMPLICIA. | Cinnamomum |
| Abfinthium, præcipue | Calamus Aromaticus |
| Ponticum | Malabathrum |
| Schoënu anthos | Afarum, Apium |
| Spica nardi | Fœniculus, Anisum |

Ammi,

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Amni, Daucus | Semina quatuor frigida, ma- |
| Squilla | iora & minora quæ vocât. |
| Cicerum decoctum | Santala |
| Eupatorium, id est, agrimo- | Caphura |
| nia | Ebur |
| Chamædrys | Adiantum omne |
| Fumaria | Ruscus & asparagus media |
| Cassutha | esse possunt: tenuitate ta- |
| Amygdalæ amaræ & dul- | men essentia obstru-ctio- |
| ces, & cætera propè ama- | nes liberant. |
| ra & dulcia, quæ ipsum | CALIDA COMPOSITA. |
| tamen promptè obstruunt | Rosata nouella |
| præter saccharum & vuas | Antid. de aromatibus |
| passas. | Diarhodon abb. cū speciebus |
| FRIGIDA SIMPLICIA. | Dianisum |
| Lichen, id est, hepatica | Diacyminum |
| Intybus vterque | Diacalaminthe |
| Cichorium omne, vt scario- | Diospoliticum |
| la, cicerbita, hieracium, | Trochisci de rha barbaro. |
| chondrilla | FRIGIDA COMPOSITA. |
| Oxyacantha | Diafantalon |
| Portulaca | Ceratum santalinum |
| Lactuca | Diarhodū abb. sine speciebus |
| Viola | Saccharū rosatū & violatum |
| Solanum | Trochisci de caphura. |

S P L E N I C A.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| CALIDA SIMPLICIA. | Rubia, Nasturtium |
| Thymus, Epithymus Græ- | Afarum, Calaminthe |
| corum & Arabum. | Acorus |
| Genistæ flos | Agnus |
| Cortex radice eiusdem & | Hammoniacum |
| capparis | Bdellium |
| Cortex medius fraxini, & | Castorium, & ferè quæ he- |
| Sambuci | har respiciunt. |
| Scordium, | FRIGIDA SIMPLICIA. |
| Chamædrys | Cortex radice Tamaricis, & |
| Chamæpitys | folia & fructus |
| Buglossum vtrunque | Asplenum, id est, ceterach |

Adiantum omne
Intyba & Serides
Semina quatuor frigida, magna & parua.
Lacryma vitis & folia.

CALIDA COMPOSITA.

Diacalaminthe
Diacyminum
Acetum scillites
Dia hammoniacu emplastrum.

FRIGIDA COMPOSITA.

Diafantalon
Ceratum fantalinum
Acetum, præsertim album, atque adeò destillatum, sed id calidius est.
Oleū balaninū, id est, debent, & de hammoniaco, & similibus: ad scirrhus lienis, vt ipsa balanus myrepfica, apta. calidis addipoteft.

NEPHRITICA, CYSTICA.

CALIDA SIMPLICIA.

Abrotanum
Eryngium
Eruca
Vrtica
Sarxiphagum
Lithospermum
Iuniperi baccæ
Radix Apii, Ruscî
Asparagi, Fœniculi
Dauci, & horum semina
Cubebæ, & propè quæ hepatici & lieni calida conducūt, & vretica.

FRIGIDA SIMPLICIA.

Plantago vtraque
Nymphæa vtraque
Hordeum
Semen psyllii

Lactucæ, Portulacæ
Intyborum & Seridum
Papaueris albi,
Frigida semina magna, id est, Peponum, & Melopeponū, Cucumeris, Cucurbitæ, Citreoli quem vocant.

CALIDA COMPOSITA.

Zingiber conditum
Oleum scorpionum
Emplastrum de baccis lauri.
Syrup. de duabus & quinque radicibus.
Oxymeli scillites.

FRIGIDA COMPOSITA.

Ceratum fantalinum
Syrup. nymphææ, violarum, & cætera propè quæ hepar & lienem refrigerant.

HYSTERICA.

CALIDA SIMPLICIA.

Arthemisia
Sabina
Calaminthe
Origanum

Pulegium
Parthenium
Melissophyllum
Aristolochia vtraque
Gentiana

Valeriana
 Rubia
 Ruta
 Cinnamomum
 Calamus Aromaticus
 Schœnu anthos
 Spica
 Myrrha
 Opopanax
 Moschus
 Ambra, & cætera propè re-
 nes calfacientia, & menses
 mouentia.
 FRIGIDA SIMPLICIA.
 Coralliuni vtrunque
 Nymphæa vtraque
 Balauftium
 Galla
 Polygonium vtrunque

Semperuium vtrunque
 Portulaca, & propè alia, quæ
 renes refrigerant, & men-
 ses supprimunt.

CALIDA COMPOSITA.

Diacalaminthe
 Dianifum
 Diambraë
 Diafatyrium
 Tryphera magna fine opio.
 Oleum amygdalinum vtrun-
 que, nardinum
 Aromaticum moschatum
 Oleum rutæ, croci, philoso-
 phorum.

FRIGIDA COMPOSITA.

Diafantalon
 Ceratum santalinum.

A R T H R I T I C A.

CALIDA SIMPLICIA.

Nasturtium, Sinapi
 Chamædrys
 Chamæpitys
 Hermodactylus
 Herba paralyfis phlomidum
 species
 Scilla
 Rhaphanus
 Enula Campana
 Origanum
 Pulegium
 Calaminthe
 Porrum, Afarum
 Ruta, Acorus
 Terebinthina
 Myrrha
 Opopanax

Bdellium, Hammoniacum
 Sagapenum
 Styrax, Galbanum
 Euphorbium
 Castorium
 Cassia nigra
 Stercus vacciniū
 Panis calidus
 Sapa
 Oesypus

} admota,
 } enim sunt,
 } anodyna.

FRIGIDA SIMPLICIA.

Acetum
 Aqua rosarum
 Myrti partes
 Pfyllum
 Bolus Armenia
 Intyba & Serides
 Lactuca

Semp

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Semperuiuum vtrunq; | ceraforum. |
| Solanum | Oleum Philosophorum |
| Opium | Oxycroceum |
| Hordei cremor | Ceroneum |
| Folia hyoscyami parum cal- | Diachylon |
| facta. | Diameliloton |
| Folia cicutæ paruæ torrefa- | Oxymeli scillites, & cætera |
| cta. | quæ cerebrum & nervosas |
| CALIDA COMPOSITA. | partes calfaciunt. |
| Oleum auellanarum & semi- | FRIGIDA COMPOSITA. |
| nis aranciorum | Oleum rosatum & de ra- |
| Oleum vulpinum | nis. |
| Oleum balaninum. i. de ben | Vnguentum populeum |
| Oleum ex lapide gagate, & | Syrup. limonum, & cætera re- |
| styrace, & euphorbio. | nes refrigerantia. |
| Oleum laurinū, & ex nucleis | Oxycratum, id est, posca, |

Quoniam purgatrix facultas inter quartas quoque conti-
netur, vt dictum est, pauca de purgationis ratione, & singulos
humores purgantibus medicamentis etiam hîc adscriben-
da sunt.

Purgatio est humorum sua qualitate molestorum vacua-
tio: siue enim hi calidiores, frigidiores, humidiores, sicciore,
aut per coniugationem harū qualitatum à sibi mediocri tem-
peramento recesserint idoneo ad sanguinis probi constitu-
tionem, siue aucti immodicè iustam sibi proportionem san-
guini inculpato componendo necessariam supergressi sint,
semper qualitate ipsa molesti videntur, ergo vacuandi: sed
priùs ad expulsionem apparati. Corpora enim cum quispiam
purgare volet, oportet fluida facere, hoc est, humores crassos
tenuare, lentos incidere, & tergere, & fluxiles reddere, ac
meatus aperire, per quos facienda est vacuatio. Tunc autem
concocta medicari, atque mouere oportet non cruda: quan-
quàm verò hæc propriè coctionem à natura in morbis salu-
bribus factam loquantur: abusuè tamen humorum expellen-
dorum apparationem prædictam Medici etiam coctionem
appellant, fortè quòd crassum dum est tenuatum, habile ma-
gis est, vt à natura coquente vertatur in alimentum, si quid in
eo relictum erat benignū, reliquum ad expulsionē promptio-
rem

Gal. Aph. 2.
lib. 1.

Aph. 9. lib. 2.

Gal. ibidem
Aph. 22. lib. 1.

rem secernatur. similiter dū lentū est incisum, & detersum, & fluxile. Eadem ratione practici addunt bilem flauam esse coquendam, vt quauis ad vacuandum sit maximè habilis ob caliditatem, tenuitatem, leuitatem: tamen ne eius vis tam furiosa partibus noceat continentibus, aut in quas trahitur, aut per quas excernitur refrigerantibus obtundenda eis videtur: quòd etiam hoc modo si quid in ea benignum supersit, à natura separetur felicius, ac coquatur, ac minùs putrendo, *Aph. 59. lib. 5.* quod prauum est mitescat: suam fortè sententiam ex his Galeni atque Hippoc. locis tuentes.

Tertiana exquisita quæ lógissima est, septenis circuitibus finitur, & ardentes die septimo per crises finiri solent, cocta natura materia biliosa, & expulsa.

Chamæmelum sanat febres biliosas, & ex cutis densitate *Li. 3. simp. c. 9.* natas, easque percoctas.

Signa coctionis prauorum humorū in pleuritide per sputum, in affectibus ventris inferioris per deiectiones, in febribus putridis & affectibus venosi generis per vrinas colligit Hipp. Galenus, in Aph. progno. crisis, libris therapeuticis.

Humorem crassum & lentum & flatulentum, & faniem acrem & mordacem in oculum affluentem, & fluxionem à capite in pulmones, & lassitudinem tēsuam, & phlegmonòde, in libris de compositione pharmac. particular. coquit Galenus. Crocus & Myrrha ibidem coquere dicuntur humores prauos & præter naturā in pulmone & stomacho. Ergo morbi omnes, & materiæ omnes prauæ coqui à Medicis interdū dicuntur abusiue. nam propriè à calore moderato in benignū rei coquentis alimentum versio est coctio: quæ etiam in morbis sanguineis fieri videtur, dū pus ex sanguine in phlegmone fit à calore etiā natiuo, & hypostasis in vrinis per febres: sed ea est imperfecta, cum à solo calore natiuo non fiat, verum etiam ab eo qui præter naturam est, putrefactio addatur.

Quid quòd bilis flaua seipsa interdum multò crassior efficitur, dum vitellina, æruginosa, isatòdes euadit? An non tunc apparāda expulsionī est? Aut cur Galenus extenuandis & tergendis humoribus biliosis anchusam onocleam subamaram sufficere affirmat? Asserrem Actuarium bilem coquere zulaipiis quibusdam in purgantibus bilem, nisi facem Arabicam resipere ipsum vellem mox audire.

*Lib. 6. simp.
in anchusa.*

Medica

Medicamenta igitur purgantia humorem sibi familiarem tota sua substantia trahunt sumpta, & quod magis mireris, admota horum quædam. Bilem enim flavam vacuant.

CHOLAGOGA.

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aloë | eidem. |
| Abfinthium | Addunt cum Arabibus recen- |
| Scammonium | tiores, |
| Fumaria Dioscorid. | Mannam, seu Mel aërium |
| Thlaspis semen | Tamar Indos |
| Sesamoides vtrunque | Myrobalanos, præsertim fla- |
| Cucumer agrestis | uas |
| Pepli & Peplidos semen | Cassiam fistulam |
| Sambuci & Ebuli folia, & se- | Rha barbarum |
| mina | Rosas, præcipue dictas vulgò |
| Colocynthis fructus siccus | incarnatas |
| Empetrum & Polypodium | Violas nigras seu purpureas. |

BILEM ATRAM.

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Epithymum | Addunt iidem, |
| Pulegium | Lapidem Armenium lotum |
| Tragoriganum | Alex. Trall. |
| Parthenium | Lapidem stellatum seu Cya- |
| Armenius lapis | neum, vulgò lapidem laxuli |
| Centaureum minus | Sennam |
| Elleborus niger, sed hic deie- | Efulam. |
| ctione, vt albus vomitu. | |

Cap. 5.
Lib. 2. simp.

PHLEGMAGOGA. PITUITAM.

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Cnici semen | Ricinus |
| Coccum gnidium | Scammonium, |
| Hypophaes, Galenus libro 1. | Chamaelæa |
| fac. nat. | Thimelæa, |
| Lathyrus & Tithymallus o- | Sambucus |
| mnis | Ebulus, |
| Cucumeris sylvestris radices | Colocynthis |
| cortex | Elleborus vterque |
| Syrax pinguis & flavus | Polypodium Dioscorid. |
| Daphnoides, | Addunt cum Arabibus re- |
| | cen |

| | |
|---------------|-------------|
| centiores, | Sagapenum |
| Turbith | Opopanax |
| Hernodactylos | Euphorbium. |
| Sarcocollam | |

HYDRAGOGA. AQVAS DVCENTIA.

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Granum gnidium, etiã phlegmagogum Galeno | Ricinus, Lactuca sylvestris | <i>Lib. the. ad Pison.</i> |
| Aesvstum, & lotum, æris flos, æris squama, | Tripolij, & Hemerocallis radix | |
| Chamædrys, Chamæleon, | Sambucus, | |
| Galen. lib. 1. facul. natur. | Ebulus | |
| | Tithymallorum genera. | |

PITVITAM ET AQVAS.

| | |
|-------------|------------------------|
| Squama æris | Chamælæa, etiam bilem. |
| Euphorbium | |

Ex his pater, quædam etiam plures humores trahere, vel ob actionis vehementiam, vel ob diuersas in toto ipso substantias diuersas, Nam trahunt

FLAVAM ET ATRAM BILEM

Veratrum nigrũ, quod etiam phlegmagogũ quibusdam est. Fumaria.

BILEM VTRANQVE ET PITVITAM.

| | |
|---------|-------------|
| Peplium | Polypodium. |
|---------|-------------|

BILEM ET PITVITAM,

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Colocynthis | Ætus ficcus |
| Elleborus albus | Thymus |
| Tithymallus | Ciclamini radix |
| Elaterium | Chamæpitys |
| Agaricus | Empetron eadem, & præter |
| Aristolochig, Clematidis fru- | hæc aquas Diosc. & Galen. |

Sanguinem purgari tradunt porrorum capitatorum succo mercuriali, viola alba, sylvestri malua, saluia, veratro albo, quod & bilem vacuat: non quod illa sanguinem foras trahant, sed quod vel ipsum ab humoribus corruptis expurgant (qua ratione omnia propè purgantia medicamenta dici queunt sanguinem purgare) vel quod actionis vehementia ipsum trahunt

trahunt in hypercatharsi: vel quòd ipsum tenuatū calfactum ad venarum exitus promoueat: qualia quæ sumpta hæmorrhoidas promouent, menses cient, vrinas cruentas excitant: hæmagogum inde dictum medicamentum, vt cicer, præsertim agreste, & alia multa Galeno in simplicibus.

Quæ enim herba corpori admota per poros sanguine e ducto homines necabat, cognosci desit magno mortalium còmodo.

*Lib. 1. fac. nat.
& lib. theria-
ces ad Pison. et
li. de nat. hu.*

Recipimus ergo medicamenta facultate quadam natia conuenientem sibi succum trahere, quomodo partes tam animalium quàm plantarum singulæ alimentum tota substantia sibi familiare, & amicum, & conueniens trahunt: & magnes ferrum, & electrum, id est, succinum, paleam, & alia huiusmodi à natia quadam facultate conuenientis attractrice.

*Gal. in theria-
ca ad Pisonē.*

Admiratiōe eadem dignum est, feras venenosas cū corporibus suis nostro sint inimicæ, & tam subitò nos perimant, morfibus à se factis succurrere & solas hominem à tali periculo vindicare: quòd scilicet simile retrahat ad se sibi simile, suamque substantiam in se reuocet. Quapropter à crocodilo læsis, ipsius adeps vulneri impositus summo est præsidio.

Morsus muris aranei etiam lethalis sanatio, citra dolorem fit mure ipso trito & imposito. Morsus viperæ ipsa vipera trita & imposita sanat: & theriaca ipsa imposita, atque etiam sumpta, aliarum etiam ferarum omnium venenatorum morfibus efficax.

Huc pertinet nonnullorum natia quædam totius substantiæ societas, ex qua si iungantur, & iuncta seruentur, vis quædam mira consurgit: id quod maiorū experientia longa probatum pro experto & certo recipimus. Ob id còposita medicamenta vsurpamus, quæ à prioribus Medicis iisque insignibus vehementer còmunēdata fuerunt: neque negligimus, quæ recentiores experientia longa comprobarunt.

Lib. 5. c. ph. p.

Quid quòd alexipharmaca quædam sic venena trahunt sumpta, si sumantur, aut admoueantur ictui vel morsui venenoso, vt venenum ipsis insidens videas.

Nec solū venena trahunt, sed plurima etiam aculeos & spicula indolenter è corporibus nostris extrahunt, quæ nulla vi nostra educere antè licebat.

Vt autem rebus quibusdam magna inter se est cognatio
natura

naturarumque similitudo (quod præter dicta generationes quoque animalium, & insitiones plantarum ostendunt, ut Hippocrates docet lib. de natura hominis) ob quam hoc illud trahit, hoc illud non lædit: ut euphorbium ventrem ouium solum non erodit, ut in eo feruari possit, qualiter in folliculo suo bilis: ita aliis odium est manifestum non modo animalibus inter se, sed etiam plantis inter se, & plantis & animalibus in homines, & in certas quasdam hominum partes, aut partium affectus.

Brassica & hederæ viti & ebrietati aduersantur.

Allium magneti affricum, & oleum succino, attractionem horum peruertunt, & ille ferrum abigit, hoc paleas etiam oleo imbutas.

Cantharides vesicam peculiariter & solam afficiunt.

Lepus marinus pulmones solos ex omnibus animalis partibus vlcera.

Cicuta homines occidit, sturnos nutrit, nec vim lethalem in his exercet.

Veratrum homines corrumpit, coturnicum cibus est.

Amphisbænam animal biceps si grauida fuerit supergressa male abortit.

Stellio scorpiones viscosos substringit, & ita perimit.

Basiliscus belua subflaua triplici frontis apice munita, viscus etiam solum, aut sibilo auditus, homines necat: ipsam autem beluam mortuam si quod animal attigerit, subito moritur. Ob id omne aliorum animalium genus propinquitatem ipsius deuitat.

Vsta murium capita, & ex melle illita alopeciam curare possunt. Capita apum & muscarum vsta alii similiter adhibent eodem successu. Stercus muri cum aceto illitum idem potest.

Viperæ pellis in puluerem redacta, imposita alopeciis, pilos mirifice regenerat.

Caput leporis vstum cum adipe vrsino illitum.

Hederæ, brassica, raphanus naturali facultate ebrietati resistunt, & vitibus, ut dixi, sunt inimica, ut si circum se serantur, diffugiant.

Palmulæ proprietate quadam capitis dolorem faciunt.

Pæoniæ præsertim maris radix recens collo appensa, contactu carnis calfacta, olfacta, continuo epilepsiam sanat: huius

Lib. 9. c. ph. p.

Lib. the. ad Pi-
sonem. et initio c.
ph. g.

Lib. the. ad Pi-
sonem.

ibidem.

ibidem.

Lib. II. simpl.

Lib. I. c. ph. p.

& Plin.

ibidem.

Lib. 6. simpl.

tamen rationem reddit Gal. *ibidem*.

Lib. th. ad Pis. Cameli aut mustellæ cerebrum siccum ex aceto potum epilepticis medetur.

Ibidem. Castoris testiculi poti, conuulsioni remedio sunt.

Lib. th. ad Pis. Hirundinis cerebrum ex melle illitum ad suffusiones facit.

Ibidem. Fel hyænæ illitum suffusionem discutit, visum acuit.

Ibidem. Aspidis exuium tritum & illitum ex melle visum facit acutissimum.

Ibidem. Accipiter in vngueto fusino coctus hebeti visui medetur.

Ibidem. Cantharus, id est, scarabeus oleo incoctus, auri instillatus eius dolores sanat.

Lib. 10. simpl. Stercus canum solis ossibus biduo pastorum, ob id durum, album, neque grauitur olens, optimum est in crustis oris, & anginis: strenue enim iuuat, nec ullam habet insuauitatem. Eoque siccato, læuigato per cribrum medicinale creto, Musa Medicus plurimum usus est, cuius testimonium maximi facit Galenus: additque hoc medicamento se nullum nouisse valentius, neque in anginis, neque in paristhmiorum phlegmone, aut tonsillarum magna adeo, ut suffocationis sit periculum. Item in dysenterijs, & summe inueteratis vlceribus & summe malignis. Idem digerit & desiccatur alios affectus. Quod experientia longa & ipse, & eo priores Medici probauerunt ad anginam quidem mistum alijs huic affectui conuenientibus: ad dysenterias vero cum lacte probe cocto postea per calculos ignitos vel ferrum candens vstulato.

Lib. 10. simpl. Stercus pueri triduo nutriti lupinis dulcibus, aut gallinis, perdicibus ex aqua, aut tenui iure probe coctis, pane bene cocto cum sale paucis, & fermento, & vino vetere tanto, quantum perfecte possit coquere, ipso die tertio primum acceptum, ficcatum, læuigatum cum melle attico illitum (insufflatum Gatinaria) statim sanat gutturis phlegmonas sine venæ sectione: cuius experientiam certissimam sæpe vidit Gal.

Alexander Aph. initio probl. Hæmodiam, id est, dentium stuporem ab acidis & acerbis & austeris natum, ut lib. de optima secta, portulaca esu sanat, causa eius effecti nobis incognita: huius tamen causam reddit Gal. lib. 6. simpl. & Arist. prob. 38. sect. primæ.

Lib. th. ad Pis. Ceruinum cornu, aut bouis astragalus vsta, cum vino trita, denti vacillanti circumlita eum confirmant.

Ibidem. Veruecis cerebrum ex melle illitum, infantium dentitioni vtiliss

utilissimum. Idem præstat mel & butyrum, gingivas tamen tenuando, Gal. lib. 10. simpl. Item & cerebrum leporis cum capite toto elixum, lib. 11. simpl.

Cottionem ventriculi iuuare, & stomachicum esse ventrem mergi, vel elixum, vel ficutum & sumptum, & tunicam interiorem ventriculi gallinarum siccata & potam, falsum est expertus Galenus: tamen in ea promissione vana etiam hodie perseverant, qui principes Medici habentur. *Lib. 11. simpl.*

Iaspis virens os ventriculi adhæsu re vera iuuat proprietate quadam. *Lib. 2. simpl.*

Astragalus bouis vltus cum lacte potus lumbricos rotundos educit. *Lib. 11. ad Pis.*

Vaccini lactis potus dysentericos iuuat.

Ibidem.

Hepar lupi hepaticos tota substantia iuuare sufficienter se expertum dicit Gal. lib. 8. comp. ph. part. & hodie hepatis eius ficcati puluerem cum vino albo dant hydropicis, tanquam secretum aliquod remedium. Id tamen hepar lupi mistum medicamento hepatico (quod ex eupatorio fit) minimo id efficacius reddidit. Dabat autem Galenus læuigati hepatis lupini drachmam vnam cum vino dulci, vt thereo Cretico, vel mulso protropo, id est, quod desluit antequam vuæ calcantur. Nam id gratum hepati, quia ipsum nutrire potest, ac medium est inter calidum & frigidum. Si verò febris adsit, datur cum aqua calida, aut succo fereos, vel simili. *Lib. 11. simpl.*

Caro trium *νοχλίον*, id est, cochlearum, multum tusa cum vini nigri cyathis tribus calfacta, pota, hydropicos tota substantia non vna aut altera qualitate iuuat. *Lib. 8. c. ph. p.*

Affecto iecori eupatorios herba strenuè auxiliatur: id autem quia alstringendo hepar roborat, & tenuitate essentiali, ac incidendo & tergendo citra calorem manifestum obstructions eius liberat. Pistacia hepatis obstructions conferunt. *Lib. 11. ad Pis.*

Vua passa tota substantia est familiaris hepatis, omnia cum nutriendo corpore habent propria, & quantam secundum totam ipsorum substantiam. *Lib. 2. alim.*

Stercus bubulum aridum vltum tribus cochlearibus potum hydropicos iuuat. *Lib. 2. c. ph. p.*

Lumbrici terræ, quæ *γῆς ἐντρεῖα*, id est, intestina vocant Gal. ex melicrato poti iſterum purgatiore exuberant. *Ibidem.*

C O L I C A.

Lib. 10. simpl. Stercus lupi ofsibus pasci, ob id albidius, supra frutices, vepres, herbas altiores prima æstate repertum non in terra: potum cum pauco sale aut pipere, aut alio simili, ex vino albo tenui, vel aqua, & (quod mireris) ad λαιῶνας, id est, ilia appensum dolores colicos citra phlegmonem persanat, aut saltem plurimum mulcet, & his ita præcauet, vt non redeant: vel si redeant, tardius & mitiores multò redeunt, etiam si ipsum stercus teratur cum ofsibus deuorati animalis non præmansis nec concoctis. Appendendum verò vinculo & cingulo ex lana ovis à lupo mactatæ, vel ex pelle ceruina, vel quauis alia materia. Umbilico infantis inter telas confuto & appenso ventri idem hodie tribuitur, & certissimum affirmari audio.

Gal. in ther. ad Pifo. & lib. 11. simpl. κορυδαλὸς vel κόρυδος ὀπίσθῃ, id est, galerita assata vel elixa, si assidue edatur cum iure, colicos sæpe plurimum iuuare expertus est Gal. Hæc auis pusilla, in capite gerit ceu galeum ex pilis erectis natum, nobis ob iter plerunque obuia. Marcellus Empiricus hupupam accipit, quod apicem in capite gerat, pauonum modo, vt Dioscorides ait in corydalo, cui κορυδαλὸς opinor mendosè pro κορυδαλὸς iuuare scribitur: sed hupupa ὄνκιστον ὀρνιθῶν μικρόν, id est, auicula parua, quantum Dioscor. & Galenus corydalon affirmant. Vires easdem ad colicos dolores & nephriticos tribuunt periti, & probatissimas pulueri auiculæ nobis frequentis (quam vulgus mensesquam vocat.)

Lib. 10. simpl. Stercus gallinæ cum œnomelite vel aceto, vel vino aqua diluto colicum dolorem diuturnum sanat.

S P L E N I C A.

Lib. th. ad Pif. Ibidem. Astragalus bouis vltus ex oxymelite potus lienē absumit. Myrobalanus ipsa splenem iuuat.

Asplenium, capparis, tamarix tota substantia familiares lienis plantæ ipsum iuuant, & liquant, & absumunt tumentem: quin vsu multo asplenium ipsum consumit omnino.

N E P H R I T I C A.

Ibidem. Sarxiphagon & betonica renes iuuant, vt alia aliarū partium propria medicamenta.

C Y S T I C A.

Ibidem. Scorpius assus cum pane comestus, vesicæ calculos cōterit: & lumbrici terræ ex vino sumpti, & murium stercus potum.

Vesica

Vesica caprina aut ouilla cremata, ex posca pota : aut leporis testiculus ex vino odore coctus, potus his qui vrinam inuiri reddunt, benefacit. *Ibidem.*
Lib. 9. c. ph. p. in fine.

V E N E R E A.

Renes scincorum poti, pudenda intendere creduntur. *Lib. th. ad Pis.*
Bouis astralag^o vstus, trit^o, potus mediocriter venereus est. *Lib. II. simpl.*

A R T H R I T I C A.

Caput milui sine plumis vstum cum aqua, quantum tribus digitis capi potest, podagricis auxiliatur. *Lib. th. ad Pis.*

Lumbrici terræ cum rosaceo cerato illiti podagricorum inflammationibus conueniunt.

Erinacei terrestris caro siccata, pota elephanticis, cachectis, conuulsioni obnoxiiis, nephriticis, anasarcicis auxiliatur, quia valenter digerit, & siccatur. *Lib. II. simpl.*

Mustelæ caro siccata, pota, epilepticos iuuat eadē ratione. *Ibidem.*

Elurorum salitorum caro trita palos & spicula extrahit, tanquam trahendi vim habeat.

Myacum, id est mutulorum caro morsibus canū medetur.

Cochlearum caro pertrita valenter siccatur etiam hydropicos : & muccus ex ipsis haud ita pridem captis stylo confixis emanans cum thure vel myrrha, vel aloë, vel quibusdam horum, vel omnibus ad cerati crassitiem coactus aures purulentas desiccatur : & fronti affixus, oculorum fluxiones.

Cochleæ cum testis tusæ palos extrahunt, & menses sistunt. Caro ipsius sola vulnere etiam neruorum imposita sola pulchrè glutinat, & sine phlegmone in homine etiam duro & agresti addita farina volatili, & si vis, thure, myrrha, resina fricta : hæc initio libri vndecimi simplicium. Horum tamen causa quædam reddi potest, quòd scilicet digerant, siccant, trahant calore.

Lignum Gaiaci (quod vocant) scabiem Hispanam tota sua substantia sanare quibusdam videtur, cum tamen in eo sapor sit amarus & acer, non inualidus : vnde vim habet incidendi, tenuandi, tergendī, & purgandi, per quas facultates vacuat vrinis, sudore, vomitu, deiectione, insensili, transpiratu, putrem ex contagione materiam : sæpe tantum spirituosam, cum recens est contagio, nec vehemens, & spiritus affici contumaces : sæpe simul etiam humidam, cum in vasa ipsa &

corpus mali labes iam grassatur. Cui corruptelæ nisi occurratur per alterantia & vacuantia, etiam in partes solidas impetus fit, easq; putredo occupat, ferro sæpe & cauterio tantum curabilis: quomodo ex diariis in affici promptis transitus fit in putridas, ac interdum in hecticas febres, nunquam si absolutæ sint, curabiles. Neque victus tenuis & tenuans, catapotia Aegidiana, aut illitus ex argento viuo, suffitus ex cinabari factitia, vel hærbarum digerentium & tenuantium decocto (quæ sunt alia hodie consuetissima mali huius remedia) ratione alia quàm corruptæ huius materiæ totius vacuatione, luem istam persanant.

Li. the. ad Pis. Taurini cornu rasura cum aqua pota sanguinis eruptio-

ibidem. nem cohibet.

ibidem. *μυγοί*, id est, femora vsta idem præstant, & aluum solutam

ibidem. sæpe sistunt.

Lib. ii. simpl. Hippopotami cutis vsta, læuigata, ex aqua corpori admotapanos digerit.

Adeps asneris & cerui medulla ex rosaceo phlegmonæ medetur, & dolorem mitigat.

Cinis cancri fluuiatilis substantiæ proprietate mirabilis in morsu canis rabidi: & alysson herba antè dicta, *lib. 6. simplicium.*

Ex his patet à partibus animalium quibusdam morbos quosdam curari: quin ipsa etiam tota eorum corpora affectibus quibusdam auxiliantur. Cancer enim fluuiatilis tritus illitusq; spicula & surculos extrahit, quod etiam carni filuri piscis saliti tribuit Diosc. & capiti saurarum trito Gal. *lib. ii. simpl.* & aliis præterea multis hanc trahendi facultatem vterque certam adscribit. Sunt enim medicamenta partibus quibusdam amica, alia iisdem inimica, alia his atque illis affectibus idonea, vt abundè docuimus. Ne mireris igitur, partes viperæ medias theriacæ impositas, vim illi efficacem tribuere ad resistendum moribus viperæ, & elephantæ, & aliis permultis affectibus. Adde quod quædam simplicia medicamenta ex tota ipsorum substantia vnâ quandam & simplicem habent virtutē, cuiusmodi ferè sunt prædicta. Alia mixtam in tota sua substantia facultatem habent, & duplici actione funguntur, tam manifestè sæpe, vt etiam quàm maximè contraria ab eis in corpore fieri videamus: atque

Lib. i. c. ph. g.
Li. the. ad Pis.

atque id miraculum esse videntibus apparet, & inopinabile quibusdam audientibus ac impossibile putatur, nisi viderint.

Lapathi enim folia ventrē cient, semen assumptū stringit. *Ibidem.*

Brassicæ, lentium, ostreorum, ostracodermorū omnium, *Ibidē. & lib. 1. aliment.*
& gallorum vetulorū ius & decoctum sumptum, aluum soluit: ipsum autem singulorū corpus sumptū ventrē cōprimit. *Lib. 11. simpl.*

Gallarum ius simplex aluum sistit: gallorum ius cum sale prolixissimē coctorum subducit. *Lib. the. ad Pison.*

Aloë & squama æris supercrescentes vlcērū carnes astringunt, & humores sub his notos subinde siccant: assumpta autem per os corpus totum purgant: quia nihil est, quod sumptum & admotum vires habeat easdem. *Lib. 3. temperament.*

Serū lactis potū aluū soluit, caseus sumptus ipsam cohibet.

Proximum autem miraculo est trifolium herba hyacintho similis, quando vere flores emittit, & semen habet *κνίω ἀγρίῳ* simile, hæc enim decocta multum, & morsibus phalangii aut viperæ ex aquæ fotu admota ipsis medetur, & dolores statim sedat. Eodem verò fotu in alio non morso parti sanæ sensum similem, & dolores similes his quos morsus inuehit, omnes excitat: morsus itaque sanat, & ferarum modo partem affligit.

Quis omnia hæc non modò cognoscenda Medico, sed etiam admiranda non iudicat? Neque solum animalibus ipsis inter se, & ipsorum partibus quibusdam & plantis & metallis quibusdam secum, aut cum aliis magna est naturæ societas aut contrarietas: sed quod etiam faxeus admiretur, sonis ipsis aut corporibus sonoris inter se tanta est cognatio, ut sibi similibus delectari videātur: fide enim testudinis quavis, quo voles modo attemperata, si correspondentem ei in testitudine altera ipse attemperas, intendendo & remittendo, cum sonum edet similem sono alterius tibi antea non audito, altera illa velut exultans concutitur, tanquam simili suæ attemperaturæ sono gaudens harmoniaq̃. Eam verò ipsius concussionem festuca tenuis illi antè imposita apertè declarabit. Multò maiora his miracula Deus optimus maximus etiam in hac rerum mūdanarum fæce excitauit, quorum fidem certissimam experientia quotidiana perficit, qua sola percipiuntur, quæ totius substantiæ similitudine aliquid per-

Lib. 6. simpl. in alyss. et alibi.

inuestigari potest, quanuis in quibusdam reddere conetur Galenus: vt in pæonia & alyssō vim siccandi & digerendi insignem tribuit, quibus ad curandam spumam opus est, sed sumptum alyssum etiam agit & sanat rubidum ipsum canem & hominem.

Hæc fusius tractare poteram, & collocupletare remediis propè infinitis tota substantia operantibus, quæ partim ab aliis scribuntur veteribus, partim à neotericis & practicis, partim hodie in vsu sunt frequentissimo rusticorum, nisi libri magnitudinem immodicam fuisset veritus. Adde quòd non statueram librum substituere de his quæ proprietate substantiæ totius quid agunt, quem Galenus aliquoties est pollicitus: an verò eum præstiterit, ignoratur: nondum tamen inter eius opera comparet. Id aliquando aut mihi aut alteri latius fundere licebit & elegantius maximo mortalium emolumēto. Nam illa & celerius & multò certius quod possunt præstant, quàm quæ qualitatibus manifestis agunt, neque tanta egent aliorum simplicium mistione, per quæ melius agant, aut sine quibus non agant, aut per quæ conseruentur. Licet eorum quædam aliqua ex his postulent, vt cancrorum fluuiialium cinis morsum canis rabidi cum thure & gentiana præstantius multò curat, quàm per se & solus: ne putes cum quibusdam ea si miscntur, vim suam perdere.

Medicamenta hæc, quæ secundum aliquam totius substantiæ proprietatem agunt aliquid, siue sumpta, siue admoda, siue etiam appensa, experientia sola sunt inuenta, & eadem probanda, an id præstent, quod ipsis tribuitur.

Horum tamen non paucorum ratio quædam reddi possit, vt quòd omnia facultate incidenti prædita olfactu vel potu iuuant epilepticos: qua ratione pæonia his salubris, quæ tota substantia id facere aliis dicitur: item portulacæ hæmodiam ab acidis, acerbis, austeris natam curantis, causa incognita

Aphrodiseo initio problematum, declaratur Aristoteli, sect. 1. probl. 38. & Galeno, lib. 6. simpl. & lib. de

opt. secta. His probatis fides est habenda:

non autē incantationibus verbosis, nec

vocibus barbaris quas præstigi-

atores vsurpare con-

sueuerunt.

Lib. 1. simpl. in cancro fluui-
le.

Lib. 11. simpl.

Lib. 10. simpl.
in sang. vesper-
tilionis.

Lib. 1. simpl.

M E T H O D V S C O M P O N E N D I I N

Q U A T V O R C O N S I S T I T.

PArtem operis hoc libro secundo instituti tertiam aggrediamur, & doceamus in quibus cōponendi medicamenta ratio consistit. Ea verò vt reliquorum componendorum in tribus potissimum versatur, rerum scilicet miscendarum delectu, earundem quantitate, & forma compositi futura. Quæ tria etiam in quouis medicamēto tam composito quàm simplici sumendo, aut admouendo obseruanda sunt. Deligitur enim hoc vel illud medicamentum, verbi gratia, purgatorium, & datur hac vel illa quantitate, & forma vel cataportionum, vel potionis, vel alia, quæ ægro gravior, & fini proposito aptior fuerit.

Qualitas, quantitas, tēpus causæ salubriū, cap. 81. artis medica, & alibi passim.

Porro miscendæ res composito medicamento deligendæ sunt, quæ plurimæ quatuor. Hæ quæ affectum præter naturam, hoc est morbum, morbi causam, symptomata abigant: aliæ, sine quibus priores affectum abigere nequeant: aliæ tertio, per quas melius primæ affectum tollant: postremo etiam miscendæ, quæ dictas tres miscendorum differentias foueant, & diu integras seruent. Ad hæc quatuor referendi sunt scopi omnes componendorum medicamentorum, siue ipsa vnicum habent effectum, siue multiplex, vt theriaca, in qua multæ sunt particulares compositiones, singulæ affectibus quibusdam peculiariter efficaces. Quæ quatuor, omnibus insunt aliquid efficientibus: ob id in singulis corporis instrumentis, id est, partibus actionem aliquam edentibus, à Galeno inquiruntur in lib. de vsu partium, vt in oculo visionis instrumento, humor crystallinus est primaria visionis causa, cæteræ oculi particulæ sunt, aut sine quibus visio non fiat, aut per quas melius fiat, aut à quibus cæteræ conseruentur. Pretiosiora verò diuitibus, viliora pauperibus deligenda, vt pòst multis ex Galeno exemplis cognosces.

Veruntamen vt in nostri corporis instrumentis particulæ multæ vsum eundem sæpe præbēt generali, vt oculum vena, arteria, neruus, & quæ ipsum ambiunt ossa, conseruant alia tamen atque alia ratione: (Nam vena ipsum nutrit sanguine, quem defert, arteria etiam caloris in eo natui temperiem seruat: neruus motum dat voluntarium musculis, & tactus sensum, etiam oculi tunicis ad dignotionem

tristantium : ossa ipsa superciliarum, pomorum, zygomaticis, nasi à foris occurrentibus tuentur.) vt lib. de vsu partium docetur. Sic in medicamentis compositis multa sæpe simplicia idem, vt videri potest cuiusdam, pollentia miscentur : sed tamen quæ particulatim nonnihil differant viribus, vel saltem maioris & minoris ratione diuersa sunt. Adhæc vt idem polleant, hoc vni parti est familiare, illud alteri. Sed de his postea fusius. Contrà in nostris organis pars vna interdum subit vsuum duorum, vel trium, vel etiam quatuor simul ratione, vt linguæ tunica per se sapores discernit, sensus in ea gustatorius, aut potius animalis in ea spiritus est, sine quo non discerneret, nisi etiam ab ipso potissimum discerni contendas.

Eius tunicæ raritas est, per quam melius humores sapore præditi in ipsam tunicam recipiuntur. Eodem pertinet tunicæ huius puritas, vt nec bile, nec pituita multa crassa, nec alio humore præsertim saporem aliquem insignem (qualis est salus, amarus) sortito imbuta & tecta occursum & penetrationem rei gustandæ prohibeat. Sensus autem gustatus & tactus eadem tunica seruatur, quo vitat calidiora, frigidiora, & cætera noxia, excipit dulcia & sibi familiaria.

Eodem plerunque modo in medicamēto vno simplici hi quatuor scopi inueniuntur, vt in casia per se data : interdum in duobus, vt in rha barbaro cum terebinthina: nonnunquam in tribus, vt cum prædicto panis azymus additur: est quando in quatuor simul mistis, verbè gratia, in tetrapharmaco, vt singula vnicum habeant scopum.

*Gal. initio lib.
de antid.*

Cum igitur medicamenta composita fiant omnino præstantissima, tum ob simplicium quæ iniiciuntur probitatem, tum ob mistorum virtutis proportionem, magna vtriusque habenda est ratio: non neglecta interim forma compositi, quæ quantam vim habeat, postea dicemus. Vnumquodque autem est præstantissimum, quod proprium generis sui odorem & saporem habet valentissimum, vt de croco, casia, cinnamomo, styrace, & cæteris in theriace, & passim in aliis compositis obiter admonebimus. Proinde optima quæque à medicinalis materiæ peritis vno cōsensu commendata, sæpe & diu tibi spectanda sunt, vt noscas, & ab aliis deterioribus secernas, odore præsertim ac sapore: quauis & color in nonnullis rectè deligēdis non parū conseruat Dioscoridi & Gale-

no,

no, sed etiam & locus. Ob id postquam traditas ab utroque in singulis simplicibus notas obseruatis, maximum est inspicere, in qua regione vnumquodque ipsorum gignatur præstantissimum, in eamque tibi est proficiscendum, vbi optima sunt singula: vt Galenus in Cyprum vectus, cadmiam largam, diaphryges, spodium, pompholygem, chalcitin, misy, sory, chalcantum reperit: ex Syria verò Palestina, opobalsamum: ex Lemno, terram seu sphragidem Lemniam (cuius solius gratia in Lemnum nauigarat) tanta copia attulit, vt tota vita illi sufficerent. Quòd si ad regiones eas proficisci vel nauigare non detur, saltem per amicos fideles indidem accipe, vti Galeno ex omni natione, præstantissima quotannis afferebantur amicorum fidei cura & industria. Nam perdiri horum coemptores omnia vitiant, & variis modis contaminant.

Lib. 9. simp. et de antidot.

Lib. 2. c. ph. g.

Quæ autem in singulis regionibus præstantissima gignantur, Dioscorides libris 5. & alij celebres viri descripserunt: vt,

| | | | |
|---|----------------------------------|---|------------|
| Irim | } Illyricam. | Chamædrin | } Creticū. |
| Ami | | Chamæpitryn | |
| Phu | } Ponticum. | Hypericum | |
| Castorium | | Daucum | |
| Agaricum | | Gentianam | |
| Bitumen | } Iudaicum. | Anisum | |
| Opobalsamū | | Thymum | |
| Petroselinum | } Macedonicū. | Thlappi | |
| Meū Hispanū & | | Aristolochiā | |
| Cuminum, | Aethiopicum. | Veratrūnigrū | |
| Elenium | } Ex editis & sic- cis locis. | Glycyrrhizā, & succū ei⁹ | |
| Elleborum | | Sordium, & alia permulta, de quibus paulò post, & lib. 3. & 4. in theriace dicam. | |
| & ppè cætera calida, tenui- um partium | | | |
| | | | |
| Hyslopuna | Mótana hortēsi | Hyslopū Ciliciū, Diosc. | |
| Calaminthe | et cāpes. melior. | Creticum Archigenes, | |
| Amomum | Scythiū, ibidem. | lib. 8. comp. ph. part. | |

Sic medicamentum purgans bonum decernit Mesues tota sua substantia per lōgam experientiam cognita: quæ etiam mala quædam iudicauit, aut toto genere, qualia sunt daphnoides, lathyris, euphorbium, sagapenum, & alia violentiora: aut specie

specie accidentalī, vt turbith nigrum, agaricum nigrum, colocynthidem vnicam in planta, scammoniū de regione Scenitarum. Bonum quoque deligit sapore nobis iucundo & odore familiari, & colore non ingrato. Contrarium reiicit, ceu naturæ nostræ aduersum, aut parum propitium, vel mistis aliis corrigit. Item in propriē purgatoriis attrahendo scilicet ea præfert, quæ rariora, leuiora, & igni propiora: vt agaricum, scammonium, colocynthidem, aloē, turbith, polypodium, præter pauca quædam, vt cassiam fistulosam, cnicum, ricinum, irim, hermodactylos, lapidem cyaneum & Armenium, quorum bonitas præcipua in grauitate spectatur, eorum plenitudinem aut naturalem substantiæ compactiōem declarante. Quæ dos rha barbaro, absinthio, myrobalanis comprimendo etiam purgantibus adest. Nec parum illi ad delectum conducunt tempus collectiōis & custodiæ, ac locus natalis, & conseruationis.

Dulcia, insipida, styptica, vomitoria, rara, virtutem naſta aut superficiariam, aut imbecillam, vt violas, rosas, fumariam, adiantum, lupinos, recentia præfert veteratis. Contrā autem acria, densa, virtutē validam aut penitiorem sortita, quod vetustiora eō valentiora putat, modò ætate longa non sint examinata. Dulcia verò & falsa ætatis mediæ commendat.

Sic cælum pluuium plantis calidis siccis vires minuit, frigidis humidis auget: calidū verò siccum contrā. Quapropter & Galenus in antidotis plātas Creticas plurimas ceteris præfert, vt paulò antè dixi: quibus tamen, inquit, non cedant Italiæ, præsertim ex locis æditis, & dum cæli constitutio humida non fuit. Ob hæc plantæ humidiores in locis humidioribus humidissimæ euadunt: in siccioribus temperatiores, vti & animalia. Quod Hippocrates dicebat, naturarum hæc quidem ad æstatem, hæc verò ad hyemem bene malève se habent. Sub cælo regionem & statum ventorum comprehendimus. Neque omittenda est alimenti cuiusque proprietates, quam plerunque vitiat soli natura, aut cæli, aut aliarum rerum, vt fimi, stercoreis, plantarum odio dissidentium: vt contrā quædam perficiunt: sic raphanus aut scilla hermodactylum meliorem facit, & hyssopus epithymum, & quercus polypodium: contrā, lathyrus scammonium vitiat, & brassica vitem.

Purgan

Purgantia cum his reponantur & vsurpentur, quæ vim eorum meliorem & tutiorem efficiunt, non augent verò acrimoniam. Ne iunge igitur scammonio lathyrin, vel tithymalli genus aliquod, sed mastichin & spicam, quæ omnia acria medicamenta corrigunt. Purgantia ex herbis ante triennium ferè languent, præter vtrunque elleborum. Virtus igitur simplicium à regione proficiscens non est negligenda: quanuis calidæ tenues ex Creta plantæ si sint, Italicæ aut similes sunt, aut non multò Creticis inferiores, si ver totum ætatis modo siccum fuerit, nec plantæ ipsæ multo imbre irroratæ.

Medicamenta item deligantur omnia in suo vigore, & eadem bene habita: fugienda autem ceu ignobilia quæ in suo genere sunt tenuiora & graciliora, aut enormiter procera: quòd illa viribus, alimenti penuria careant: hæc verò vires alimēti copia obrutas habeant. In quolibet enim genere præstant, quæ nec rugosa, nec exilia, neque modum excedentia, sed quæ bene nutritam & constriktam habent substantiam. Ob id nec crocum, nec scillas, nec viperas vel emaciatas vel immodicè magnas ad theriacen Galenus expetit, sed mediocres. Eadem verò proprium generis sui odorem habebunt valentissimum, & in gustus qualitate proprietas cuiq; generi sua, si præpolleat, optimum declarat medicamentum, præsertim ex plantis sumptum, nec his omnibus, cùm quædam sint, quas citra periculum gustare non liceat. Viperae verò & alia quædam medicamentorum genera notis aliis suo loco partim dictis, partim dicendis præstantissima deligentur.

Sic primæ notæ virtutis propriæ mellis ex sapore dulci & acri sumuntur, quem vtrunque si habet valentissimum, quatenus melli datum est, optimum est mel, modò adsint aliæ quoque notæ ab odore, colore, consistentia, & partium coalitu: vt videlicet sit etiam pallidum, aut subflauum, odore iucundo in thymum inclinante, non improbè thymum referente, quia id thymo minutim inciso adulteratum est: substantia item neque crassum sit & grumosum, neque nimis liquidum, sitq; vnitum per totum & glutinosum, vt si digito attollatur, visci modo longissimè continuitatem seruet, nec abruptum à se diuellatur. Hæc enim mellis optimi ex peculiari eius natura sunt perpetua accidentia. Sic cætera compositio

Lib. i. antidot.

*Lib. the. ad
Pisonem.*

positionem facientia medicamēta singulatim & accuratè explorata, quia vnius cuiusdam vitium sæpe omnia corrumpit.

Ob id in cæteris simplicibus medicamentis sapore & qualitates cæteras sensibiles re ipsa nō lectione sola explora: nam experientia longa cuiusque medicamenti facultatem indicat. Sic mellis quoddam genus est inuētum, quod largiùs coctum & despumatum, aut etiam citra hanc coctionem sola vetustate in vinosam qualitatem tranſit, à quo theriaca vinum odore & sapore mentitur, quæ minùs proba est: quemadmodum etiam improbatur, quæ acido est sapore, aut ex vino nec optimo nec vetere, aut ex pane malè confecto & largiore copia misto cum carnibus viperinis. Sed de his suo loco.

Lib. 1. antidot.

Fructus item plantarū deligantur non modò, vt diximus, bene habiti, fecundiores, ampliores, substantia compactiore, ex regione legitima, & lecti in suo vigore, sed qui furculis adhuc hæreant, ex quibus alimenti adhuc nonnihil trahentes aliquandiu minùs minuuntur, & ob continuitatem cum furculis, calor illorum natiuus in aërem ambientem minùs expirat. Ob id nec rugosi immodicè sunt, quales sunt fugiendi, vt leues, rari, exuſti, tempore lógo rabidi. Quando nanque in compositis medicamentis scribitur euphorbium, thapsia, succus aliquis aut liquor, flores, folia, fructus, radices, semina, vigentia semper accipe, fuge vetustate languescencia. Vetustas autem cuique sua est. Thapsia enim recens vehemensior, annua mediocris, bima minùs efficax, trima inutilis.

Metallicorum facultates diu vigent, tamen longo temporis spatio etiam languescunt: quædam nanque ex his anno vicesimo aut tricesimo adhuc sunt vtilia, quia non elanguerūt, nec omnino declinauerunt. Cuique enim suus vigor est & sua declinatio; atque senium. Vigor odore & sapore, interim colore & consistentiæ crassamento his qui sæpe viderunt noscitur.

Cortices item radicum in totum multò sunt vtiliores ipsis earum medullis, *lib. 2. antid.*

Chamæpitys & chamædrys campestris est generosior: alia tamen herbæ plurimæ in campis genitæ sunt imbecilliores: in montibus & locis æditis valentiores.

*Lib. 1. sanit.
rue. 1.*

Rutæ folia modicè siccata diospolitico miscenda: nā plussculum siccata, acria, amara, iusto calidiora redduntur: nō siccata

eata excrementosum quēdam humorem retinent, nondum ex toto concoctum, cuius vitio statū discutere minus possunt.

Thymum sit Atticum, aut planē ex editis locis & siccis: *Ibidem.*
coma autem eius cum floribus est miscenda medicamentis:
lignosum verò quicquid est, abiiciatur.

Piper longum & zingiber, ambo integra & minimē perforata: nam ambo perforari ob humiditatem excrementosam celerrimē solent. Piper longum qualitatem piperis planē habeat, nec maceratum solvatur, nec sit foraminulentum. *Ibidem.*

Piper nigrum nec sit exile, nec rugosum, nec crassi corticis, sed graue, maximum, plenissimum. Album maximum sit, similiter & plenissimum. *Lib. 4. sanit. tuende in dia-trion. pip.*

Seseli sit Mafsiliense. Petroselinum Macedonicum, & præcipuē Estreaticum.

Calaminthe, Thymum, Pulegium potissimū ex Creta: *Ibidem in dia calaminthe.*
sin minū, certē ex regionibus editis & siccis.

Ex herbis abiecto lignoso & duro ad medicamenta accipiantur folia, & ea maximē, quæ subtilissima & virentissima, & in summis herbis nata, adhæc flores, & cum his festuæ minutissimæ tenuissimæ. Hæc mediocriter siccata tunduntur, cribrantur tenui vel crasso cribro pro vario scopo, ut dicitur in his quæ melius reddunt compositum. *Ibidem.*

Sidera etiam quorundam vigorem augere nonnullis est persuasum, ob id Aeschrion caneros fluuiatiles ad morsum canis rabidi per cynocaumata frequentissimi, vrebat post ortum canis, quando sol in Leonem transisset, non nisi luna decima octava. *Lib. 11. simp. in cancris.*

Alyssos ad morsum canis rabidi efficacissima herba, ex totius substantiæ similitudine, legenda sub æstu Caniculæ: & siccata contundi, cribrari, seruarique debet, ne diffletur. *Lib. 3. antidot.*

Scalpturas, ut draconis radios habentis in iaspide viridi damnat Gal. lib. 9. simpl.

Efficacissima item sunt remedia, quæ affectui partis ut intemperiei medentur, & simul partem ipsam nutriunt substantiæ totius similitudine, ut vva passa in affectibus hepatis & vinum saluberrimum, si ægrotent sine phlegmone, erysipelate, abscessu, calida intemperie ipsius vel aliarum partium principum, vel totius. Nam alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperiem frigidam humidam, si qua adsit, tutò persanatur.

nat. Eadem melli adsunt, nisi quòd substantiam non cogit corporum, quibus adhibetur: ob id nec ea roborat, sed eius loco terget, orificia aperit, transitus purgat, vrinas mouet, ac nutrit: illa nò despumatum, hoc despumatum potentius præstat. His verò nutritoriis medicamentis si affectus non cedit, ad ea quæ solùm sunt medicamenta, transeundum est.

*Lib. the. ad
Pisonem.*

*Initio lib. c.
ph. part.
Libro 7. c.
ph. part.*

*Scopi compo-
sitionis medi-
camenti in spu
to sanguinis.*

Li. 4. method.

Medicamenta probatissima & vigètia deliguntur ad compositionem, à natura morbi, & ægri, & medicamenti: vt enim curatoria indicatio prima est à natura morbi, secunda à natura totius vel partis: sic medicamenti componendi ratio additur & natura medicamenti: vt sanguini ex pulmone educto per vas apertum conueniunt astringentia, vt acacia, rosa, balaustium, malicorium: per vas ruptum, etiam astringentia, sed simul glutinantia, & sine morfu siccantia, vt gummi hederæ. Sed cum tam astringentia quàm glutinosa & emplastica vias sibi præcludant, calida & tenuium partium: vt cinnamomum, casia, amomum, costus, piper, myrrha, eis sunt miscenda, quæ illis vias præparent, & ea in corpus deducant: licet alioqui vasorum apertioni & rupturæ, & præterea erosioni curandæ maximè aduersentur. Ob id ea non miscentur sanguinis reiectioni ex gula, ventriculo, intestinis, vti nec frigida, & narcotica, sputo sanguinis maximè salubria, dum frigiditate sistunt sanguinem ad vas affectum ruentem, propter dictam prius causam, quòd scilicet viam sibi præcludant.

Præterea omnium internarum partium communis deligendorum medicamentorum indicatio est, vt ea eligantur, quæ animalis naturæ sunt maximè familiaria: fugiantur & respuantur contraria, vt ærugo, æris squama, æs vitum, cadmia, pompholyx, lithargyros, cerussa, vlceribus quidem externis sunt innoxia, interioribus verò non adhibenda.

QVOMODO BASIS DELIGATUR.

*Lib. 5. sanit.
tuenda. in fine:
quod præceptū
omnibus cau-
sis salubribus
est commune.*

Medicamentum itaque primum est deligendum, quod facultatem habeat curando affectui contrariam: vt in frigido affectu calfaciens: in calido refrigerans: intenso laxans, & contrà: in raro densans, & contrà: & in cæteris similiter deliges. Neque tamen sufficit inuenisse & delegisse facultatem affectui contrariam, sed æquipollentem etiam, & quæ à medio in diuersum æquè recedat, vt in morbo calido, id est, per quem
pars

pars est calidior suo temperamento ordinibus, verbi gratia, duobus, refrigerans duobus gradibus inueniendum. Eadem ratione in multum tenso, valenter laxans: in parum denso, modicè rarefaciēs: & in cæteris ad portionem. Affectus curandi ob id tota natura tibi notissima, tibi ob oculos sæpe ponenda, vt remediū inuenias illi profligando idoneum, & quod nec eius reliquias in corpore dimittat: nec etiam vltrà quàm opus est agendo affectū in corpus inuehat priori contrarium: quod accidet, si affectui, verbi gratia, calido numeris duobus adhibeas refrigerans medicamentum numeris tribus. Nam victa caliditate, frigiditatis vnum gradū in corpus imprimet.

*Lib. 9. meth.
ad finem.*

Id verò medicamentum à quibusdam & radix & basis totius compositi vocatur, sicq; clarioris doctrinæ gratia passim appellabimus. Est autem id, à quo primaria & præcipua medicamenti totius actio proficiscitur, & cuius causa cætera adhibentur, per quæ scilicet hoc melius agat, vel sine quibus hoc non agat, vel quæ etiam totum conseruant. Vt enim fundamenti firmitas reliquum probè sustinet ædificiū, & linea cui appictæ aliæ figuram constituunt, eandem velut erigit, sic basis hæc: ob id fundamentorum & basium in architectura est semper habita magna ratio: vti radicum in agricultura, quòd ab his tota plantæ vita procedat, & in componendis medicamentis basium, & in corporis nostri instrumentis anxie quærenda pars est actionis causa, princeps & primaria. Cùm igitur tantarum sit virium ea basis & radix componendi medicamenti, multa cura, præcipuumq; studium in ea probè deligenda ponendum est. Quam in rem nosse omnino debes, vt prædiximus, omnium simplicium facultates, & totam morborum omnium essentiam: deinde inire tecum rationē, an cum hoc vel illo medicamento his viribus prædito, talis & tantus affectus poterit exactè profligari, & pars ad naturalem habitum restitui. Cùm autem plerunque ad manum nobis non sint simplicia sic affectui contraria, vt eius naturam attingant & æquent, sed magna ex parte vel supergrediantur, vel sint multò inferiora: tunc ex multis simplicibus in vnum mistis basim molimur, vt ex calido ad tertium gradum & altero calido ad primum gradum æquali portione mistis, medicamenti basim calidam secundo gradu efficiamus, si talem medicamenti scopus, & curandus ab eo affectus requirit: quomodo

m

si col

si columna hæc abacum ex lapide simplici & tam crasso & tam lato requirit, hic autem desideratur: ex multis in vnum glutinatis abacum idoneum molior. Quomodo item si columna basim quadratam postulet, habeo autẽ tantum lapides duos exactè triangulos & æquilateros, quorum neuter per se columnam tutò sustinere possit: iis duobus lithocolia idonea tanquàm ferruminatis basim efficio quadratam, compositam quidem, sed nihil aut minimum simplici inferiorem. Sic plerunque vsu venit, vt simplicia habeamus duo aut inter se contraria solum, aut etiam quorum vtrunque per se, & seorsum est affectui curando aduersissimum & nocentissimum: ambobus tamen certa quantitate mistis efficitur medicamentum longè præstantissimũ, eaquẽ cõponendi ex cõtrariis ratio in tota medicina frequētissima est, & methodo cõstat exactissima.

In omnibus enim affectibus generosa medicamēta ex contrariis componuntur. vt stomaticum, diamoron & diacaryon, & alia permulta succo mororum aut viridum, corticum nucum, & interdum galla, aceto, rhoë & similiter astringentibus, & vehementer repellentibus constant: adhæc myrrha, melle, & aliis permultis digerentibus, & præterea lenientibus, cõquētib. Quædam autẽ non modò ex contrariis inter se cõstant, vt digerētibus repellentibus, vt diabesasa Andromachi, sed validis vtrisque: alia valentioribus digerentibus quàm astringentibus: alia contrà, aucto scilicet alterutro aut diminuto, pro affectus præsentis natura, & ægri, & aëris.

Ex contrariis autẽ non modò inter se, verum etiã ipsi affectui per se nocētibus efficacissima fiunt medicamēta, vt oleũ per se omni vlceri est nocentissimum, quia humectat, & fordes parit: omne autem vlcus siccantia & tergentia requirit. Chalcitis autem quia vehementer rodit, & ærugo, vlceribus maximè nocent: ex ambobus autẽ mistum optimum fit remediũ: sic ceratũ & ærugo per se carni generadæ in vlcere cauo sunt cõtraria: mista verò idonea mensura (quæ cuique vlceri & naturæ sua esse debet) sarcoticum efficiūt laudatissimum.

Contraria autem hic intellige non modò propriè dicta, vt calidum frigidum, tensum laxũ, repellens attrahens: sed etiam quæ eipsdẽ sunt speciei, sed maioris & minoris ratione sunt diuersissima, vt summè & minimũ astringens: item summè & minimum laxans, vel digerēs, vel calfaciens. Composita igitur

*In fine lib. 6. c.
ph. p. & lib. 1.
c. ph. p. & in-
tio lib. 3. meth.
Ibidem.*

igitur ex contrariis tam congeneribus quàm diuersi generis sunt multiplicia. (Contraria autem congeneria voco, vt summè astringens, minimum astringens, & similia. Contraria autem diuersi generis, vt astringens seu densans & laxans, frigidum calidum.) Primò, cùm in congeneribus vehementi misceo mite alterũ quòd medio indigeam, vt rosarum florem, vel rosas ipfas, vel aliud ex elemēter astringentibus cum galla, vel alumine, vel alio valenti: sic cum calido frigidũ misceo, si amborum medio egeo, quod nec refrigerat, nec calfacit: si autem portione inæquali ambo miscueris, ex hac variatione compositorũ medicamentorũ numerus erit maximus: quin etiam duobus quibuscũ diuerso pondere mistis. magna compositorum multitudo efficitur: vt si rosarum flos & alumen æquali portione miscentur, tunc medium erit extremorum medicamētum vel flos duplus, triplus, quadruplus ad alumen, tunc mitissimum fuerit medicamentum: aut contrà, alumen duplum, triplum, quadruplum ad florem rosarum, tunc vehementissimum fuerit medicamentum, ratione maioris & minoris in utroque diuersissima pro portione alterutrius maiori aut minori. In quibus ne quære quod præstantissimum, omnia enim respectu ad aliquid iuuant vel nocent. Iuuant enim, cùm tempestiuè talia & tanta corpori adhibētur, quando talia & tanta corporis affectus præter naturam postulat: nocent, si quid horum desit. Quod sæpe accidit vires remedium & naturas affectuum ignorātibus, ob id sæpe coactis sine methodo ad alia atque alia remedia transire.

Sic si in pulmonibus apertũ est vas, remedia tibi inuenienda astringentia, quæ contrahant: si ruptum, quæ siccent sine morfu, astringant & glutinent: si exesum sarcotica, additis boni succi alimētis & renutrientibus. Neq; solum basim facimus mistis pluribus contrariis, sed etiã sæpe idem pollentibus: quia vnus larga satis quãtitas nobis nõ suppetit: vt si anodynnon volo, id decocto chamæmeli paro: quod quia parcius mihi adest, quàm opus est, quod deest, refarcio per melilotum.

Miscentur ergo medicamēta vel cōgeneria, id est, eiusdem generis & facultatis, vt astringentia omnia, sed alterũ summè, alterũ minimum, vel diuersi generis. Congeneria quidem, vt multa horum extremorũ media habeamus maioris & minoris ratione diuersa ex mēsurâ misionis huius vel illius extre-

mi, quod in omni affectu est optimum, & ad remediorum copiam præstantissimum. Quæ larga remediorum suppellex etiam nobis adest, si duo affectui per se noxia miscemus: ut oleum & æruginem, vel chalcitum in medicamento sarcotico, ut aliquoties diximus.

Diuerſi verò generis medicamenta miscemus non ad ipsorum copiam solum, sed quia rari sunt affectus, qui sola vel astringentia vel digerentia requirant. Si enim parvus est affectus, per se definit. si maior est futurus, per sola repellentia non persanatur, præsertim corpore multis humoribus pleno: aut si pars affecta natura est imbecilla. Ob id cogimur sæpe vel statim ab initio vel paulò post aliquid digerens miscere, & si dolor vehemens vnà affligit, etiam mitigatorium. Si complicati sunt multi affectus, scopi plures erunt inuentionis & compositionis remediorum: ut si simplex vulnus est cum contusione, vnus à vulnere est medicamentorum glutinantium, alter à contusione digerentium aut coquentium, tertius à dolore vel in parte icta, vel etiam illi continua, & is scopus anodynorum: vel si hæc non sufficiunt, narcoticorum: ubi videlicet victis omnibus, horum maxima est necessitas. His enim temerè non utendum est, ob noxam corpori & sæpe affectui ab his impendentem.

Basis præterea diuersis sæpe opus est, quod medicamentum sit polychrestum, id est, multis simul affectibus salubre, ut theriace, mithridatios, & alia permulta: tuncque tot bases deligere oportet, quot actiones à medicamento exigimus, nisi forte in vno simplici plurimum vsuum vis claudatur: ut in rhabarbaro, aloë, absinthio, facultas cholagoga inest, & styptica, quibus duabus virtutibus si affectus eget, ut cum bilis flaua os ventriculi obsidet, simplicia hæc duarum basium loco fuerint. Eadem ratione si ex pulmone crassum & lentum humorem educiturus, miscenda sunt incidentia, tenuantia, tergentia, expulſioni parantia, purgantia, & lenientia, ne exasperatio dolorifica his succedat: sic omni vlceri conueniunt siccantia, tergentia, quia ei perpetuò adsunt sanies & sordes, maior utraque valentioribus, minor mitioribus remediis siccantibus & tergentibus indigens. Eodem habet modo in affectibus omnibus complicatis, nisi qui naturam habent eandem: ut si tertiana febris est, ipsa enim affectus calidus siccus à bile flaua calida sicca, quo casu refrigerantia & humectantia intendere solum opus,

opus, quia febris ipsa & eius causa bilis flava putrens eadem genere remedia postulant: sic ladanum per se capilli defluuium sistit, quia raritatem cutis astrictione sua densat, & sanguinem benignum per caliditatem suam attrahendo, substantiæ pilos generantis inopiam corrigit. Quæ raritas cutis & alimēti penuria duæ sunt pilorum fluentium causæ, quarum priorem astringentia tantum corrigūt quidem: posteriorem verò augent, nam sanguinem à parte repellunt, & ob id etiam pilorum defluuium augent, si ambæ hæ causæ illos deturbēt: sed calore ladani vehementia repulsionis lenitur.

Quòd si medicamentum ipsum simplex est imbecillum, eius duplum est miscendum, ut in hemicrania veteri ponendum est duplum euphorbii bimi aut trimi loco recentis. Sic epithymo ad purgandam melancholiam imbecillo adduntur elleborus niger, fenna: cneco phlegmagogo, scammonium, agaricus, turbith: rhabarbaro cholagogo scammoniatū aliquid, nisi simplicium horum quantitatem multum augere mauis. Ratione eadem pro cinnamomo duplum optimæ casia vel carpesii, & in aliis similiter.

Si verò est valentius, vires eius aliis sunt remittendæ, ut in alopecia euphorbii & thapsiæ vim valentē frangit Gal. oleo, cera, thure, melle, adipe, vel humiditate quavis oleosa. Sic psilothrorum, id est, pilos auferentium medicamentorum ex sandaracha, arsenico, calce viua, virtus vehemēs mistura imbecillorum medicamentorum: vel liquidorum, ut vini, mellis: vel aridorum, ut amyli, terræ selenusiæ, frangenda. Sic scammonium quarto ordine calidum, essentia tenuis, virium omnium substantiam maximè dissipans frangitur per contraria tota substantia, & qualitate: & vires roborantia, ut per dactylos in diaphœnico, per pruna in diapruno, per succum rosarum in cathartico diarhodo, per carnem cydoniorum in diacydonio purgatorio, cuius meminit Gal. lib. 1. alimentorū. Quæ frigida sunt, crassiæ essentia, astringentia partium substantiam & cogentia. Quibus alia adduntur, vel his administrantia, vel partes principes iuuantia totius substantiæ proprietate, ut post in compositorum enarratione patebit.

Item si qua in eo est substantia aut qualitas corpori vel affectui nocitura, aut etiam medicamenti actioni, ea antè vstione, lotionē, vel alia quavis ratione tollatur, aut mistis aliis corri-

gatur & frangatur. Ob id metallica sæpe vrimus, vt tenuiora fiant: & lauamus, vt mordacem acrimoniam vlceribus noxiam tollamus. (Nam mordacia in vlceribus vitamus, vt exasperantia in phlegmonis, præsertim dolorificis) scammonii & aliorum valentium vires corrigimus & obtundimus aliorum mistione, vt in antidotis catharticis patebit. Sic errhina valentia mitigat Galenus lacte muliebri, vel aqua, vel alio.

Sic succus ireos per se calidus est, cum aceto autem non calfacit, lib. 2. comp. ph. part.

Lib. 4. meth.

Lib. 13. meth.

Eadē ratione in vlcere gulæ medicamēta deligit Galenus non modo vlceri curando idonea, sed quæ nullam vlceribus propinquis, vel deglutiēdo contactis, noxā inferāt. Ob id etiā stomaticis non vult misceri chalcanthū, fori, misy, chalcitim, diphryges, æs vstū, squamā eris, eris florē, quia noxia hæc sunt deuorata gulæ, vtriculo, & cæteris partib⁹ vtr̃is inferioris.

Lib. 1. c. ph. p.

Ab effectibus præterea magnitudine variatur medicamēti non genus sed vehemētia, vt achoribus paruis & adhuc incipientibus sufficiūt mediocria digerētia vino mersa: diuturnioribus autē & maioribus valida debētur: curatu verò difficillimis & longissimis valentissima. Sic alopeciae incipienti sufficiūt purgationes, vna quidē per cataportia ex aloë, duæ vero ex hiera diacolocynthidos, prior ex drach. eius. 4. posterior ex drach. 5. sine errhinis & apophlegmatismis & topicis remediis, quæ veteratis sunt necessaria præsidia. Validis enim medicamentis initio affectuum non est vtendū, nisi sint extremi: sed mitiganda sunt eorū mistura, quæ vim illorū validā dissoluant, quod paulò antè docuimus. Sic imbecilla medicamenta superficialiis affectibus & genitis ab humore paucō, nec crasso, nec lento, nec impacto adhibēda sunt. Valenter autem digerētibus est opus, si affectus est profundior, & ab humore multo, crasso, lento, valēter impacto. Sic in alopecia con-

Lib. 1. c. ph. p.

Lib. 4. c. ph. p.

Lib. 2. ad Glau-

con.

tumaci & inueterata validis medicamētis miscet Galenus ce-
ratum liquidū, in parua & incipiēte imbecillis medicamētis,
oleum laurinū. Sic medicamētis phlegmones scirrhis quæ-
dam ex liquoribus acris miscētur, & medicamētis ad pte-
rygiū & fycosin quiddam ex medicamētis excedentibus. Sic
maligna & putrida vlcera postulant medicamenta acriora, &
quæ ignis vires habent, quale est misy, fori, calx, sandaracha,
arsenicum, cū cætera vlcera requirant medicamentum sic-

cans

cans & tergens sine morfu & vehementi irritatione.

Ab affectus verò tēporibus, etiā sæpe medicamēti genus mutatur, vt incipientibus achoribus, sine totius cacoehymia saltē multa, astringens & repellens remedium est parandum: incrementibus verò repellens quod influit, & coquens ac discutiens, quod iam influit. Sic phlegmonæ incipienti, si moderata est, sufficiūt repellentia mediocria, qualia sunt omnia frigida: si verò violētior sit affluxus, valentioribus repellendū, austeris scilicet, ac interdū etiam acerbis. In augmento astringētibz digerens aliquid miscendū, in statu digerentiū vis intendenda, in declinatione his propē solis vtendum, nisi prope partem principē sit, & in collo, alis, inguinibus: aut materia sit pestillens, aut crassa, & valētius impacta. Nā in omni humorū in aliam partē affluxu cōmunis auxiliorū scopus est repellendi & reperiendi: vbi verò nihil amplius influit, quod impactū est, digerēdi. Sic gargareonis phlegmonæ initio adhibenda, quæ materiæ affluxū repellant, mediocrē quidem, mediocriter astringentia scilicet austera, vt rosa, flos rosarū, & cætera prius dicta: vehementē verò valentius astringētia, scilicet acerbis, vt balauſtia, malicoriū: si verò iam cōstitit fluxio, digerētia miscemus. Nam quousq; aliquid influit, repellendū: vbi constitit, coquendum: deinde digerendū. Sic diamoro nunc cum repellentibus, nunc cū coquentibus, nunc cum digerentibus rectē quis vtetur in phlegmonis oris, si eius vsus pro generalibus illis scopis mutauerit.

Lib. 10. c. ph. p.

Lib. 6. c. ph. p.

Initio fluxionum, vt in phlegmone, quod influit, est repellendū, cæteris temporibus digerentia repellentibus miscenda sunt, vt in incremento repellentia præpolleant in declinatione digerentia: in statu amborum æqualis portio. Si verò reliquæ quædam inflammationis, velut in scirrhum induratae supersint, solis digerentibus agendum est corpore puro. Qua methodo qui vtetur, & simplicium medicamentorum vires nouerit, nunquā auxiliis idoneis destituetur, vbi vbi fuerit. Nam priusquam toti corpori sit prospectum, si afflicte parti medicamentum acre & calidum adinoueas, trahit more cucurbitulæ ex toto corpore in afflictam partem superuacua, & ei grauata sic affigit, vt ægrē auelli queat.

Ibidem.

Lib. 4. meth.

Cum ab affectu præter naturā indicationē primam deligendi medicamenti ad compositionem idonei diximus, non

Lib. 12. meth. à morbo tantum ipso, sed etiã à causa adhuc præfente & interna, cuius propriè est præcautio, intelligimus & à symptomatis, licet hæc primò & per se nihil curatorium indicent.

A causa enim fumitur indicatio componendi remedia, vt pityriaseos, id est, furfurationis in capite à prauis ichoribus & saniebus nascentis remedia sunt, quæ hos ichoras digerunt & tergent, vacuato prius corpore toto, si vacuationis egere videbitur. Addunt quidam roborantia partem astringentia, vt ne affluentem sibi saniem recipiat. Sic phthiriascos, id est, morbi pedicularis in alta cute excitati à colluue humorum calidorum putrescentium siccantia & valenter ex alto trahentia sunt idonea auxilia, quorum materia vfu probata est sumenda (nam omnibus quæ experientia commendauit, fidentum) vt staphis agria, sinapi, cardamum. Sic achoras ex sanie tenui & mordaci ac simul ex humore crasso & lento natos curant, quæ hunc humorem incidunt & digerunt, & necessariò reprimunt humoris influxum, vt in alopecia, quæ omnia acetum acerrimum præstat cum metallicis, vt cimolia, pompholyge, cadmia, vel charta vsta, subactũ, vacuato prius corpore toto & capite, nisi affectus sit exiguus: tunc enim sufficiunt topica seu merica auxilia. Sic in putridis febribus humoris, qui putrendo febrem gignit, fouet, auget, rationem habendam docet Galenus per alterantia, quæ putredinẽ finiant: & per vacuantia, quæ materiam putrem aut putredini paratam de corpore pellant.

Lib. 9. & 11. meth.

Lib. 8. method.

Eadem ratione in diariis febribus, quanuis externa causa defierit (à qua vt quæ non amplius sit, nihil curatorium indicatur) tamen quia in corpore dispositionẽ remanentem excitauit, quæ causa continens fuit febris, & eius accessionem prorogauit, dispositioni illi prospicit. Si enim diaria est ab æstu, per totum accessionis tempus irrigat caput partem primam, & immodicè à sole calfactam. Irrigat autem oleo rosaceo, refrigerato, ex alto effuso. In diaria à densata cute balneo refrigerante vel densante, magna illi cura est rarefaciendi corporis, frictione molli multa, cum oleo tenui & laxante. In diaria à mœrore præter dicta remedia lætitiã: ab ira, animi tranquillitatem, & cætera contraria dispositioni in corpore relictæ à causis illis externis iam desitis. Sic in fluxionibus à calore vel dolore, symptomata hæc fluxionis causas primũ opprim

opprimenda docet. In fluxionibus verò à transmissione, partibus transmittētis primam & maximam rationem habendam censet. Nullus enim affectus percurari potest, manēte in corpore causa quæ ipsum excitauit.

Eam indicationē à causa morbi ad rectē basim inueniendam, pluribus docereim magnarum esse virium, nisi prolixior esse metuerem. Ob id mihi satis est visum, ipsos velut fontes quosdam rei indicasse in methodo medendi. Ex quibus diligens lector haurire plura possit, si hæc illi non satisfaciant. Satis enim nobis est componendi methodum indicasse, nec omnia afferre particularia conamur: quando id infiniti fuerit operis, & parum necessarii. Pauca tamen in singulis particularia afferimus, ceu sensui notiora, per quæ methodos ipsas vniuersalia maxime prodentes, & rationi notiores lector possit intelligere.

A symptomatibus quoque indicatio est deligendorū remediōrū, quæ ipsa vel tollant, vel mitigent, vel saltē non exacerbent. Vitabis enim in capitis dolore ab ebrietate palmulas & myrrham: nam illæ proprietate quadā dolorem capitis faciunt. Hæc etiam sanis vapore multo & calido caput replens: multo magis iam dolentibus auget. Eadem ratione vitabis mentham, crocum, & alia omnia, quæ vapore calido caput replentia dolorem geminant. Vsurpabis autem in eodem hederam & brassicam, quæ naturali virtute ebrietati resistunt.

Stupefaciētia adduntur quibusdā, quæ dolorē leniunt, non quòd dispositionibus opitulētur, sed quia vim sensoriā stupefaciunt, sine qua nō sit dolor. Vbi enim dolor inuictus vrget, sensum stupefacientibus vtendū est in auribus, cælo, renibus, & in qualibet alia parte vehemēter dolente. Auribus autē in inflammatione dolēribus opiū lacti muliebri, vel albumini oui, vel castorio æquali mistū iniicitur: sed si vehemētissimus est dolor, duplicatum. Nec solum vt oppositū opio miscetur castorium in auribus purulentis, sed etiā quia coquit & siccatur. Lib. 3. c. ph. p.

Narcotica autem per se dispositiones ipsas dolorificas non iuuant, imò lædunt, & crudiores ac contumaciores reddunt: per accidens verò sæpe iuuant. Vbi enim dolor per ea cessarit, & somnus sit obortus, natura dispositiones dolorificas concoquit. Narcoticis verò huiusmodi vtimur, quando à nullo anodyno potest dolor mitigari. Ob id ipsius vsum Lib. 3. c. ph. p.

Ibidem. semper vitauit Galenus, nisi magna eum necessitas ad vtendum cogeret. Eadem omnino ratione, quia meconium insigniter stupefacit, vt tutior esset eius vsus, Apollonius, & alii quidam insignes viri ipsum tostum castorio miscuerunt, quòd nò tosto nonnullos offendi viderint, vt dies multos post vsum caliginosè viderint, & capitis grauitatem senserint, & cibos malè coxerint. Sed inter torrefaciendum omnem eius efficaciam tolli sæpe expertus est Galenus: propterea melius duxit, non tostum castorio miscere, quòd refrigeratoriæ facultatis eius vehementiam obtunderet. Postea verò eius malignitate temporis spatio obrusa vtendum est, quando scilicet adhuc abundè efficax manet: quod in Philonis antidoto libro quarto audies.

Medicamento verò ex opio & lacryma papaueris tantum vtimur, cum ex doloris vehemètia, à morbis periculum imminet: quāuis horum vsu noxa quædā solidis partibus accidat, post corrigenda: collyria tamè ex opio multorū oculos sic imbecilles reddiderunt, vt hebes visio euaderet: & aures aliis sic infirmarunt, vt auditum grauaret. Ob id in his rarissimè eo vtendū, in capitis dolore nunquam, quia nemini tam vehemens accidit, vt animi deliquio mortuus sit aliquis, aut seipsum occiderit, vt colicorū nonnulli. Quātūcūq; enim quis capite doleat, minus dolet, quàm cui oculus, auris, dens, cœlum. Nec tamen soli tactui stupefaciendo narcotica ista adhibentur, sed etiam auditui, vbi ob eius acrimoniam fit auriū tinnitus: & oculis, quando ob videndi acrimoniam suffusorū imagines à vapore ex ore ventriculi exhalante adsunt.

Lib. 3. c. ph. p. Optimus autem compositionis narcoticorum scopus est, vt ad tria, qui ea componit, respiciat: primū, vt sensum tactus obtundat: secundò, vt nihil noxæ ex hac stupefactione in particula relinquatur: postremò (quod est maximū) vt dispositioni auxilientur. Quæ tria Philo in sua antidoto seruauit. Nam hyoscyamus & omnium valētissimè opium facultatis sensoriæ, stuporem & somnum torpidum frigiditate summa molitur. Vt autem horum vehementia obtundatur, nec adeò noceant, sed imminens ab eis noxa potius inhibeat: vtq; citius distribuatur stupefacientia (nam per se admodum tardè permeant) & penetrent interiorum affectarum partiū substantiam: calfacientia adiecit costum, pyrethrum, euphorbium,

bium, piper, quæ etiam noxios & dolorificos humores coquere, crassos tenuare, lentos incidere, & tergere, & flatulentos item spiritus tenuare, & virosque per halitum digerere & vacuare possunt. Ob hæc Philonium, & quæ similia sunt, doloribus colicis implacabilibus salubre est: ac in vomitu, singultu, erosione stomachi aut vetriculi ab humoribus acribus, & in æstu ventriculi.

Eadem ratione medicamentis vt stomachicis sic hepaticis opium, altercum, & similiter refrigerantia interdum miscentur, quæ calidas illarum partium intemperies mitigent: ea tamen mensura, vt totum compositum dictis partibus non sit vehementer refrigeratorium. Si enim refrigerantia in missione præpolleant, sensus partium affectarum magis obtundetur, & calor partis totius magis extinguetur: si calida vincunt, frigiditatis effecta minus apparebunt, sed innoxium magis fuerit medicamentum. Nam viuis corporibus simile quid mortificationi accidit ex opio, & similiter frigidis: dum partes horum vsu causas dolorificas sentire desinunt, & crebro vsu frigiditatem partibus immedicabilem excitant.

Vt igitur in refrigerantium & calfacientium oppositione quantitas alterutrorum, præpollentē medicamenti actionem ostendit, sic in aliis contraria recipientibus, densantia rarefacientia, cogentia fundentia, digerentia repellentia, humectantia siccantia, vel solum diuersa astringentia, erodentia, tenuantia, tergentia mitigantia, digerentia, hypnotica, id est, torporem & somnum inducentia. Sic Andromachus suis confectionibus bechicis & hypnoticis ad tenues humorum influxus incrassandos, siccandos, refrigerandos, opium miscet, & mandragoræ succum, & radicis eius corticem, & alterci semen. Quædam enim eius compositiones duo ex his, quædam tria, quædam omnia continent. Opium soli sapæ mistum lana exceptum, fedi, fronti, naribus, aut alteri parti vehementer dolenti impositum abundè stupefacit: vt tamen id medicamentum frigidas dispositiones valenter coquat, additur crocus, nardus Indica, myrrha, castorium. Addi etiam possunt semina anisi, ameos, apii, petroselinii, seseleos, cumini, dauci, ad amari medicamenti insuauitatem corrigendam, & vt citius penetret, vrinasque moueat, & succos crassos, si qui sunt, magis tenuet. Eadem ratione vi-

Lib. 8. c. ph. p.

Lib. 7. c. ph. p.

gillas

gillas in morbis per refrigerantia & humectantia expugnamus: syncopen quoque magna cura præcipuoque studio tum præcauet, tum præsentem abigit, lib. 1. ad Glauconem, & lib. methodi 12. Et si qua sunt alia symptomata præsertim insignia, & quæ causæ morbum fouentis vel augmentis, tunc rationem obtineant, ab illis aliqua componendi medicamenti sumitur indicatio.

Quædam autem medicamenta interdum componimus contra nullum morbum, sed ut quod secundum naturam est feruamus, qualia multa sunt cosmetica, id est, corpus ornantia & expolientia: & commotica, id est fucatoria: de quibus multa lib. 1. composuit. phar. part.

Inflammatam igitur, aut aliter ægrotantem particulam aliam quam curaturis, communis omnium inflammationum alteriusve cuiusvis morborum generis, sub quo sit morbus partis, scopus primus occurrit, & indicatio ab affectu ipso, quæ primum medicamentorum genus, quibus utendum sit, inuenias. Deinde indicatio ex partis natura sumitur, ex qua particulares medicamentorum differentias eligimus: de qua dicere tempestiuum iam fuerit.

A partis natura & usu indicatio sumitur deligendi medicamenti, quod parti sit blandum & innoxium, indolens, temperamentum eius non vitians, sed seruans aut restituens, si per morbum sit mutatum. Nam curationis genus etiam affectuum eorundem in qualibet parte materijs variat.

Vt ophthalmia i. phlegmone oculi tunicæ adnatæ, quanuis omnium phlegmonarum curationi per vacuantia subijcitur, tamen quia ea tunica plusquam cutis reliqua sentit ob sensus promptitudinem & substantiæ raritatem, repellentia postulat, quæ non exasperent, sed elementer adstringant mista liquoribus mitigatorijs oui albumini, fœnigræci decocto, lacti mulieris iuuentulæ, & euchymæ è mamilla supra cotem medicam expresso, in qua collyrium teritur, ut tepidum adhuc oculo infundatur, præsertim cum magna est ophthalmia, aut humorum affluentium acrimania: quando amyllum, aster Samius, spodium lotum, pompholyx lota, cerussa lota, plumbum vstum & lotum, & id genus alia *ἄποια*. i. exigua aut nullam qualitatem gustui aut olfactui repræsentantia, qualis aqua, sunt salubria. Hæc enim quia rosionis omnino sunt expertia, & sola terre

la terrestri parte substantiæ, mediocriter siccant, his miscetur medicamentis, & alijs contra vlcera vel sola, vel cum erofione, & sanie mordacissima effluente. Qualia multa in cornea & rhagoide tunica nascuntur. Quòd si hæc primis diebus nihil iuuare videantur, longiore tamen spatio auxilium sensibile præbent, solaque his vlceribus conueniunt. Nam adstringentia saniem effluentem retinent, & hac ratione dolorem ex saniei morfu natum intendunt: acria verò dispositionem mordacem augent, & quod affluit, corrumpunt, siue benignū erat, siue iam coeptum corrumpi à malo oculi habitu, vel capitis, vel totius corporis vitio.

Vlcera item oculorum eadem secundum genus curatione sanantur, qua cætera scilicet siccantibus & tergentibus sine morfu, & postremò adstringentibus: tamen propter partis naturam sint omnino morfus expertia & læuissimè trita, vt ex pompholyge lota, tenuissimè trita collyrium factum misto interdum mandragoræ succo, ad vehementissimos dolores leniendos sufficit: alij succum rosarum vel polygonij, vel albumen oui addunt paulò antè vsum, quia citò illa acefcunt. Omniū enim vlcerum non modò oculorum materia huc spectat, vt vlcus ipsum sit purum, natura verò partium ipsum replet, ac cicatrice tegit. Quæ verò vlcera recipiant, & requirant mordicantia, priùs dictum est.

Sic oris totius tunica cùm sit cute totius corporis multò rarior & mollior, ad hæc ea sola medicamenti insuauitate infletur, cumque faucibus subiecti sint duo meatus, guttur in pulmonem, gula in ventriculum, per quos aliqua portio medicamenti stomatici in dictas partes potest defluere, stomatico miscere nò audemus valentia, & insuauia, & quæ his partibus obesse possunt. Ob id emplastro dia chalciteos & alijs quibusdam validis, & vim quandam lethalem habentibus in vlceribus cutis vti possimus: in oris verò affectibus nemo vtatur tutò, etiam si vlcus ea postulet, nisi magna eorum vsus sit necessitas, quia eorū aliquid in fauces, & inde in guttur, aut gulam delapsum vehementer partes recepturas lædit. Còtrà in reliquarum partium affectibus, saporum suauitatem, vel insuauitatem non spectamus.

Sic phlegmone stomachi & ventriculi & hepatis non solis laxantibus est curanda ob harum partium actionem corpori
toti

toti necessariam ad viuendum, sed miscentur etiam astringentia harum partium robur seruantia, vt absinthium, aloë, mastiche, nardus, cydonium. Sic in scirrho hepatis calfacientia & tenuantia præpolleant magis, quàm in scirrho aliarum partium, sed mollientibus admodum moderatis vtendum, quia iecoris corpus velut ex humoribus concretum est: ob id Hero philo parenchyma dicitur.

Lib. 8. c. ph. p.

Item in scirrho hepatis semen cucumeris & baccae iuniperi miscentur, quæ mitigent, & aliorum vehementiam obtundant: & mel, & eryngium, vel similia sumendis adduntur, vt excretionis viam præsternant per vrinas his quæ ex scirrhom iam terfa & fusa per sumpta & admota fuerint. Scirrhus enim omnis cum fiat à frigido crasso & lento humore in partes solidas transmissus, calidis, incidentibus, tenuantibus, & tergentibus, & digerentibus est curandus.

Lib. 2. c. ph. p.

In dolore capitis ab æstu initio refrigerandum, maxime per sinciput: quod ibi os sittenuæ, rarum, & futura coronalis: non per occiput, quia id ægrè vritur, nec citra noxam refrigerantia sustinet ob spinalis medullæ exortum tot neruorum principium. Per sinciput etiam est calfaciendum in capitis dolore à perfrictione: sic vitia sedis requirunt refrigerantia & siccantia, sine morfu tamen & rosione, vt metallica non acria, nec omnino acerba, sed lota. Quia pars hæc calida humida quodammodo præter naturam ob excrementorum calidorum contactum perpetuum, & quia ægrè transpirat. Adhæc quia sensu exacto est prædita ab acribus & acerbis, quia rodunt vel diuellunt, irritatur.

Sic lassitudinem motoriam etiã phlegmonæ de crurum, brachiorum, spinæ, oleo infricantes partem curamus, vt eius facultate per cutim ad musculos ipsi connexos perueniente ipsam discutiamus. Si autem similis lassitudo in tunica interna asperæ arteriæ, & musculis laryngis, post vociferationem multam, & præcipuè acutam fiat, oleum & alia emollientia & digerentia per cartilagineas ad partem lassatam non peruenient, sed paulatim deglutitis est opus lenientibus: tamen balneum dulce omnibus his commune est auxilium.

Lib. 4. fanit. tuenda.

Sic aquam mulsam, oxymeli, & alia, omnibus non eadem mistione coquimus: quidam enim ea libentius bibunt aquosiora, alij dulciora, vt quidam vinum dilutius amant, & si meracius bibe

eius biberint, ijs caput feritur: alij meraciore gaudent, qui si dilutius biberint, his ventriculus euertitur. Sic diamoron hi dulcius volunt, quibus plus mellis miscendum: alij austerius, quibus minus. Cum igitur alicui medicamentum sumendum imperas, conijce aut interroga, quibus præcipue saporibus secundum naturam delectatur, & singulis quod iucundum est, para, modò ne medicamēti facultas insigniter exoluatur. Ob hæc Medici sumenda medicamenta faciunt media, quæ pluri bus naturis conueniunt, & ab alijs minimum recedunt. ob id facile ad propriam cuiusque naturam paucis quibusdam additis accommodantur.

Sic phlegmone initio repellentia materiam affluentem potestulatur: quæ verò est in parotidibus, trahentia, nisi interdum & rarò paucum astringentium multo digerenti miscendum sit, quando scilicet parotis cum paruo dolore erumpit. Lib. 3. c. ph. p.

Remedijs item hemicranicis tam calidis quam frigidis iuber Galenus misceri corroborans aliquid, astringentia scilicet facultate præditum. Quod præceptum in partibus actionem aut usum toti corpori communem & necessarium habentibus est perpetuum, ventriculo inquam, & hepate, liene sæpe. Præterea indicatio curatrix & medicamentorum ut aliorum quoque remediorum inuentrix sumitur à viribus, ætate, consuetudine, non primò sed ratione temperamentis, quod hæc ambo immutant, & nouum sæpe faciunt: illè temperamentum in quo consistunt, sequuntur. Item non à partis temperie solum, sed ab ipsius situ, connexionem, figura, magnitudine, sensu exacto & obtuso, aëre, id est anni parte, regione, cœli statu. Quorum singulorum exempla tantum singula prolixitatis fuga adscribemus.

Imbecilla debentur remedia omnia imbecilibus, nisi vires copia grauatur falsam imbecillitatis suspensionem præbeant: tunc enim valentiora ferre possunt, uti & robustè nec grauatur insigniter.

Pueri & senes valentia remedia non ferunt, præsertim vacuantia. Illi enim calidi humidi plurimum per insensilem transpirationem vacuantur: his infirmum & frigidum corpus viribus scilicet omnibus imbecillis. Consuetudine remedia minus molestare solent, sed etiam minus sunt efficacia.

Pars ab ore & stomacho remotior sumenda medicamenta
valen

valentiora indicat, quòd priusquam affectui occurrant, vires eorum obtundantur alteratione, aliorum mistione. Eadem ratione quæ sunt profundæ partes, adinouenda medicamēta postulant valentiora, & quibus tenue aliquid additum ad penetrandum parer, vt acetum, euphorbium: vel etiam astringens à tergo impellat. Contra verò cùm parti affectæ remedium viribus integris aut parum fractis occurrit.

Quia connexio lieni est per vas venosum cum venis mesaraicis, lienis vacuatoria remedia sumpta aut iniecta facio valentiora, quàm si ex initio mesarei, vel etiam toto mesareo esset vacuandum.

Cauæ intus partes, medicamenta intro recipere possunt: foris, foras: intus & foris, vtroque versus: nec intus nec foris, nusquam. Magna verò cavitatis largius medicamentum capit, vt vomitoria sint larga quantitate, quæ vesicam vel vterum vacuant iniectiones, parcæ: quæ intestina lata & parum plena aut pressa, largæ: quæ angusta, quæ stercore aut flatibus plena, aut foetu, vel ascitæ, aut tympania pressa, parcæ.

Lib. 3. meth.

Quæ corpora sensu tactus exquisito sunt prædita & molli, valentia & acria & mordacia medicamenta non ferunt: quæ obtuso, ea ferunt.

Aër si temperiem habet morbo similem, quia causa est insalubris, medicamenta debent habere qualitatem aëri & morbo repugnantem, insigniorē, quàm si aër ipse morbo contrariam haberet intemperie. Horum omnium exempla propè infinita sunt tota methodo, lib. sanit. tuendæ, & lib. 2. ad Glauconem. Quapropter nō est, cur in his pluribus immoremur.

Lib. 9. c. ph. p.

Ab affectu simul & partis natura plurima, vt in dysenteria opium, galla, malicorium, cortex pini, semen alterci, myrta sicca, acacia, rosæ siccæ, pyra, sicca omnia torrefacta dantur, vt dolorem obtundant, & partem aduersus causas dolorificas roborent.

Lib. 1. c. ph. p.

Sic alopecie difficili nec cedenti tribus aut pluribus totius purgationibus dictis à Galeno, topicū debetur medicamentū calidum, quod digerendo vacuet, non tamen adeò calidum, vt vrat, aut etiam curim citra vstionem immodicè siccet: nec tamen mediocriter calidum, vt non vacuet quod volumus, sed tenuium sit partium, vt in altum penetret ad originē radicis pilorū: quia cutis capitis crassior & durior, ob id efficaciore opus

opus est medicamento, quòd & prauos succos digerat, & sanguinem probum trahat, qualis est thapsia. Quæ cum multò sit calidior quàm affectui & parti conueniat, solam ne applica: nam cutim vlcerat, & tumores in ea excitat inflammatorios: ob id quædam eius vehementiam mitigantia misce, vt ceratum ex oleo tenuium partium (quale est sabinum vetus, vel ricininum recēs: non Hispanum, vel omotribes, vel aliud astringens) vel aqua mista thapsiæ recenti: nam annuæ vis dissoluitur: bimæ magis, trima est inutilis.

Sub natura partis comprehendende naturam totius, & expendere, an quod medicamenti genus pars affecta idem corpus totum insinuet, an diuersum. Id quod simile vel dissimile partis & totius temperamētum tibi planè ostendent, vt lib. 3. methodi fusius leges. Præsidia etiam alia ciuilibus corporibus scribenda sunt, alia fossoribus & messoribus, vt acetum feruens, aut muria acetosa in parotide.

Lib. 3. c. ph. p.

Ad totius naturam, ægri quoque & Medici facultates referas. Pauperes enim medici sumptuosa & diuitū remedia parare nequeant, quòd illis sit res domi angustior. Pauperibus etiam pauperem ex viliore materia apparatus, diuitibus dignum ipsorū diuitiis ex opulentiore præparare oportet. Ob id dentrificium suum diuitibus cinnamomo, pauperibus cassia vel amomo aromatizat & iucundius odore & sapore reddit Galenus, & in opulentorum ozæna medicamentis miscebat odoris gratia aliquid hedychroi in falerno veteri mersi, lib. 3. comp. ph. p. Neque tamen ob id putes, sumptu superfluo aut parum necessario diuites onerandos, vt magna pecunia & longis itineribus conquiras remedia, quibus similia tibi sint in promptu. Nam cum ad manum sunt remedia paratu facilia affectui curando idonea, superfluum est vel exotica vel rara vsu disquirere: vt cum parotidas curare possis trahentibus & digerentibus remediis propè infinitis, quorsum attinet in id mustelæ sanguinem quærere? citra quem si nequit curari parotis, remediorum planè inops fuerit medicina, cum præter hunc aliis permultis parotidū auxiliis sit fecundissima. In paratu tamen facilibus delectus quoque est habendus. Nam asini vrinam & similia potui dare in affectibus oris & gargareonis cum Apollonio, extremæ est dementiæ, cum alia sint permulta paratu facilia æquè efficacia: adde

Lib. 6. c. ph. p.

Lib. 6. c. ph. p.

quòd permulti sint, qui mori malint, quàm illam bibere. Absurdissimum etiam est, in oris phlegmonis potiones alias medicas quàm purgatorias dare.

Lib. 6. c. ph. p.

Sic diamoron & diacaryon & similia pauperibus parare potes sine ullo sumptu aut cum minimo: diuitibus verò sumptuosiora fiunt cum casia cortice vel nardo Indica, vel folio malabathri, vel omnibus simul. Inde etià sumptuosa diuitum mulierum Romanarū vnguenta spicatum & foliatum. Item ad potenter digerendum phlegmonas indurescentes, diuitum compositis stomaticis additur costus, amomum, macer, opus Cyrenaicus vel Medus, aut alius: pauperum verò stomaticis digerētibus additur acorus, meon, cardamomum, dictamnus, sinapi, loco illorum sumptuosiorum digerentium.

Ibidem.

*Gal. in ther. ad
Pis. ex li. 2. epi-
demiōn Hipp.
Philopharma-
ci.*

*Misopharma-
ci.*

Lib. 3. method.

& 1. alim.

Eorum etiam qui assumunt in medicamenta naturæ proprietates est inspiciēda: sunt enim nonnulli tam faciliè medicamenta capientes, ut etiam sæpe ea concoquant, & nutrimentum ab his aliquando sentiant, nullum autē incommodum. Alii contrà tam sunt inepti ad medicamenta assumenda, ut iis uti nequeant, quia stomachus ea auersatur, & ante usum faciliè dissolvitur. Vnde veterum præstantissimi optimas medicamentorum compositiones effecerunt, ex singulorum natura compositionis rationē inuenientes, & quæ intensa erant viribus, aliorum mistura remittentes, & simili ratione acria hebetantes, reliquaq; pro affectuum & naturarum differentia observantes, quæ scilicet medicamēta, quibus morbis, & quo morborum tempore convenirent, & quomodò affectis corporibus. & quali victu utentibus, & quo anni tempore. Sic theriacen ex optimis & plurimis multumq; variis medicamentis composuerunt aduersus ferarum noxiarum morsus & venenosa pharmaca, & alios affectus plurimos, quodq; hominum naturas plurimum inuicem differre perpenderēt, ita ut aliud aliū medicamentum sit idoneum.

Lib. 6. c. ph. p.

Si diuitibus paras stomatica coquentia & digerentia, misce amomum quantum crocum, myrrham, alumen: & si vis, horum trium loco solum pone amomum.

In corporibus mulierum & eunuchorum & aliorum molli carne & alba præditorum nec soli assuetorum, caput æstu calfactum refrigerare vehementer non audemus.

In mollibus & delicatis corporibus ulceratis utendum est
medic

medicamentis morfu omnino carentibus : hæc enim vel sine molestia agent, vel saltem nihil nocebunt.

Prædictas indicationes propè omnes diligendis quoque aliis simplicibus miscendis tam sine quibus basis non agat, quàm per quæ melius agit, & postremò à quibus omnia illa conseruantur, applicare oportet, vt omnino tibi persuadeas, nihil rectè ad miscendum vti, nec ad curandum inueniri posse, nisi per indicationes seu scopos, & veluti respectus, vt appellant. In quibus præcipuè sunt ab effectu præter naturam, ab ægri natura, & ab aëre. Has autem in sequentibus vbi minus accuratè expressas leges, ignorantia aut negligentia ne ascripseris, sed eas de industria vel obiter perstringemus, vel etiam silentio præteribimus : quando ad viuum singulas excutere prolixius esset, quàm rei mihi proposito conueniret.

S I N E Q V I B V S.

BAsi medicamenti inuenta & probè constituta, ei sunt addenda alia, sine quibus affectum basis ipsa profligare non potest, & pristino habitui corpus restituere. Sunt autem ea multiplicia, vt mox audies : ferè tamen omnia basim aut ad partem affectam deducunt, aut ipsi commodè ad actionem applicant : nisi basis ipsa per se sit idonea, & multorum simplicium rationem sustineat.

Miscentur ergo quæ tota sua substantia parti sunt familiaria, & ob id dum à parte trahuntur, simul vim medicamenti eò deducunt, vt simplicia cephalica medicamenti vim ad caput secum trahunt, cardiaca ad cor, nephritica ad renes, arthritica ad articulos medicamentum deducunt, quo partis affectus indiget.

Miscentur etiam quæ basim per meatus natura, aut obstructione, aut densitate, aut compressione angustissimos, in partes, si opus est, remotissimas conuehunt sua vel acrimonia, vel essentia tenuitate, vel vtraque, vel accurata tritura. ob id acetum obstructionibus viscerum liberandis miscetur : euphorbium externis intrò penetraturis remediis myrrha aëriæ substantiæ multæ particeps crocum terreum intrò deducit rhabarbarum, asarum, leuissimè teruntur in pollinis modum, cum mouendum est lotium : casia, cinnamomū & similia

tenuissimè trita miscētur vbi menses sunt mouendi: euphorbium, pyretrū & similia, vbi per sumpta medicamenta est ab articulis trahēdum. Contrà sine his basim exhibemus, cūm parti affectæ faciliè & mox occurrit ex partis situ & figura, vt rhabarbarum crassum & negligēter tritum damus, cūm alius tantum mouenda est, non etiam mouendæ vrinæ.

Hæc prædictæ quatuor, familiaritas totius substantiæ, tenuitas, studiosa tritura, acrimonia, vbi ipsius basis vires aut etiam substantiam ad partem affectam deduxerunt, ea vt in affectū agat, tempore eget interdum etiam diuturniore: ob id nonnunquàm basisbus miscentur, quæ ipsas affectæ parti diutius affigant, vt mora saltē ipsæ id perficiāt, quod non possunt obiter præstare: vt medicamētis gulæ & trachæ arteriæ miscemus crassa & lenta, quæ vini medicamēti sarcoticā, collecticam, sinuloticā, si vlcus adest, in parte remorētur & affigant.

Non tamen aut in via, aut illa mora in parte volumus medicamenta coqui, & horum vim à calore nostro euinci, priusquàm & partem affectam attigerint, & vsū optatum præstiterint: ob id opium theriacæ miscetur, & ob alia quædam alibi dicenda.

Medicamentis verò quæ hæere parti alicui volumus siue sumantur, siue admoueantur, ceram, oleum, adipem, vel lentum aliud miscemus, memores tamen eorum quæ rectè sumendis aut admouendis miscentur. Nam ceram sumendis nemo rectè miscuerit, vt neque axungiam, quæ admouendis sunt aptissima, vti ad vlcera gulæ & asperæ arteriæ syrupi, butyrum, oleum, & lentiores succorum, oportunitissimi.

Si tamen vlcera sint putrida in ore, parte calida, humida, ob id ad putredinē paratiore, quia medicamenta his idonea continenter per saliuam elota adhærere nequeūt, validissimis in ipso sic vlcérato medicamentis vti cogimur, qualia sunt caustica, & quæ crustas ferri candentis modo efficiant. Sed in externis partibus causticis per se vtimur: deinde crustas tergentibus auferimus: at in oris vitiis propter partis naturam turpius est causticis miscere tergentia, mel, thus, eruum, irim, aristolochiam, ne ob partis naturam recidiua putredo nascatur. Misyos ergo crudi vel tosti drach. tres cum mellis cyathis sex dissoluantur, vel chalcitis tosta cum melle tanto, vt sordium habeat spissitudinem: vel chalcanthum vsūm cum melle similiter

militer mistum. Sic caninum stercus, cinis hirundinum, & humanum stercus, ana cum melle.

Sic æruginem cum aliis mistam aphthis malignis adhibet Andromachus & Crito ibidem : & arsenicum, & sandaracha, & alumen scissile, oris putredinibus applicantur ibidem.

Eadem ratione malignis vlceribus fedis, intestinorum, vteri, vesicæ, meatus vrinarii similia adhibentur remedia, aliter atque aliter mista & soluta pro variis à parte & affectus magnitudine, & situ indicationibus.

Sed quoniam vsus à medicamentis expectatus præcipue is qui calori aut frigori succedit, non præstatur, nisi medicamenta ipsa actu id sint, quod dicuntur, hoc est, calida vel frigida, calore nostro egent deducente ipsa in actum : vt medicamenta purgantia cum potestate calida sint omnia, vt agant, actu calida esse oportet caloris nostri actione. Eodẽ modo opium & alia frigida vt agant, quod agere nata sunt, in frigiditatem illam suam à calore nostro deducenda sunt : actu enim non magis frigida sentiuntur, quàm alia loco eodem conclusa. Sed tamen vtraque prius accurate sunt terenda, vt ea calor nostro propè tota citius attingat : nam piper, & cætera potestate calida, non fiat actu calidum à nobis sine contritione tenui : nec rhabarbarum aut asarum, & vretica alia vrinæ moueant, nisi diligenter sint comminuta : agaricus item & colocynthis citra contritionem hanc multum sunt noxia, si sumantur. Quam vt promptius recipiant, ille in trochiscos primum formatur : hæc cum aliis siccis teritur & friabilibus.

Nisi item facultates medicamentorum, sine quibus basis ociosa fuerit, in suo vigore consistent (quas color, odor, sapor, consistentia, non solum calor aut frigus significant) vires à composito promissas ne expecta, vt indicabit lib. 4. compositio theriaces. Est tamen quando medicamentum vires simplicium languidiores possit, vt euphorbium vetustate ignauius idemq; flauius : quando pars exactius sentit, cui est applicandum, & affectus vt punctura est clementior. Sic in rha tenuis & aëria substantia, & frigida terrea mutuo sese non impediunt, imò valentioris effecti sunt causæ : quia aërium deducit intro crassam & terream & frigidam substantiam, alioqui per se in superficie hæsuram, nec partes internas contracturam, refrigeraturam, siccaturam.

Lib. 1. c. ph. p.

Lib. 8. simpl.

Miscentur etiā medicamento non modò sine quibus ipsa efficiere id non possit quod promittit, sed sine quibus medicamentum hoc vel illud compositi nomen non habeat : de quibus abundè pòst in forma medicamenti idonei constituenda.

Ea igitur omnia quæ composito miscentur, aut etiam citra missionem, in basi perficiuntur necessario, antequàm ea, quod optamus, in affectum efficiant : illa rationem eius sine quo medicamentū non agat, obtinent, vt basis ipsius coctio, vstio, tritura, lotio, & alia permulta, quæ in singulis apparent compositionibus. Item quæ glutinosius, liquidius, crassius, tenuius, acrius, mitius medicamentum reddunt, quando harum qualitatum aliqua est opus ad actionem optatam. Item quæ partibus familiaria ad eas vim vel etiam sæpe substantiam medicamenti alterantis, roborantis, vacuantis deducūt. Quando medicamentū agit in propinquam sibi materiam, in longinquam non acturum, aut tam imbecilliter, vt nullus inde successus esset sperandus. Prætereà quæ sumptum vel admotum medicamentū tam iucundum faciunt omnibus suis qualitatibus ægro, vt id ipse non inuitus accipiat, neq; eo assumpto nauseat, & inde vomat. Si enim vomat, nullus est huius medicamenti vsus, vt neque si admota præ morsu & dolore, aut alia de causa mox æger illa abiicere cogatur : nisi forte vomitu illo fiat fluxionis auersio, & excrementosum aliquid etiam ex ventriculo simul elidatur. Adhæc quæ humorum coctionem iuuant, quæ excrementa vacuationi apparant, quæ meatus aperiunt, per quos medicamento via est futura, atque etiam excremento, illa etiam rationem eius obtinent, sine quo medicamentum nihil agat.

Adhæc virium robur quantū est necessarium medicamentum ad actionem mutando & sensus tactus, eodem pertinent. Quapropter apoplecticis, dissolutis, hysteris remedia quantumvis morbo & eius causæ idonea dentur vel applicentur, cassa sunt, aut parū secuta : sæpe motus, sæpe venter plenior causa est vacuationis tum celerioris, tum largioris : sæpe quies retineri in ventriculo, sæpe ventris inanitio coqui medicamentū cogit, præsertim si erat clementius : sæpe item corporis situs ac figura ex deiectorio vomitoriū effecit, & contrà.

Cessatio quoque à vacuationibus aliis causa sæpe est per accidens huius vel huius vacuationis. Nam si in diabete des
medioc

mediocriter aluum mouentia, illa etiam ad vias vreticas trahuntur: vt si in lienteria, diarrhœa, dysenteria des vretica, vel hydrotica, vel quæ viscera respiciunt, sæpe aliorum impetu illa per sedem detrahuntur. Per accidens quoque voluntas nostra sæpe rationē eius sine quo non fit medicamenti actio, habet: vt si quis aluo à medicamento irritata, naturæ impetui non seruiat, sed aluum cohibeat: fit sæpe, vt aluus postea non descendat.

Non modò autem quæ ante medicamentum sumuntur, vt ei materiam apparent, sed etiam quæ post recipiuntur, sæpe actionem medicamenti obrutam excitant, sæpe ad medicamenti expulsionem naturam irritant. Vt sumpto purgante medicamento si quis diutius à cibo abstinet, sæpe nihil mouet: si tempore post legitimo cibum sumat, hoc recreata natura medicamentum expellit.

Infinita propè alia inuenias in compositis medicamentis, sine quibus illa nihil omnino agant, aut tam parum agant, vt nihil egisse videri possint. Eadem verò, cum sint imbecilliora impedimenta, vt melius operetur medicamentum, aut etiam si omnino absint, per accidens his accenseri possunt, per quæ melior fit medicamenti actio. De quibus dicere iam tempestiuum fuerit.

P E R Q V A E M E L I V S.

Tertio loco medicamentis certa methodo componendis deligenda sunt & miscenda, quæ ipsius basis & aliorū, sine quibus basis non agat, actionem reddant meliorem, perfectiorem, efficaciorē, salubriorem, tutiorem: celeriorē, si celeritate opus est: aut tardiorē, si tarditas optanda est, qualia sunt vstiones, ablutiones, triturae, & quæ basis ipsius aut aliorum vim corrigunt, valentiorē minuendo, imbecilliorē augendo, noxiam corpori emendando. Item quæ coloris, odoris, saporis, consistentiæ gratiam ægro iucundā medicamentis conciliant.

De horum autem quibusdam prius est dictum, de aliis exempla aliquot proponamus non inutilia lectori. Valentiorē vim minuunt per se quidem quæ basi aut prædictis sunt contraria, vel tota substantia, aut sola qualitate manifesta, aut vtraque, vt scammonio calido, tenui visceribus noxio

vires dissoluenti, pruna dactyli, succus rosarum frigida, crassæ essentia, partium substantiam cogendo, roborantia, miscetur in antidotis catharticis. Sic valenter calidis opium, semen hyoscyami, cortex radice mādregoræ, & similia miscemus, ut illorum vehementiā obtundamus: præterea ut sensu per hæc frigida stupefacto dolorē sedemus: sic vehementer astringenti minimū astringens miscemus, cum mediocri astringitione opus est: vel vehementer digerenti minimū digerēs, cum moderate resoluendū est: in aliis ad portionē. Per accidēs vero vim aliorum remittūt, quæ partis naturæ sunt familiaria, eamq; aut tota substantia, aut qualitate, aut utraq; contra noxam à medicamento imminentē roborant & muniunt. Vim etiā minuunt, quæ tenuibus crassitiem, celerioribus tarditatem, rarioribus densitatem, leuioribus grauitatem addūt: nisi à crassitie, tarditate, densitate, grauitate vehemens actio proficiatur. Est enim quando horum actio est optatior.

Lib. 1. c. ph. p.

Sic sulfuris valenter calidi & digerentis vim pari cimolia terra frangit in achoribus Apollonius, & ex ambobus compositum ad symmetriam medicamentum reducit. Addit & acetum incidens, tenuans, digerens, repellens.

Sic medicamentis ad affectus internarū partiū penetraturis ea miscemus, quæ penetrare in altū faciant, etiā affectum non iunantia, ut acetum in phrenitide, quod neq; mitigat dolorem, neque laxat tensionem. Et quia medicamentorū affectui aptorum virtus in altum penetrando dissoluitur, sæpe affectus ab his præsidium non sentit, nisi niila sint medicamenta valentissima. Contrā in affectibus superficialiis, utpote quibus occurrunt medicamenta viribus integris, satius tamen fuerit miscere, quæ tum medicamēti vim intrō ad penitiora deducant, tum affectui ex sua natura auxiliētur, & sint tenuiū partiū, ut acetū in calidis dispositionibus, euphorbiū in frigidis. Cuius utriusque virtus vehemens dissoluitur, & corpora permeando & alterius mistura, ut rosacei cum aceto in capitis interno dolore, nisi vlcus adsit in sincipite, cui vis applicare. Sic vstio metallicis tenuitatem essentia, acrimoniam & vires auget, lotio acrimoniam & vires eas minuit, tenuitatem retinet. Sic aloë non lota magis purgat, minus roborat, lota minus soluit, magis roborat.

Lib. 7. meth.

Quæ verò actionis vehementiā remittunt, eā nō aboleant, neque

neq; qualitibus cōtrariis, neq; tota substātia contraria : quomodo theriace sumpta medicamēti purgātis vim & actionē abolet: quomodo magnes alio cōfrictus ferrum à se abigit, non attrahit : succinū oleo maceratū paleas non attrahit, sed eas etiā oleo imbutas à se repellit, antipathēa rerum & occulta naturarum contrarietate, vt antē diximus.

Virtutem imbecillam augent ac excitant medicamento, quę illi imbecillo robur, tardiori celeritatem, crassiori tenuitatem, denso raritatem, graui leuitatem, insipido acrimoniā, aut falsuginem, aut amaritudinem, adiiciunt, si qualitibus illis est opus: si contrariis. quę contrarias afferūt: vt vltio terreis & metallicis vires addit, & celeritatem, tenuitatem, leuitatem, raritatem, acrimoniam. Vsta enim omnia essentiaē tenuitatem acquirunt & acrimoniam, excepta chalciti.

Lib. 10. simpl.

Ruta & ramus salicis & cortices ei⁹ arteriacis quibsdā inter parandū mouēdis, siccata abiiciūtur, noua substituūtur, vt in diachalciteos ramus palmę præscinditur sepe, li. 1. cōp. ph. g.

Lib. 9. c. ph. p.

Quę partem roborant, medicamentis miscentur: vt hieræpicræ, mastiche, crocus, & alia aliis plurimis. Crocus idem linteo puro ligatus incoquitur, expressus abiicitur & arteriacis, lib. 9. comp. ph. part.

Hodie Arabum sectatores turbith iungunt zingiber, tanquam eius calcar : agarico salem fossitium (gemmeum vocant) & stœchadem, si ad caput ferri volunt. Scammonio cor lædenti ambram cor ipsum roborantem : cristallum, refrigerantem inflammati: gallam astringentem aperienti eidem ora venarum: spicam item, mastichen, tragacāthum, caphuram vna ratione vel duabus.

Vim medicamenti noxiam corpori, & etiam deleteriam emendamus, vt cantharidibus per se & suæ naturæ contrarietate vesicam vlcerantibus miscemus alia, quę vim earum exedentem corrigunt: vretica tamen si vrinam cieri affectus requirit, & ceratum eisdem miscemus, aut emplastrum idoneum ad vngues *ψαλῶδες*

Lib. 11. simpl.

Sic elleboro nigro humanæ naturæ contrariā vim emendat Hippocrates misto anisi, dauci, seseleos, cumini semine odoro simul & esculento.

Li. 1. rat. vict. acu.

Sic mel veteres, hodie magis saccharum medicamētis sumendis miscemus, linguā & os prius vino interdū abluimus,

& cyathi tam fundo quàm labris iucūda sapore & odore mīscemus, & os sumpto pharmaco abluimus, aut delicato cōdimento recreamus, ne tristato illi consentiens stomachus subuertatur, & ad vomendum ventriculū incitet. Sic catapotia foliis auri interdum tegimus, interdum saccharo & aliis.

Lib. 7. meth.

Nec omittenda est cuiusq; temperamentis proprietas, quæ ut in alimentis, sic etiam in medicamentis vim habet magnā, ut non modò expendamus an hoc illud medicamentū partis & totius temperaturā vel eandem vel diuersam feruet, (quomodo Galenus docet in medicamentis vlcerum lib. 3. 4. methodi) sed quomodo se habet ad medicamenta hæc vel illa. Quædam enim naturæ clysteribus etiam malo suo necessariis omnino sunt abstinendæ, cū ab his sentiant sæpe mulieres mox vterinos affectus, aliæ à potionibus medicis, quædam à catapotis, aliæ à bolis purgantibus, aliæ ab aliis omnino abhorrent, vel ob naturæ suæ cum his cōtrarietatem, vel opinione aliqua id persuasæ, vel quia iis vsæ malè habuerūt. Ob id rogandus quisque est, siquādo purgatus est, & qua purgatorii medicamenti forma præcipuè delectetur.

*Gal. in natura
humæ.*

Ut melior fiat medicamenti actio, miscentur quæ ipsum gratius reddant colore, odore, sapore, consistentia, siue fumen dum est, siue admouendū, nisi quòd in admouēdo saporis minima ratio est habēda, nisi quatenus illi cum odore cōuenit. Sumenda autē si quatuor dictis dotibus sint iucunda, & præterea pauca, ventriculus trahit promptius, comprehenditq;: actu etiam calida citius reddit, aut frigida, si talia erant potestate, & si refrigerandū est: ob id & celerius & valētius agūt. Si quo horum autem fuerint ingrata, non comprehenduntur, non retinētur, sed ventriculū euertunt, & vomuntur mox, aut deiiciuntur sine actione, uti & alimenta quāuis meliora, quia tamē ingrata sunt, non comprehenduntur à ventriculo, nec ob id coquuntur. Cū autem suum cuique sit iucundum vel consuetudine, vel imaginatione, vel tota substantia, & horum quodque solā experientia noscatur, rogādus quisq; est, quo medicamenti sumendi aut etiam admouendi crassamento, colore, odore, & in illo etiam sapore delectatur.

Aph. 38. lib. 2.

COLOR.

Propterea daturi medicamenta vel foliis auri tegimus, vel vase argenteo, stanneo'ue, aut alia constante materia non transp

transparente includimus, oris angusti, idq; in tenebroso aëre propinamus: ob id etiam inuenta emplastra melina, id est, rufa, & coloris cydoniorum, ex vsta ærugine docet Galenus, quia ex ærugine cruda viridia quosdam terrent: sic cauteria maximè occultamus, præsertim meticulosi: & scalpello venas aut arterias secturi, aut hæmatophobis his faciem velamus, aut alio torquemus.

Vt emplastrum ex lithargyro sit albius, deligit Galenus oleum purius & lucidius, & aquā puram & candidā, quæ cum lithargyro in mortario temperat, deinde igni ex lignis peruræ coëptis vel perustis antè carbonibus exactè incensis coquit in aëre syncero, sub dio, in sole. Oleum autem crassum, aqua turbida, aër nubilus, umbra, fumus, medicamento facilè nigredinem conciliat. Quòd si primus iste focus coctionem nō absoluit, in alium similiter ardentem cacabus transferatur.

In his quæ forbitionibus mista ventrem solvunt, nonnihil præsidii est, nisi ob amarorem, vel asperitatem, aut multitudinem, aut colorem, aut suspicionem aliquam omnino fuerint ingrata. Multitudinē non sine causa adiecit, quæ etiam alimēta facit ingratiora, non ægris solis, sed etiam sanis: cum alimenta minus larga avidius deuorentur, quàm largiora.

Ob id ægris cibos auersantibus alimentum parcius est offerendum, multo magis medicamentum. Quapropter cum largius purgandum, efficaciora sumimus, si nihil repugnet, ne magna remedii imbecillioris copia opus sit. Sic puluerem hieræ diacolocynthidos, & alterius cuiusvis potius damus catapotiiis aut aliter, quàm ipsam hieram melle exceptam, nisi res alia aliud suadeat. Sic cum purgatoria infundimus liquori idoneo, paruam porionē imperamus, ne copia largiore ægrum à deglutiendo deterreat, neue ea si semel sit deuorata, citius & valentius stomachum evertat.

Melina (vt paulò antè dixi) fuit vnguēta, id est, mali coto-nei colore, cocta mediocriter seu vsta ærugine: quia color hic est gravior, neq; terret egros, vt sepe viridis ab ærugine cruda. Cerussa quoque quibusdam vnguentis additur ad coloris albi gratiam.

Huc pertinet quòd quæ simplicia coloris propè expertia sunt, vt aqua, tunica cornea, colores omnes optinè recipiunt: vt inodora (qualis est balanus myrsefica) omnib⁹ suscipiēdis odorib⁹

Lib. 2. c. ph. p.

Lib. 1. c. ph. g.
Nota ad coctiones medicamentorum.

Li. 2. rat. vult. acu. Hipp.

Lib. 2. c. ph. g.

Lib. 6. simpl.

Lib. 2. aliment.

odoribus aptissima: & insipida, vt cucurbita, saporibus omnibus recipiendis sunt appositissima.

O D O R.

Quantum odoris gratia in medicamentis tam sumendis quam adinouendis valeat, docent abundè Medicorū omnium libri. Ob id enim Cleopatras Medicus ad capillos in capite gignendos succo radicis arūdinis, muscis vstis, adipi vrsino, oleo cedrino, vīnū aut passum affundebat, vt odor obtunderetur.

Lib. 1. c. ph. p.

ib. e. m.

Sic pilos tenuantibus scilicet, tergentibus, vt nitro, ossi sepia, pumici odorata miscet Galen. lib. 1. comp. ph. part. cyperum, schœnu anthos, melilotum, rosas siccas, iridem Illyricam, herbam cydoniam, melissophyllon: & si opulenti paraspicam nardi, Indicam & Gallicam & mōtanam, terram Erethriadem, malabathrum, folium malabathri, amomum, myrrham, crocum, costum, mentham. Crito ibidem etiam psilothra suauem habere odorem volebat.

Nec te moueat, quòd amomum, & alia quædam similia diuitum compositionibus addi legis, nonnunquā pauperum. Illis enim largiū, his parciū immisceri intellige.

Ibidem.

Ibidem.

Lib. 5. c. ph. p.

Lib. 7. c. ph. p.

Vrina licet achoribus sanandis conueniat, quia tamen est odore ingrato abominabilis, non vtenda est. Ad odoris gratiam cyperus additur capillos tenuantibus. Sic odorum dentifricium facit Galenus miscendo casia aut amomi drach. duas mediocribus: cinamomi autem drach. vnam regibus.

Bechicis adduntur semina petroselini, apij, dauci, se seleos, vt aliorum medicamentorum insuauitatem suo odore grato & sapore emendent, & frigidorum vires obtundunt, vt etiam urinas prouocent.

Odorem cuique iucundum medicamentis addendum declarant emplastra *ἰωδία* i. sua uolentia, vt intelligas non sumendis solis, sed etiam adinouendis medicamentis odorem gratum esse conciliandum. Cū medicamenta omnia, præsertim purgantia, ventriculum, & præcipuè stomachum nervosam eius partem & maxime sensilem lædant, his odorifera sunt miscenda, quæ noxam eorum obtundant, actionem vero non impediant: quæ prætereà tenuent crassos succos, incendant, tergeant, vias aperiant, per quas est vacuandum.

Quæ qualitates habent odoras, misceri debēt stomachicis,

vt aro-

Gal. lib. 9. quos
purg. oportet.

vt aromata & femina quædam etiam esculenta, anisum, daucum, fefeli, cuminum, quæ etiam Hippocrates miscet peplio & veratro nigro, per id pleuritidem sub diaphragmate purgaturus, ut medicamentosum quod in eo est humanæ naturæ contrarium, mitigetur & obtundatur. Nam vt fœtida omnia stomachum subuertere solent, sic odora roborare. Quòd si non modò odora sint, sed etiam esculenta, multipliciter iuant stomachum malis humoribus subuersum, vt idem de vtero & vterinis remedijs tibi persuadeas.

Abinthium aqua feruente tingendum, quò minùs odore offendet, postea oleo incoquendum ad ventris fluentis fomentum, si modò vacuatio ampliùs non duret.

Sic nostra casia tanquàm cinamomo quæ sumuntur omnia aromatizamus, aut alio odoramento naturæ ventriculi & partium aliarum principum familiari.

Odore enim iucundo fit, vt non modò iucundius fit medicamentum, sed etiam eo odore spiritus animalis & vitalis reficiuntur, vt alimentorum sic medicamentorum. Quò fit, vt li pothymia languentibus caryophyllum, nux moschata, zingiber, & alia id genus animum mox reuocent, vti odor panis, aceti, vini, & similia. Nam odore vires celerrimè reficiuntur, secundo loco potu, postremo cibo.

Quam rem persuasi omnes graueolentia fugimus tam sani quàm ægri. ceu naturæ nostræ contraria, tametsi omnia id genus naturam nostram non lædere ostendat castorium odore abominabili, sed quod nec sumptum nec admotum cuiquam vnquam nocuit.

S A P O R.

Saporum iucunditas cuique hominum naturæ sua magni est momenti, vt non modò alimentum sit salubre, sed etiam vt medicamentum sumptum sit efficax. Ob id rogandus quisque est medicamentum sumpturus, qua maximè saporis differentia delectetur. Sunt enim qui austeris, alij acidis, alij dulcibus, sunt qui salis & amaris ducuntur, nonnullos acria delectant. Hunc igitur saporem medicamento insigniorem dabitur, quo æger præter cæteros delectatur, nisi eius vis affectum nobis curandum insigniter sit auctura. Nam saporis calidos salsum, amarum, acrem in affectibus multum calidis non probauero: vt neque frigidos acerbum, austerum, acidum

Lib. 8. method.

*Aph. 18. lib. 2.
Li. 11. sim.*

Lib. 6. c. pl. p.

dum in frigidis. Cur autem non odore modò, sed etiam sapore suauius esse debeant alimenta, docet Galenus Aph. 38. lib. 2. Paulò deterior cibus aut potus, suauior tamen, melioribus & minùs suauibus est præferendus. Medicamenta verò iucunda esse quatenus licet, debent, vt à ventriculo comprehensa in actum reducantur, ac ne nausæ, flatus, fluctuationes ex insuauitate ipsa pariant, adeò vt citò suprà aut infrà vètricus excernat. Sic qui primus stomaticum diamoron composuit, cum melle coxit, vt & gratius esset, & diutius seruari posset. Præstantior enim est succus mororum per se incipienti oris phlegmonæ, sed gratior & perseverantior cū melle coctus. Nam citra coctionem etiam cum melle repositus citò corrumpitur: coctus autem cum melle non modò diu seruat, sed etiam vtilius fit sequentibus phlegmones temporibus, in cremento, statui, & declinationi, ad perfectam vsq; curationē.

In omnibus autem oris affectibus medicamenti suauitatem cuiusque palato gratam sumere non satis est, nisi ea visceribus ori per gulam & guttur communicantibus etiam innoxia sint. Quæ considerans qui primus diamoron composuit stomaticum medicamentum, succum mororum cum melle coxit, vt scilicet gratius esset, & toto anno seruatum in promptu esset, quoties vtendi occasio incideret, non solum tempore mororum.

Opulenti item & delicatis viris & mulieribus, & malo natura stomacho præditis, stomatica simplicia sunt gratiora medicamentosis, vt quod ex succo solorum mororum fit, quod omnium est maximè imbecillum: ex succo enim batinorum est valentius: hoc item potentius ex succo corticis nucum viridium cocto cum melle, licet non sit acerbus gustu, vehementissimè tamen astringit, vt succus ex granatis acerbis cum corio tufis expressus. ex dulcibus autem sine cortice expressus est suauior sed imbecillior, cum cortice valentior sed insuauior. Ex tribus autem generibus simul tufis addito glycyrrhizæ succo, bonus est, nec immodicè exasperat. In his igitur vide, ne suauitas vires quæ sitas obscurat.

Eadem saporis gratia vinum phalerum acre laudatissimum mithridatio & theriacæ miscendum, vt amarorum in his antidotis multorum iniucunditatem tegat, docet Galenus lib. antidotorum. Sic Hipocrates veratro nigro daucum, vel

vel fefeli, vel cuminum, vel anifum: peplio filphij succum mifcet, vel aliud quidpiam non folum odoris iucundi, fed etiam faporis, quem fub odore intelligere non eft difficile, cum horum duorum fenforia fint fubftantia, fitu actione proxima, & in plerifq; actionibus communia. His enim condimentis medicamenti purgantis infuauitas corrigitur fic, vt in ventriculo diutius morari poffit. Multa enim pharmaca potanti tam funt infuauia, vt ftomachum peruertant, & vomitum protinus cieant. Alia licet paululum in ventriculo manere poffint, prauos tamen ructus mouent, & poffit euomuntur.

Sapor igitur cuique iucundus quoad eius fieri poteft feruat in fumendis omnibus, vt alimentis, in quibus vt domini gulæ & palato coquus feruit: fic in fumendis omnibus per os medicamenti fide alterent tantum, fide humores apparent incidendo, tenuando, tergendendo, fide humorem aliquem qualitate moleftantem purgent, fide partes ipfas roborent totius fubftantiæ fimilitudine, vel aftrictione, vel alia qualitate manifefta intemperaturæ partis contraria, fide ore retineantur, fide etiam deuorentur.

Cuique iucundus fapor nobis dicitur, quod ne vinum quidem homini familiariffimum alimētum omnes idem iuat, fed hunc dilutius, alterum meracius: fic nec oxymeli omnibus eadem aceti mellis & aque menfura coquendum, fed pro cuiusque voluptate, quanquam plurimis naturis commune vnū fcribi poteft, quale quod à Galeno ibi defcribitur, non tamen omnibus: fic in diacalaminthe fi mellis plus inieceris, pluribus iucundius facit: his tamen qui dulcia auerfantur (funt enim quædam talis naturæ) iniucundum. Fiat igitur medicamentum cuiusque naturæ iucundiffimum, quoad eius fieri poteft, fed tamen virium eius vtilitate feruata: hanc enim folui nolo, dum dulcedini & iucunditati ftudetur. Ob id rogandus quisque eft æger ante medicamenti compofitionem, quo fapore[& fi vis, qua forma medicamenti] maxime delectetur.

C O N S I S T E N T I A.

Crassa confiftentia medicamenta ægrius & in corpus penetrant & deuorantur, quam tenui & liquida, vt cibo quam potu impleri eft difficilior. ob id crassa effe folent ingratiore & naufcabunda magis. Quæ caufa eft, cur bolos catharticos, vt vocamus, liquore aliquo fuauiffimo diffoluere non raro cogamur,

*Lib. 2. rat
uict. aciv.
Gal. in natura
huma.*

*Lib. 4. sanit.
tuendæ. in oxy-
melite.*

*Lib. 4. sanit.
tuendæ in dia-
calaminthe.*

Lib. 6. c. ph. p.

Aph. II. lib. 2.

mur, qualia adhuc sunt ingratiore, quàm quæ liquidiora sunt & perspicua. Quæ propter colo panneo & albuminibus purgare solemus. talia sunt nostra apozemata, zulapia, serapia, & quæ in rem præsentem coquimus aut infundimus medicamenta vel purgantia, vel aliter corpori profutura. Ob id mel aqua exigua liquatur, ut poros cutis obstructos ingredi ad detergendum possit.

Lib. 8. method.

*Lib. 7. c. ph. p.
ad finem.*

Sic dum asthma & orthopnoea sunt ab humore crasso & lento, vel purè in asperæ arteriæ meatibus vel pulmonum cavernulis infarto, tenuantibus, tergentibus, & humiditate copiosiore, ut potu vini largiore opus est, quod crassus humor & lentus seu liquidior redditus, sursum per tusses à tergentibus excitatus, egeratur. Si verò abscessus adest, vino paucopius, ob id siccantia esse incommoda reddendis ex thorace ac pulmone excreationibus docet Gal. Est quando consistentia non ad gratiam tantum, sed ad melius agendum est. Lad-

*Li. 5. simp.
cap. 21.*

Lib. 1. c. ph. p.

anum enim quia ceræ consistentia est simile, humiditatem requirit, quæ liquidius ipsum faciat: vires tamen eius non minuat, imò potius augeat, cum fluentem capillum per id sistere consilium est. Liquidum igitur fiat in vase duplici, ex vino austero & oleo myrteo maceratum: vel solvatur oleo lentiscino, vel mastichino, vel myrteo, & si ætas & aer frigida sunt, nardino, vel vino veteri & austero. Quæ omnia adstringendi viribus cum ladanum conveniunt, & calore alimentum pilis atrahente: Hispanum verò & omphacinum oleum solum adstringunt: vetus sabinum, rinciniū solum digerunt, ergo horum neutrum per se convenit, sed priorum loco misceri ambo simul possunt. Item ladanum liquidius tonsis tantum capillis adhibemus, crassius rasis, ut illos penetret, his hæreat, addito quoque polytricho fiet efficacius ad pilorum productionem. In his autem oleum & vinum etiam rationem habet eius, sine quo ladanum nec applicari, nec agere possit. Medicamentis quoque capillos fluentes sistentibus, nisi sint essentia tenui, adduntur alia, quæ tenuitate essentiae intrò penetrantia cutem quoque in alto adusque pilorum radices alterent, neque per summa tantum agant.

Lib. 6. c. ph. p.

Consistentia mediocris qualis est mellis Attici, aut fordium auris in stomaticis, ut in diamoro, & similis crassitudo in stomachicis, ut in diacydonio.

Consist

Consistentia etiam parua linimentis, maior vnguentis & ceratis, durissima emplastris. Quapropter his cera nunc par-
 cior nunc largior, & lithargyros additur ad corpus & materiam præbendam. Sic oleo ex semine abietis, vel floribus
 populi nigræ, & anethino, & chamæmelino, sampsychino, & similibus ceram & refinam addit Gal. vbi diutius vult super
 vncto corpore manere.

Magna humoris & eius tepidi quantitas in vomitoriis est
 efficacior, præsertim si oleagina addantur, & diebus aliquot
 sint præsumpta incidentia tergentia.

Crassa vt metallica, terrea vrendo fiunt tenuiora, & sic aptiora ad penetrandum.

Dia *ναρόν* ob essentiae tenuitatem efficacius stomaticum
 quàm dia *μώγων*. Penicillus, purpura marina, præsertim opti-
 ma Tyria tinctus, tenuiorem astringendi vim habet, qua altè
 penetrando corpora quæ sunt circa ventriculum siccet ac ro-
 boret, & calfaciat, si calida illi misceantur.

Acetum essentiae tenuitate in altum educit medicamen-
 torum aliorum vium, cùm præsertim retrigerandum est: vt
 euphorbium, quando est calfaciendum.

Mastiche tusa oleo nardino mista ad sordium crassitudinẽ
 fit, quo penicillus purpureus madefactus stomacho imbecillo
 imponatur. Et hæc de tenui, duplici sicco & liquido.

Con.rà est, quando crassities optatior est, vt in vlceribus
 asperæ arteriæ, aut œsophagi crassa sint & lenta quæ adhi-
 bentur medicamenta oportet vlceri idonea, cum gummi ta-
 men & tragacantha vel similibus, quæ suo lentore medica-
 mentum affectæ parti diutius affigant. Crassitudine etiam
 mediocri stomatica & stomachica esse cõponenda paulò antè
 probauimus. Sic in vlceribus intestinorum, vesicæ, vteri.

Sic in alopecia, vbi olei laurini libræ vni Romanæ miscui-
 sti thapsiæ, aut si valentius vis, euphorbii: si infirmius, sinapi
 & nasturcii partem duodecimam, hoc est, vnciam vnam: si
 facilè à capite raso defluxurum tibi videbitur medicamen-
 tum, adde ceræ momentum, vt vnciam vnam.

In nocturnis venereorum imaginibus crassioris substan-
 tiæ vnctiones seu cerata quibusdam compono, ne facilè à cor-
 pore defluant.

Piper, zingiber, baccas iuniperi, mastichen, & alia quædam
 o integra

integra deuoramus, cùm ventriculū calfacere citra hepatis calidi noxam volumus. Si autē hepar & longinquas partes calfacere studiū est, vel aliter medicamēto tentare, non modo ea læuissimè trita sumimus, sed etiam liquori mista tenuissimo.

Huc pertinet, quòd quædam medicamētis inspissandis adduntur, quæ viribus eorū nec obfunt nec profunt, sed materiæ tantum & corporis rationem obtinēt, vt lithargyros emplasticeis, & cera iisdem ac vnguentis, ceratis, linimentis.

Lib. 9. simpl.

Quanquàm & lithargyros ceu materia misceatur his quæ valentem habent facultatem mordicantem vel astringentem, & cera liquabilibus medicamentis etiam ceu materia, quia etiam ipsa quodammodo media est eorum, quæ valentem habent facultatem.

Lib. 6. c. ph. p.

Nonnunquàm tenuitas & crassities actionem & suam & aliorum iuuant: vt diamoro addita crocus & myrrha, præterquàm quòd phlegmonas oris coquunt, & ille repellit, hæc suo calore abundè digerit eadem in altum corpus inflammatum essentia suæ tenuitate subiens simul croci minus substantia tenuis, & reliquorum vires secum trahit, ac phlegmonem in altum vsque sanat, ac citò ad cutim recurrendo, secum quæ in alto sunt à se renuata educit. Crocus verò & succus mororum vicissim contrahendo myrrham intro impellit, & eius ad cutim reditus celeritatem præproperam inhibet. Ob hæc virtus diamori longius peruenit deductis altius à myrrha astringentibus: hac autē myrrha ab astringentibus impulsu mororum succo, croco, succo rhois, omphacio, rosis siccis, balaustio, malicorio, galla immatura, hypocisthide, & cæteris astringentibus vim deleteriam non habentibus. prædicta enim miscentur, cùm vis diamori validior est facienda. Quo loco tenuia & crassa tanquàm dare operas mutuas videntur, & alterum alterius actionem reddere meliorem.

Lib. 6. c. ph. p.

Præparatio item quædam per trituram, cribraturam, vstionem, lotionē, in plerisque vt meliora sint, magni est momenti, & etiam ordo miscendi: vt si phlegmone induruit, medicamenta potentius digerentia probè trita & tenuissimè cribrata sint miscenda, vt costus, macer, amomū, cardamomum, pyrethrum, acorum, meon, dictamnus, succus Cyrenaicus vel Medicus. Sunt autem iniicienda, cùm medicamentum propè omnino coctum erit, aut etiam absolutè coctum.

Medicam

Medicamenta componendo apta exactè sunt elaboranda, ut facilius corporis meatus subeant, ob quem transitum celerem si calida sunt sine morfu munere suo funguntur : si frigida, celerius expectatum opus præstant.

Alcyonia utraque amygdalas amaras totas cum corticibus vstas & nitrum crematum alopecie adhibet Gal. ut tenuiorum sint partium, & ob id ad iniam cutim vsque pilorum radices penetrent. Lib. 1. c. ph. p.

Medicamenta quæ per venarum oscula promptè subire volumus, & in omnem corporis partem digeri & ferri (qualia quæ sudores, vrinas, menses mouent, obstructions liberant hepatis, lienis, renum, corporis habitus) illa sunt curiosè terenda, & tenui cribro cribranda, ut prorsus sint tenuissima. Sic Galenus calaminthen, pulegium, thymum, petroselinum, fefeli, libysticum, semen apii, piper graue simul tinsa subtili cribro creta miscet compositioni diacalaminthe, ad vacuandum humores acres in tota carne cessantes. Lib. 4. sanitat. tuen. in diacalaminthe.

Sic ibidem nitrum, cuminum, rutam, piper tenuissimum & minutissimum facere docet, cum vrinas multas mouere consilium est : crassius verò id faciendum, quoties per id aluus est deicienda, ac huius præcepti in omnium medicamentorum compositione meminisse expedit. Sic hodie nos rhabbarum negligenter terimus, cum aluus per id ducenda est : curiosè verò tritum damus vrinas moturi.

Aromata sunt miscenda ad finem coctionis, aut ea iam absoluta, cum vas ab igne deposueris, quòd largior ipforum coctio aromaticis medicamentis vires adimit : contra verò lithargyros, molybdæna, & alia multa metallica coquendo meliora redduntur. Lib. 6. c. ph. p.

Succis stomaticis crassis mel statim ab initio est miscendum, si liquidiores sint, ut succus nucum : percoqui debent antequàm mel additur. nam coctione tam longa vstum amaricaret. Lib. 6. c. ph. p.

Multò plura de his quæ ad medicamentorum præparationem pertinent, leges libro tertio. Quæ hic adscribere non est visum, ne idem bis dictum quisquam calumniatur, nulla neque vtilitate neque necessitate.

Est quando acris & mordens qualitas expetitur, ut in balanis & clysteribus per mel, saccharum rubrum, hieram picram,

mercurialem, sales, id genus alia.

Neque basibus ipsis solum addenda, quæ ipsam ad partem sibi familiarem deducant, sed etiam quæ ipsam in ea parte remorentur, vt si in hepate medicamentum morari diutius volo, semen raphani stomacho gratum ei misceo, quod medicamentum distribui festinans retrahat & remoretur. Additur & multis opium, quod vires medicamenti per corpus distributi tot coctionibus resolui prohibeat, aliis ad sensus stuporem in vehementissimis doloribus.

An verò multa medicamenta eadem facultate prædita misceri debeant, tanquàm compositum melius redditura, ambigi potest, cum frustra fiat pluribus, quod paucioribus perfici potest: tamen causæ quædam nonnunquam incidunt, vt docuimus, quæ nos ad id faciendum compellunt, nec factum hoc nostrum caret veterum imitatione: nam Galenus in compositione medicamentorum secundum partes idem pollentia sæpe miscet, vt ad diuturnam & curatu difficilem alopeciam simplicia eiusdem facultatis euphorbium, thapsia, sulfur viuum, elleborus alteruter cum oleo laurino, aut cicino, aut veteri miscentur.

Lib. 1.

Lib. 2.

Ibidem.

Lib. 6.

Ibidem.

Ibidem.

Lib. 3. ad finem.

Ibidem.

Opobalsamum, peucedanum, castorium & simul & priuatim seorsumq; singula in veteri capitis dolore cum oleo & aceto miscet Archigenes apud eundem, nec reprehenditur. Viticem, mentham, amygdala amara, iridem, ana cum aceto & rosaceo.

In stomatico diuitum costi, amomi, maceris, opi Cyrenaici vel Medici, vel alterius: pauperum verò, dictamni, cardamomi, mei, acori, sinapi, duorum, trium, vel omnium quantum voles mensuram, modo sint tantum horum drach. tres, aut drach. quatuor & dimidia, pro libra mellis. Si autem quatuor aut quinque drachm. miscueris, digerens magis reddis medicamentum.

Diamoro & aliis stomaticis diuitum miscere potes vel corticis casia, vel nardi Indicæ, vel folii malabathri. vel omnium trium ana drach. vnam, vel drach. vnam & dimidiam. Pro omphacio succus rhois, vel æqualis vtriusque portio diamoro miscetur. Chalcirion, misy, chalcanthum simul miscet Andromachus apud Galenum. Adipes leonis, pardalis, hyenæ, anseris, vrsi propè eadem facultate præditos, si habes, omnes

omnes simul miscere oportet, & ad horum partem vnam euphorbii vel thapsiæ partem duodecimam, vel vtriusque ana partem duodecimam, tuncq; fit valentius.

Seminis erucæ, & nasturtii, & nitri ana miscet Heras ibidē.

Medicamento stomatico dia gleucus miscet heminas tres *Lib. 6. c. ph. p.*
 rhus coriarii, vel culinaris, aut amborum simul ana heminam vnam & dimidiam, & etiam paulò amplius: & addit astringentia, si principium est fluxionis: digerentia, si declinatio morbi ex fluxione nati. Quòd si vnicum habes vel astringens vel digerens simplex medicamentum, illius quantitatem auge, vt expleat, quod ab omnibus colligebatur. Quin ipsi dia gleucus & diacaryo omnia immittere licet initio quidem astringentia, vt gallam immaturam, furculos molles rubi, vel canis rubi, vel corni, mespili, forbi, & fructum eius, & myrtum: rosam, glaucium, cytinus, balaustia, omphacium, rhum vtrunque prius aqua coctū, tamaricen, spinæ Aegyptiæ fructum, & cætera astringentia, præter ea quæ pharmacæde, id est venenosam & noxiam facultatem habent, si deglutiantur. Digerentia verò mediocria decoctum caricarum, furfuris, mulsam cui incoctum sit origanum, hyssopum, thymum, calaminthe, pulegium, mentha odorata. Fortiora sunt, eaq; amplius coquenda, nitrum vstum, nitri spuma: valentius his sulfur viuum, pyrethrum.

Andromachus in diarrhœo miscet cinnamomi & casia ana *Lib. 6.*
 drach. vnam.

Croci & crocomagmatis ana drach. duas. *Ibidem.*

Alumen rotundum, fori, misy, chalcitis ad oris vlcera si- *Ibidem.*
 mul miscentur apud Gal.

Generosissimæ oris collutiones in phlegmone gargareonis, vel aliarum oris partium incipiente parantur ex prædictis astringētibus. vel singulis per se, vel decoctis in aqua cum aliis. Mirum enim quanto ipsorum mistiones subinde utiliores fiant vsu simplicium.

Emplastro cuidam albæ miscet cadmiæ, pompholygis, cineris buccinorū, squamæ æris, calcis lotæ, chalcitidis vstæ & *In fine lib. 1. c. ph. g.*
 lotæ, singulorum drach. quatuor, vel drach. sex, si ex his tantum quatuor simplicia misceantur: vel drachm. duodecim si tantum duo tibi sunt ad manum, vt ex his quomodolibet iunctis drach. viginti quatuor, id est, vnciæ tres iniiciantur.

Tamen si alius spectes, hæc non idem pollent nisi genere, sed ratione maioris & minoris differunt: vt euphorbium violentius est thapsia, & hæc potentior nasturtio, vt libro 1. comp.ph.part. sic in aliis discrimen aliquod inuenias.

In arteriacis iisdem casia, cinnamomum, amomum, nardus Gallica & Indica, costus, schœnu anthos, malabathrum, & magma malabathri ponuntur. Item thus, crocus, myrrha dispositiones coquentia iisdē miscentur: sic & glycyrrhiza, gummi, & tragacantha, quæ exasperata læuigant.

*Lib. 4. sanit.
tuendæ.*

In diospolitico ruta, piper, cuminū, mel curiosè despumatum, nitrum, ad flatus discutiendos omnia efficacia. In medicamento dia trion pipereon tria piperis genera, zingiber, anisum, thymum. In dia calaminthe, calaminthe, thymum, pulegium, apium, petroselinum, fœli, libysticum, piper graue. Ex libris aliis Galeni exempla afferre possumus propè innumerabilia, in quibus idem propè pollentia medicamenta simul miscentur etiam plurima. Vide tamen ne copia immodica luxuries, magno sæpe ægri dispendio, sed contentus esto simplicibus quàm fieri potest paucissimis. Quo enim simpliciora sunt cōposita, si scopis nostris satisfaciunt, eò sunt præstantiora, præsertim quæ mox à componendo sunt vsurpanda. Quæ verò ex pluribus constant, longa omnium simul ceu fermentatione percoqui ferè indigent, per quam vis persæpe contraria priori acquiritur, & forma quedam noua à simplicium formis diuersa, per solam experientiam cognita: vt theriace recens stupefacit (nisi cinnamomi præstātia coctionem eius accelerarit, vt in theriace audies) vetus calfacit, & opera præstat in maxima, quorum vix vllum in recēti inuenias. Ob id experta à veteribus & doctioribus composita medica menta sunt neotericum compositis meliora: nisi siqua hi inuenerunt, quæ vsus iam multus optima probarit.

CONSERVANTIA.

Postremo cūm satis non sit medicamentum nos habere compositum in eum affectum efficax, cuius gratia composuimus, & addita esse à nobis ea, quæ sunt actioni optatæ non modo necessaria, sed etiam vtilia: nisi idem compositum à situ & putredine seruetur non dies tantum aliquot, sed menses & annos, interdum etiam multos. Idq; ne frequēter idem comp

componendi labor non necessarius sit sumendus, vel ne simplicium in id necessariorum nunc recentium facultas tunc non sit, cum medicamento erit opus: vel ut tempore vires acquirat medicamentum non solum valentiores, sed sæpe etiam prioribus contrarias: quod in theriace & mithridatio accidit, quæ primis mensibus stupefaciunt, postea calfaciunt.

Porro seruare possunt omnia, que siccant & humiditatem excrementosam putredinis authorem absumunt, vel per se, ut sicca: vel per accidens, ut calida. Ob id omnia seruanda medicamenta tam simplicia quam composita corruptioni obnoxia, (quædam enim per se diutissime integra durant, ut metallica, terrea, semina, fructus multi) siccamus vel sole vel igni: etiã siccantibus adiectis, melle, saccharo, aceto tum per se, tum cum sale, qui solus tamen capparibus & carnibus seruandis, & oleo, & omphacio, & aliis multis sufficit, siccando & astringendo, ne calor externus vna putredinis causa eas subeat, aut internus foras exhalet. quem quia superfusum oleum intus cohibet, etiam solum succis multis diu seruandis sufficit, ut limonum, granatorum, cydoniorum. Eadem de causa aqua pluuiæ diacodio miscetur, ut medicamentum putredini minus sit obnoxium: habet enim hæc aqua in se aliquid astringens. Quatenus autem quodque genus medicamentorum compositorum sit siccandum, hic audire ne expectes, sed partim imitatione & experientia discas licet: partim ex his intelliges, quæ in modo præparandi singula medicamentorum compositorum genera libro quarto scribemus.

*Initio lib. 7. c.
ph. p.*

Sic hiera picra melle despumato excepta fit duratius medicamentum, & theriaca, & diacalaminthe, &c. Sic succus mororum coctione per se, deinde cum melle fit duratius diamoron.

Lib. 7. meth.

Medicamentis compositis id iam adeptis cura nostra ut seruari diu possint, ad virium custodiam ne exhalent, & ipsorum tutelam ab iniuriis externis, aëre, puluere, araneis, muribus, & id genus reliquis, loco est opus non solum communi, sed etiam proprio cuique quo seruentur: cum simplicia plurima si loco communi solo serues, nihil pecces. Reponantur autem composita ut simplicia in aëre sublimi, perflatili, sicco, non subterraneo, præsertim humido, ut in quo situs celeriter proueniat, qui medicamentum corrumpat. Succus tamen oleo superfusus testis cellis vineariis, uti omphacium, melius

Lib. 6. c. ph. p.

Lib. 1. antidot.

lius seruatur, quo aëris externi magnis mutationibus aër ille minus sit obnoxius. Tamen in magnis vrbibus & frequentibus cum densa & angusta sint ædificia, & contignationes plerunque humiles, redimitur iniuria apertis dies totos fenestris: præterea siccitate ignis ad quotidianas compositiones necessarii. In his tamen officinis multo sunt præstantiores, ad quas scanditur, & à quarum area tabulatum abest longius. Præterea quæ aëri libero sunt apertæ ac soli, modo is radio medicamenta composita non attingat. Nec improbandæ, quæ solem orientem aut etiam occidentem spectant, neque etiam in septentrionem apertæ, modo sublimes, perflatiles, à cloacarum & aliorum inquinamentorum iniuria remotissimæ.

Priuatius autem locus cuique medicamentorum compositorum generi suus est, antidotis suus, trochiscis suus, suus & catapotis, & aliis similiter. Is autem ferè vas est, idq; vel terreum, & id multiplex, vel vitreum, vel ligneum, vel stanneum, quæ maxima turba est, cõtra Galeni decretum, vel etiam aliis metallis constans. Præter hæc quædam alio teguntur, vt catapotiorum massæ aluta alba colligantur. Sed de his fufius libro sequente in pharmacopolarum instrumentis.

Omnia tamen operculantur, quædam simplici ex eadem materia tegmine, & eo interdum per ambitum picato aut cecrato: alia subere, linteo, stuppa, membranis, corio, papyro, aut alia re quauis, nonnulla etiam cera, resina: quædam solo, vt diximus, oleo, quæ tamen & communi tegmine ex papyro aut alio obstruuntur.

Exemplo basim & cætera exerce in hiera picra. Aloë sola in hiera prauos humores ex ventriculo vacuat, mastiche additur ceu apta stomacho & grati odoris, & ad frangendam vim aloës medicamentosam efficax.

Cinnamomum tenuissimarum partium, ventriculi tunicarum meatus aperit, humorum crassitiem tenuat, & lentorem terget, quos alioqui aloë nunquam traxerit ob imbecillam vim purgatoriã. Ad biliosas autem in ventre dispositiones præstantissimum est remedium, vt multos stomachi vitio molestatos vno die frequenter sanauerit. Cinnamomum item alios omnes affectus ex prauis succis contractos iuuat mistum: quia facultatē habet, qua prauas qualitates in naturalem statum reducit.

ducit. Poterantq; hæc duo sufficere, cum cætera sint partim apta stomacho, partim tenuia & absterforia, virtute tamē longē inferiora mastiche & cinnamomo: genus autem facultatis idem habentia, lib. 8. c. ph. p.

Q U A N T I T A S.

HAstenus qua methodo simplicium medicamentorum compositioni aptorum delectum facere oporteat, & quot ut paucissimis ad compositionem sit opus, abundē docuimus: nunc addamus quæ horum simplicium quantitas, id est, pondus aut mensura (dosin vocant) esse in cōposito debeat, si illa videlicet certis limitibus omnino circumscribi queat, quos ultra citraq; compositi facultas optata esse nequeat. Nam in vnoquoque non modò medicamentorum, sed aliorum quoque omnium remedium genere quātitas sola est, quæ ad vnguē nec dici, nec scribi possit, sed coniectura tamen artificiosa. Medicus natura prudens, & multa Medicorum lectione exercitus, ipsisq; medicis operibus quantitatem excogitabit cuiusq; legitimam, aut ei proximā ex affectus essentia, magnitudine, temporibus, situ: ex partis affectæ natura, ex simplicium deniq; ipsorum facultate vel valida, vel languida non neglecta indicatione à forma medicamenti constituenda, ab aëris tēperie, ab ægri habitu molli, duro, raro, denso, sensu tactus exacto, obruso, consuetudine huius vel illius medicamēti, aut insolentia. Affectus enim parvus, recens, superficialius, ob hæc curatu facilis mitiora postulat medicamēta contraria, quàm qui in eodē genere est, sed magnus, inueteratus, profundus, proinde curatu difficilior: is enim valida requirit. Ut enim plantæ nouellæ etiam summis duobus digitis nulla vi euelluntur, vbi verò altius radicarūt, ligonibus, asciis, multorum hominum robore magno indigent, ut euellantur: sic morbi recentes leuiores, qui longa mora inualuerunt, valentiores etiā remedia postulant.

Gal. in apoplexia.

Adhæc superficialiis & sublimibus corporis affectibus medicamenta viribus integris quia occurrunt, tanta esse debent, & sic efficacia, quanta eorum vi contraria affectus ipsi ut profligentur indigent, & pars ipsa ferre debet. Ad profundos autem affectus penetrando vis medicamentorum obrunditur, quia alteratur, quia aliis etiam miscetur: ob id tantum ei

virium cumulamur, & superdamus, quantum in via diminutum iri coniectamus, ut earum reliquum vincendo affectui sit æquale. Cætera hoc exemplo fient manifestiora, si ab affectu, vel affectibus variis sumpta indicatio, & quæ à temperamento partis affectæ, aut etiã totius, & ab aëre sumitur. Idem medicamenti genus suadet, ut refrigerans, medicamentum affectui contrariũ est augendum viribus & quantitate, magis, quàm si singuli affectus hi seorsum consisterẽt. Ut affectui calido in temperamento frigido in aëre calido, refrigerantium vis maxima est adhibenda: quia affectus refrigerantia sibi contraria postulat, & aër quatenus insaluber est, quia intemperiem morbo habet similem, quæ ipsum fouet & auget, temperamentũ verò partis frigidum, similibus seruandũ. Quod si cutis est dura & densa, & sensus obtusior, non modo frigidiora, sed quæ tenuitate essentiaẽ promptè penetrent, ut acetum, succum corticis viridis nucum, præter hæc affectus requirit. Si verò hæc indicationes pugnẽt, & diuersum postulent medicamentũ genus, quæ numero & viribus vincunt, vim medicamenti augendã suadent, quæ vincuntur minuendam, magis & minus pro numero & dignitate indicantiũ. Si verò affectus multi sint implexi naturæ contrariæ, ut hydrops cum febre, vrgentiori maior vis remediõrũ opponatur, non neglecto tamen altero: sic vbi causa morbi & morbus diuersæ sunt naturæ, ut pituita frigida humida causa febris quotidianæ calidæ & sicca dispositionis, vrgentioris maior est habenda ratio: pituitæ videlicet per tenuantia, incidẽtia, tergentia, coquentia, phlegmagoga eius generationẽ prohibentia: febris per refrigerantia, humectantia, putredinem finientia: si æquè polleant, prior & maior causæ est habenda ratio, ut quæ tollenda primo loco sit. In complexis enim affectibus considerandum est, quis affectus cum quo, quis sine quo, quis post quem curandus vel non curandus est.

Si autem causa morbi & morbus eadem postulent remedia, ea sunt augenda ut tertiana febris calida sicca à bile flaua, putrente, calida, siccaq; etiam ante putredinem, assatim refrigerandum est. Sed hæc simplicium facultatem intendendam potius probare videntur, quàm ipsorum quantitatem augendã: quanquam aucta quantitate facultas etiã intenditur: ut si pro cinnamomo duplũ casia cinnamomo longè inferioris
ponit

*Lib. 3. sanit.
tuende.*

*Lib. 7. method.
& 9. & alijs.*

ponitur, quantitas ipsa casiaë aucta cinamomi vires representat. Item quò plus & maior quantitas simplicium calfacientium vel refrigerantium, vel aliud quiduis efficientiũ miscetur, eò valentius est id medicamentum, vt in diosporitico tantum nitri quantum singulorum aliorum, purgatorium ipsum reddit: & dia trion pipereon est medicamentosius & valētius anisi, thymi, zingiberis ana drach. sexdecim, quàm drach. octo: & hiera picra valentior cum drach. aloës 120. quàm cum drach. 100. vel paucioribus: & sic in reliquis vires magnas habentibus comperies.

Item si natura id est temperatura partis affectę & corporis totius est eadem, maior sit quantitas, & vis medicamēti cum natura partis & totius consentientis. ob id sicca magis adhibe vlceri partis natura sicca, si totum quoque corpus est siccum: contrà autem siccandum minùs simile vlcus, in parte præhumida toto etiam corpori præhumido: nam vis medicamenti tunc naturæ partis incòmoda est ac contraria.

Si verò partis & totius natura est diuersa, adhibe medicamentorum parti & toti consentientium portionem æqualem, vel medicamenta inter vtriusque naturam media: vt si corpus humidum, pars sicca, misce humida cum siccis æqualiter, vel humido sicco temperata simplicia: non oblitus tamen indicationis, quam vlcus omne insinuat, scilicet siccandum se esse, eoque magis, quò est ipsum humidius, & eo minùs, quò est in parte natura humidior.

Ex dictis igitur apparet, quòd affectus ipsi præsidiorum genera nobis indicant, mensuram verò cuiusque remedij, & particularem in materijs differentiam, suggerit præter affectum pars ipsa affecta, ægri temperatura, ætas, vis vitalis, aëris temperies, vt lib. 2. comp. ph. partic. docet Galenus, vbi Apollonium reprehendit, multa capiti ab ictu vel casu dolenti remedia componentem, nullius tamē simplicis expressa mensura.

Quantitas verò huius vel huius simplicis in còposito, nec maior, nec minor cur sit imposita, ratione non caret eorũ qui primi ea miscuerunt: quòd si paulò vel plus vel minus eorũ quorundam miscuissent, fortasse nec illegitima fuisset compositio, sed quia vsu longo bona est comprobata, eam ne mutauerimus. Cùm enim exquisitè affectuum (quibus præcipue medicamenta componuntur) natura cognosci non possit, neque

Lib. 3. c. 7.
method.

Lib. 2. c. ph. p.

neque fortasse simplicium, coniectura quadam artificiosa col-
legerunt maiores nostri, simplicia his viribus utcumque co-
gnitis, hunc affectum coniectura tantum sanatura. Quanti-
tas autem simplicis eius maior ferè miscetur, cuius facultate
ad morbum profligandum magis egetur, siue illud simplex
sit, siue compositum, quo præter cætera morbum oppugnare
Medicus proposuit: ferè addidi ob id, quòd quæ bases magna-
rum sunt virium & periculosarum, parciore miscentur. Sic
in theriace, minor est portio pastillorum theriacorum, quàm
scilliticorum: in scammoniatis medicamenti parcum inest
scammonium, ob valentem facultatem eius actionem. Item
quæ densa sunt, parciore miscentur quàm rara. Prætereà cum
multa facultate eadem, ut colorifica & roborante prædita, si
in remedium aliquod miscentur, ut xylaloë, mentha, absin-
thium, cariophyllum, mastiche, in stomachi epithema parcio-
ra miscebuntur, quàm si singula tantum imponerentur: quòd
quantitas mensuræ vel vnius vel plurium, totius effectum in-
tendit, quod cassia duplex, aut carpesium multum pro cinnamo-
mo planè declarat: quòd illa imbecilliora tamen quantitate
sua huius qualitatem propè adæquant.

Lib. 1. c. ph. p.

Quantitatem igitur & mensuram miscendorum medi-
camentorum simplicium, est quando primum coniectura
tantum metitur, etiam facultatis simplicium peritus. Vbi
verò expertus est affectum ab eo medicamento in corpo-
re relictum, seu medicamenti opus, considerat ex eodem
si quid à scopo deficit, idque sufficit: ut psilothrum corpo-
ri semel iusto tempore admotum, si satis egerit in alijs par-
tibus continua: sin minus, auge vim simplicium pilos auferen-
tium, ut calcis, arsenici, sandarachæ: si nimium egerit, ut vrat
& ulceret, vim illorum remitte, minuta ipsorum mensura, &
aucta portione aliorum vim istam frangentium. Si quidem
exactè simplicis alicuius miscendi, aut compositi medicamenti
atque adeò reliquarum causarum salubrium quantitatem, ne-
mo ante experientiam inuenerit: coniectura tamen sic antè
iudicat & expendit, ut nullus multum improspere succedat
euentus. Vbi igitur à tutissima in singulis mensura inceperis,
& quod ex ea sequutum est æstimaris, potes quotidie vel ad-
dere vel detrachere, & quod omisum est corrigere. Sic in dia-
cnico, cnici ponitur & caricarum par modus: sed prout se habe-
re id

*Lib. 1. c. sanit.
tuenda.*

re id ad fumentis naturam experieris, aliàs plus, aliàs minus enici immitte, lib. 5. fanit. tuendæ.

Præterea simplicium miscendorum facultas imbecilla vel valida, magni est momenti ad cuiusque iustam quantitatem limitandam: infirmioris enim dosi potest tutò augeri, vt duplū casia pro cinnamomo, duplū radicis panacis vel radicis peucedani pro succo radicis alterutrius. sic omnia reliqua imbecillia misceri possunt largiora, nisi quid veret, vt quantitas totius immoderator, vel forma constituenda vitietur, vel nisi futurum sit imbecillius tanta imbecillorum portione quàm postulet affectus. Pro cuius portione augenda vel minuenda medicamentorum purgantium, digerentium, astringentium, vel alia facultate præditorum vehementia.

Quæ verò sunt vehementiora, vt elleborus alteruter, scam monium, colocynthis, opium, quantitate parua sunt miscenda, & cum præmeditatione. Sic quibus est aurium dolor ex inflammatione vehementissimus, opium castorio pôdere æquali multò antè miscendum est: si autem mitior est dolor, duplicato castorio, ambo in sapa ex musto dissoluta, quia dolores magis lenit, quàm vinum dulce.

Lib. 6. c. ph. p.

Lib. 3. c. ph. p.

Facultas quoque remediorum in duris corporibus augeatur, vt prædiximus. Ob id Galenus cuiusdam achoribus chartam vltam ex aceto illeuit, quòd eum vini medicamenti ob carnis duritiem facile toleraturum consideret: & ita euenit, eoq̃ue remedio paucis diebus persanatus est.

Adhæc quibus sensus est acrior, mitiora: quibus obtusior, valentiora ferunt remedia: sic Galenus in hemicrania veteri à causa frigida auribus sensu tactus acri, ac exquisito præditis instillabat oleum euphorbiatum, id est, quod libra vna olei habeat euphorbij drach. tres incoctas: si autem obtusior earum est sensus, habeat olei lib. vna. euphorbij validi, & recentis vnciam dimidiam: si autem sit inualidum vetustate drach. quinque, aut plus accipiat.

Lib. 1. c. ph. p.

Item quæ medicamentum gratius faciunt augenda vel minuenda pro aliorum qualitatibus natura: vt si stomatica fiant ex insigniter astringentibus, vt succo cornorum, duplum aut triplum mel postulant: Mitiores verò succi, vt mespillorum, pyrorum, & multorum fructuum æqualem mellis portionem, aut saltem quàm prædicta minorem. In stomatico digerente
aromatuna

aromatum drach. tres, aut quatuor & dimidiam. ad summum quinque drach. miscet lib. mellis Gal. lib. 7. comp. ph. part. Libræ mellis aut sacchari maiores pulueris vnc. tres miscebant in antidotis efficacioribus, quàm quæ nunc parantur cum vnc. tantum duabus, vt sint iucundiora, præterquàm in quibusdam. Aromata item hyeme augenda, æstate saccharum largius miscendum.

Quantitas etiam quorundam simplicium variat temporis ratione, quo ex ijs compositio fit: vt si ceratum Galeni facis hyeme, minus ceræ postulat, quòd etiam oleum frigore hyberno valenter concrescat non sola cera, habeatque duritiem lapideam ceratum, æstate verò largiorem ceram accipiat, quòd sub illius æstu etiam cera semisoluta mollescat. Ratione est eadem vtendum in cæteris ceratis & emplastris, & alijs, quæ ceram, resinam, aliaque à frigore concrescientia, à calore liquefcentia recipiunt. Aestate etiam minus olei miscemus emplastris & vnguentis, quàm hyeme, quia illius calore solum id, vnguentum reddit perliquidum, vt hyemis frigore concretum etiam multum, crassius vnguentum efficit. Ob id Alexander Tral. emplastro phœniceo palmularum vnc. decē, addit olei vncias æstate tantum octo, hyeme vndecim. Aui-cennas quinto canone vnguento apostolorum miscet olei libras æstate duas, hyeme tres. Adde quòd prædicta fingimus liquidiora, quando eis sicca alia, vt æruginē, calcem, cadmiam, farinas, pulueres fumi misturi: duriora verò primum componimus, si succos aliquos sunt post recepturi, vt cum ceratum Galeni aceto & aqua rosarum, vel alio dum frigescit, mifces quantum bibere possit.

Rerum etiam miscendarum natura quantitatem immutat: quæ enim sicca & rara sunt coquenda, largiorem humorem postulant, quàm humida densa.

Sic Galenus modium seminū abietis iniecit olei libris quinque & viginti, quia maceratum menses aliquot multò planè minus redditur. Modium verò florum populi nigre inijcit libris olei viginti tantum, aut etiam quindecim, quòd hi flores cum sint humidiores minus olei macerando etiam per æquale tempus ebibant.

Sic syrupus ex seminibus, radicibus & alijs simplicibus sic
eis raris coquendus, plus aquæ aut liquoris alterius idonei re
quirat,

quirit, quàm in contrariis: quod in compositis medicamentis abundè leges. Plus item liquoris postulat, qui ob simplicium naturam vel formam constituendam, longiore coctione humorem halitu dissipante, indigent, nisi liquor ea sit natura, ut ægrè vaporet, cuiusmodi est oleum.

Est quando quantitas remediorum scrupulosius à maioribus est ascripta, quâdo scilicet à maioribus compositionibus parciore diuidebant, ut Andromachus arteriace 15. thuris drachma vna, obolus vnus, myrrhæ, croci ana drach. vna, oboli duo, succi glycyrrhizæ drach. vna oboli tres, aut radicis glycyrrhizæ drach. vna & dimidia. Quæ ponderum dissolutio frequens est in compositionibus quarto libro scribendis, quas Mesues ac Nicolaus ex aliis plenioribus descripserunt, quales habet multas antidotarium Hadriani, & antidotarium magnum Nicolai, quod Græcum Romæ audio esse, & Græcum affirmat Nicolaus pharmacographus, ut suo loco leges. Vbi interdum mensuras aut pondera minimum auximus, vel minuius cum scrupulosius diuiderentur: sed id tantum fecimus in simplicibus virium parum efficacium, & à quorum quantitate vel aucta vel minuta nulla aut minima totius mutatio fieret. Quod à nobis rarè licet factum nemo accuset, cum etiam in veteribus quibusdam compositionibus nonnullorum quantitas circumscripta nullo propè iudicio inueniatur. Nam thuris drach. vnam, obolos quatuor scribit Andromachus in arteriace 13. cum licuerit scribere thuris drach. vnam & dimidiam, vel drach. duas (neque enim tanta est vis in thure) præsertim cum aliorum multò valentiorum sit magnum pondus, ut nardi, myrrhæ, croci, costi ana drach. quatuor: cum itè in arteriace 12. scripserit croci drach. vnam, myrrhæ drach. quatuor, thuris vnc. vnam: quidam tamen negant licere magnarum antidotorum compositionem: vel augere, ut Veneti vim maximam theriacæ & Mithridatij simul coquant: vel minui, quod prædictis exemplis audisti, quod in maiorum pondere & mensura vis quædam insit, & melius illorum mensura paratur. Si tamen non magnus fiat recessus, parui refert: nam duas libras aut circiter theriaces si quis fecerit, non percoquetur à suo calore nativo, & cito vanescet, ut vinum paucum in paruo dolio: in magno autem felicius seruatur: sic theriace quanta à veteribus dicta, largior autem ægrè paratur, com-
misce

Lib. 7. c. ph. p.

Lib. 7. c. ph. p.

miscetur, coquitur.

Lib. 6. c. ph. p.

Quin & quātitas ipsa interdum incerta ipsis etiam authoribus fuit, vt in stomatico Critonis, *δια γλίυκας* rhus coriarij drach. vna, alij drach. duas: gallarum drach. quatuor, alij gallas triginta: croci drach. duas, alij drach. vnam: aluminis scissi

ibidem.

drach. duas, alij myrrhæ drach. vnam. Sic in stomatico Andromachi ex gallis triginta, & aceti albi sesquicyathos: alij scribunt cyathis nouem rhus obsoniorū cyathus vnus: aliis cyathi nouem, mellis cyathi duo: aliis sesquicyathus scribitur.

Hanc verò ambiguitatem soluit Galenus, vt aceti & rhus ana cyathi nouem ponantur, tuncque amplior fiat coctio, quæ gallæ tenerescant: id quod multò est præstantius, quàm ponere vtriusque ana sesquicyathū, tunc verò parcius est coquendum. Coctio ergo longior, breuior, humoris in quo est facienda quantitatem nobis insinuat.

Lib. 4. sanit. tuenda.

Sic in acopo *δι ἀργύρεον* modum florum populi nigræ immittit quīdecim aut viginti libris olei.

Lib. 7. c. ph. p.

Numerus etiam simplicium ad quantitatem refertur, quem alij alium in iisdem etiam compositionibus sequuntur, vt in arteriacis & hippoglottidibus: alij tria, alij quatuor sufficere putarunt, alij in maiorem numerum extenderunt. Est tamen quando numerum non mutamus, vt in tetrapharmaco, in theriaca diateffaron.

Lib. 1. c. ph. g.

Non multum differt, siue cētum drachmis metallicorum, siue sex & nonaginta duæ olei cotylæ misceantur ad emplastrum: in re verò magni momenti drach. quatuor adiciere aut demere magni refert.

FORMA COMPOSITI.

Lib. 6. c. ph. g.

Postremò forma compositi vel vtilior fini proposito, vel gratior ægro, vel seruando medicamento aut vtendo accommodatior, suadet huius vel huius medicamenti copiam vel largiorem vel parciolem: vt si os volo colluere lacte cum tritis foliis pruni, liquet multo lacti pauca folia miscēda: si volo illinere, contrà pauco lacti multa pruni folia trita miscebo.

Collyria oculi astringentibus præsertim metallicis præpollentia, multo liquore sunt dissoluenda: crocus, myrrha, castorium, thus, lycium, in quibus vincunt, multò parciolem liquorem requirunt, crassiusque medicamentum faciunt: si li-

nimen

nimentum cuius parti paras, ceræ pars sexta oleo miscenda, nisi sicca etiam quædam misceas, tunc enim minuenda esset cera: si ceratum liquidius fingis, quarta pars ceræ: si solidius, tertia: si in formam emplastri, secunda miscenda est. Cætera ad formam compositi pertinentia quæ simul ad definiendam simplicium quantitatem pertinent, mox audies. Interdum nulla ratione forma compositi variatur, sic diospoliticon, dia trion pipereon, diacalaminthe, vel sicca, id est, in pulvere vsurpat Galenus, vel melli admista. Sic Andromachus cum medicamentum ad coxendicum dolorem scripsisset ex ruta vtraque, abrotano, silphio, baccis lauri, aphronitro, colocynthide, cardamomo, ami, galbano, opopanace, sulfure viuo, vt emplastrum ex ipsis faceret, addidit picem, resinam terebinthinam, ceram, adipem.

*Lib. 4. san-
tuenda.*

Lib. 10. c. ph. p.

Est quædo mutatur, quo sit efficacius medicamentum: sic hiera picra sine melle cum aqua sumpta magis roborat ventericulum, & succos vitiosos in ventericuli tunicis contentos vtilius extrahit: melle autem despumato excepta, minus ventrem roborat, & magis deiicit, minus ob hæc vtilis prædicto affectui.

Lib. 7. melle.

Sic pro fotu, ex oleo vnguentæ, cerata, emplastra formamus, vt parti materiæ diutius hæreant, vel alia materia in aliis partibus sed crassiore substantia, si diu hæreere volumus. Contra verò sinibus liquida omnia iniicimus, vt quaquauerfum spargantur, & nullam sinus partem quantumvis angustam relinquunt intentatam.

*Lib. 2. ad Glau-
conem.*

Sic liquidiora expectorandæ à pulmonibus & thorace crassæ & lentæ materiæ formamus medicamenta. Sic læuissimè terimus, quæ vrinas, sudores, menses mouere volumus, præterea ex liquore purissimo & tenuissimo non crasso, lento, turbido damus. Sic clysteres nunc maximè aquosi, quando solum est eluendum: crassi magis & lenti, ex adipibus, butyro, vnguentis, mucaginibus, cremoribus hordei, tritici, orizæ, & similibus, quando intestinis immorari diutius, & hæreere tenacius volumus.

Adhæc forma hæc compositi medicamenti à nobis constituitur alia atque alia, pro morbi, partis affectæ natura, figura, & situ, proprietate ægri, & modo præparationis simplicium ad formam aptam necessario, & medicamenti componendi differentia.

Phlegmone enim externa contactum emplastrorū, & aliorum similiter durorum sine noxa non feret, ut nec vlcus siue simplex sit, siue cauum, sed omnino liquida postulat: illa fortus, linimenta, cataplasinata, cerata mollia: hoc, emmota & soluta oleo vel liquore alio emplastra linamentis imponenda, vel etiam instillanda, & iniicienda in sinus ipsos. In quorum fundum sola liquida permeare possunt, si decliues sint & re-cti. Si verò anfractuosi & ascendentes etiam iniectione vix fundum vlcis illa liquidiora attingent.

Linamenta, item turundæ, splenia pro vlcis figura & situ sunt: adhæc etiam turundæ frequenter cannulatæ (ut vocant) fiant, id est tubum aliquem argenteum, ferreum, plumbeum complexæ, per cuius meatum pus largum continenter effluat, ne mora in parte rodant, & vlcus augeat.

Amara & id genus alia nobis ingrata ventriculus cum non ferat, ea catapotiiis vel alia forma concludimus, ut integra deuorentur, nec sensum sui deglutiendo præbeant: aliquo propterea iucundo etiam teguntur, melle, saccharo, pomorum, prunorum, vuarum carne molli, inuoluta interdum foliis auri vel argenti, vel alio simili.

Tali item vel tali forma debet constare medicamentum, ut partem affectam attingat: hinc sunt inuenti à medicis pessimi colo vteri affecto, balani intestino recto, (quamuis ei ad excretionem irritando hodie frequentius seruiant) clyster crassius intestinis magis quam tenuibus.

Sic stomatica, & arteriaca, & stomachica sunt forma & consistentia mellis seu crassi & liquidi media nonnihil tenaci: errhina liquida, aut puluisculi: apophlegmatifinata in nodulo, vel aliter solidiora. Catapotia item aut bolos formamus, cum à longinquis partibus trahendum: potiones potius, cum vias alimentari primas inanire studium est: Medicamenta tenuissima & cum tenuissimis mista & ferè liquidissima, quæ ad vterum, renes, vesicam, articulos, cutim volumus penetrare. Qua in re est ægri consuetudo naturaq; consulenda: ut in opsonis & cibis aliis inueniendum experientia est, quod cuique est optimum (aliud enim alii secundum naturæ proprietatem est melius) sic in medicamentis quod cuique sit non modo gratum, sed etiam optimū inuenire tentandum est, rogando si quando vsi sint medicamentis ut purgantibus, & quib

& quibus, quantis, quando, in quo affectu, qua parte anni, & quomodo eos habuerit. Quidam enim à medicamentis in totum abhorrent, quibus iusculo, aut potione dulci, aut sapore alio ipsis iucundo medicamenta tegimus, vt inscii sumant alii possunt quidem medicamentum deuorare, sed vel potione tantum, vel bolo, vel catapotiiis, vel forma alia. Sic in admotis quidam emplastra ferunt, linimenta cataplasmata non ferunt, alii contrà. Sunt qui emori malint, quàm clysterem recipere, quibus per epomphalica est succurrendum, si ne per sumpta quidem licet. Capitis dolori veteri calido aut frigido, raso ipsi in formam emplastri aut cerati admouenda sunt tonsio ad cutim, aut capillis aliter breuib. liquidis adhibe.

Succus ex corticibus nucum expressus, quia substantia est tenuiori quàm stomatico conuenit, & coctus est à Galeno & inel additū, vt mellis consistentiā stomaticis idoneam haberet. *Lib. 6. c. ph. p.*

Est tamen quando simplicium præparationis modus ad aliquam te formam impellit, vt ex infuso siue macerato rha barbāro, bolum aut catapotia, aut formam aliam solidam non feceris, vti neque ex herba virente, fructibus molliibus, resinis recentibus puluerem. Ob id considerandum tibi est, quam formam hæc medicamēta vsta, lota, assata, cocta, infusa, trita, destillata magis requirant, & in qua melius seruentur, & felicius agant in affectus, & cōmodius possint applicari. Tametsi multa formamus in figuras quaslibet sub quibus raro in vsum veniunt, vt trochisci forma sunt solida: ad oculos autē liquore aliquo in cote medica soluuntur. Pulueres in alias atque alias formas nunc siccas, nunc liquidas, nunc medias abeunt.

Formæ huius vel huius cōstituendæ gratia non pauca medicamentis componendis miscemus, quæ potestatem aut nullam aut exiguam admodum medicamento parando afferunt, sed materiæ commoditatem præbent, vt vel emplastri vel cerati speciem per ipsorum mitionem consequantur. Quia sola causa lithargyros emplastro dia chalciteos miscetur, quia nec calida, nec frigida, nec humida est, & parum sicca, vt ad primum gradum, nihilq; aliud vehemens habet. *Lib. 1. c. ph. p.*

Eidem emplastro dia chalciteos miscetur cera, quod sine hac, alia eius emplastri simplicia ad talem consistentiam non peruenirent. Eadem cera aliis emplastris & vnguentis quibusdam & ceratis miscetur, vt materiæ commoditatem affe-

rat, potestatem nullam aut exiguam afferat.

Sic adipēs, olea, gummi, resinæ adduntur, nunc ut spissius, nunc ut liquidius medicamentum reddant : quæ tamen sæpe miscentur, ut materiæ rationem habeant, & potestatem medicamento tradant : ut si ex ruta utraque, silphio, baccis lauri, abrotano, aphronitro, cucurbita sylvestri, cardamomo, sulfure viuo, & similibus siccis nec glutinosis volo facere medicamentum ischiadi admouendum, quia per se non hæreret, addo prædictis glutinosa, picem, resinam terebinthinam, adipem, ceram. Addere possum hammoniacum, bdellium, galbanum, opopanax, & similia quæ emplastica sunt, & emplastri compositioni conferunt, & emolliunt, & quantitatem picis, & similibus minuendam ostendunt.

Lib. 10. c. ph. p.

Eadem ratione terebinthinæ, aut eius loco larici & abietinæ puluerem glycyrrhizæ miscemus, ut in bolos veniat, licet glycyrrhiza etiam renibus tergendis modicè conueniat, potentius hac rhabbari puluis læuissimus cum illis resinis mistus renes vacuat, & facilius sumitur. Alii vel alterutrum vel utrunque ex cicerū decocto multum calente malunt sumere.

De his non pauca in usu recto medicamentorum, quædam libro tertio, plurima libro quarto in singulis propè compositis medicamentis animaduertere poteris.

DE RECTO VSV MEDICA- MENTORVM.

Herophilus dogmaticorū medicorum doctissimus, præclare dicebat medicamenta ut cætera medicorum præfidia per se & sola nihil esse, nisi rectè utentē habeant, quando demum ea veluti deorum manus rectè dixeris : iuuant enim plurimum, ubi his vsurus est natura prudens ac industrius, & in rationali methodo exercitus. Propterea etiam rectè Asclepiades medici officiū esse dixit, ut tuto, ut celeriter, ut & iucundè curet. Ante hos prudenter nos Hippocrates hortatur, omnia medicæ artis opera sic perficere, ut iuuet, vel saltē non offendant. Quam rem Galenus his omnibus posterior lib. 12. methodi, & locis per quàm multis inculcat, quòd res ea magnarum sit virium, non modò ut medicus calumnia vacet, sed etiam culpa: cum proximè secundum Deum hominem adiuuat, & cui morborū magnitudo, còplexus, maligni-

Celsus. c. 4. li. 3

Lib. 1. c. ph. g.

tas perniciem extremā minatur. Hinc medicus ceu terrenus quidam Deus affulgeat, consilium & auxilium afferens saluberrimum, cuius beneficio aut vitam ærumnosam calamitosamq; aut impendentem exitum facile æger vitauerit. Non abs re igitur nobis visum est, huc rectum medicamentorum vsum adscribere, tanto certè præstatiore prius scriptis omnibus, quanto finis ipse omnibus his quæ præ se antecellit. In quo nostro studio si quid desiderabitur, ex lib. comp. phar. & methodo medendi sufficere cuius paruo negotio licebit.

Medicatio consistit in medicamentorū affectui cōtrariorū, *Lib. 7. meth.* & ob id idoneorū copia & horū vsu congruo, cōtrarietate ex affectus natura & magnitudine ac medicamēti facultate affectui recessu æquali contraria, sumendam nemo ambigit, & id abundè in scopis componendotū medicamentorū explicauimus: vsus iam cōgruus inuentorū methodo remediorū affectui contrariorū dicendus est, qua methodo perficiatur. Vsus medicamentorū congruus sumitur ab affectus præter naturā causa præsentē, essentia, magnitudine, temporibus: ab ægri, partis, aëris, medicamēti natura planè cognita. Affectui enim calido multū, vt ordine secūdo, frigida secundo recessu: calido modicè frigida mediocriter conueniunt, siue talia sint per se, siue id per accidens præstet (modò nullum hoc incommodū sequatur) sic vt excessus omnis æquali contrario excessu expugnetur. Eodem modo in reliquis intemperaturis tam simplicibus quàm compositis, & tam nuda qualitate constantibus, quàm cum materia coniunctis. Item in pituitoso affectu, quæ pituitam incidunt, tenuent, tergeant, vacuent, gigni prohibeāt, rectè exhibētur, & in aliorū humorum vitio ad portionē: sic in incōmoderatione & solutione continui. Morborū quoque alia sunt atque alia remedia, pro temporū tam vniuersalium quàm particularium ratione, vt pòst fusius dicemus.

Ægri temperatura, commodratio, vnitas partium, quæ fuit ante morbum, scopus est quò tendimus, siue intemperaturam corrigimus, siue morbum organicarum partium proprium, siue solutionem continui. Natura enim calidior similibus medicamentis seruatur: sæpe etiam læditur à similibus suæ intemperaturæ causis, præfertim si calidis multū & frequentibus vtatur: modico autem contrariorum vsu iuuatur ac emendatur. Consuetudinem tamen per morbum mutare

ne tentaueris, si Galeno auscultas, quia tunc naturam morbos victuram expugnaueris. Qui corpore item sunt raro, minus opportuni sunt purgationibus, & aliis vacuantibus praesidiis: quemadmodum etiam puerilis aetas per insensibilem transpiratum continenter multum vacuata, quod humor in ea promptè à multo calore tenuatus, confertim dissipetur. Qui nunquam medicamento sunt vsi, cum maiore praemeditatione medicamentis sunt tentandi. Roganda item cuiusque naturae proprietas. Sani quoque corpore medicationes grauiter ferunt.

Qui ventriculo aut hepate sunt calidiores, à medicamentis calidis, qualia sunt purgantia omnia, ut caeteris sumendis calidioribus laeduntur. Medicamenta valentiora & tenuiora longè disitis partibus, aut profundis, & sensu obtuso praeditis debentur: sublimibus verò & facile sentientibus, & quibus propinquis medicamentum viribus integris occurrit, mitiora & crassiora sufficiunt, nisi alia ratione valens & tenuè exigatur.

*Aph. 5. libr. 4.
& sequentibus.*

Sub cane & ante canem difficiles medicationes: aestate item per superiora magis, si facile vomant, purgandi: hyeme per inferiora purgationes potius deligendae: quia eò natura vergit, & locus est conferens, ut in melancholicis quoque & tabidis. Medicamentis praesertim valentibus raro, & cum multa cautione vtendum est.

In singulorum medicamentorum vsu explorandum, quomodo aegros habeant: si enim plus commodent quam ob sint, toleranda: si contrà, tollenda: ut in ozæna si à medicamento morsum sentit aeger, coniectandum est, quod simplex in eo mordet, idque tollendum, vel abluendum, vel minuendum, vel alio obtundendum, vel in eius genere mitius capiendum: ut si acetum erat peructus & valde acre, capiendum est acidum magis & ætate mediocri, aut saltem vinosum, vel eius loco vinum dulce vel austerum, si affectus requirit. Sic & in aliis vlceribus & morbis reliquis, effectum medicamenti est diligenter obseruandum, ut intelligas an in eius vsu tibi sit perseverandum, an totum mutandum, an simplex in eo aliquod sit augendum, vel minuendum, vel obtundendum, vel mutandum.

Quapropter ei qui rectè volet medicamentis uti praeter aegri & morbi naturam, medicamentorum tam simplicium quam compositorum vires ad vnguem callere debet, & ex his semper

per optima ac probatissima deligere. Cùm enim affectum aliquem certò sanans habes medicamentum, & quod nunquam successu prospero te frustratur, graue est ac iniquum, certioribus remediis in præsens omisissis, noua tentare, curiosæ aliquius experientiæ gratia. ob id cùm Galenus ad rabidorum canum morsus haberet medicamentum omnino probatissimum *Διὰ τῶν καγνίνων*. & præter id alia multa, sed parū certa, nunquam voluit in hos morsus alia tentare, aut albam Heræ emplastron id promittentem experiri: quia an id præstare posset, dubitabat, cùm similis sit Attalicæ albæ myrrha solum & adipe ceruina & cera alba Pōrica larga adiectis. Quòd si hæc morsum in quibusdam naturis sanat, & eum non ita magnum, neque cum spuma adeò maligna, omnem tamen morsum in omnibus naturis totius substantiæ proprietate non sanat, vt *Διὰ τῶν καγνίνων*. Quæ res sæpe fecit, vt Medici quidam Empirici pharmacis quibusdā se primū adeò feliciter gesserunt aliquando, vt in admirationem sui alios perducerent, ipsi tamen in aliis euentu prospero frustrati, sunt irrisi. Non vtenda igitur tibi medicamenta, neque alia præsidia, nisi quæ omnino profutura certò scias, vel saltem nihil prorsus nocitura: aut si nocitura minimum sint, noxam illam facile tollendam maiore commodo compensent. Possem aliarum quoque obseruationum (quas indicationes appellamus) exempla ex Galeno proferre plurima, nisi pro-

Lib. I. c. ph. g.

*In fine lib. II.
meth.*

Ad rectè vtendū medicamēto non satis est nouisse simplicium id constituentium vires, sed etiā totius compositi facultas tibi est noscenda, & ab his qui sæpe eam sunt experti discenda. In medicamētis enim compositis singulorū quæ miscentur virtus & qualitas non amplius conseruatur, ita vt eadem maneat, nec mutetur, nec in vllam qualitatem transeat: sed aliqua omnium fit vnio, tota ipsorum temperie per tota mista: & vna quadā alia virtute ex illis sic mistis profecta, vt in ænomelite exactè per coctionē temperato, neq; mellis, neq; vini saporem omnino deprehendis, sed diuersum quiddam. Sic in theriaca & cæteris compositis cuiusque mistorum vis & qualitas non manet, sed vbi omnia omnibus sunt confusa, &

Gal. in theriaca ad Eisonem.

in vnitatem quandam naturalem concreta, vna diuerſaq; ex omnibus ſimplicibus medicamento natura creatur.

Lib. 1. c. ph. g. In compoſitione ſimplicium medicamentorum inter ſe contrariorum facultates omnino corrumpi quibuſdam viſum eſt, vt aqua ſeruētiſſima cum frigidifſima miſta, neutra illarum qualis erat prius permanet, ſed tertia quædam, ab

Lib. 2. c. ph. g. vtraque diuerſa, gignitur. Non ſolùm tamen cuiuſque compoſiti facultatem expendas, ſed prius ſimplicium medicamentorum naturam, vt communem compoſitionis viam ac vſum intelligas, & tuo Marte poſſis configere ſimilia, & quæ à veteribus citra diſtinctionem ſunt tradita, cognoſcas qualē habent poteſtatem, vti nos in vtilitate & neceſſitate componendi medicamento docuimus.

Aduerte præterea vires compoſitorum tempore mutari etiam in contrarium, vt in theriace docet Gal. lib. 1. antid. & in Philonis antidoto, lib. 12. methodi: hæc enim recentia ſtupēfaciunt, antiquata theriace calfacit.

Cap. 85. artis medic.

Vſus præterea medicamentorum vt cæterarum cauſarum ſalubrium idoneus, eſt in ipſorum quantitate & qualitate idonea, & tempore apto, quod interdum Galenus omittendum cenſet, continetq; quantitatis & qualitatis ratione. Si enim (inquit) tali & tanta re adhibita corpus egeat, nemini dubium eſt, quin opportuno tēpore afferatur. Occaſio ſiquidem temporis inde ortum habet, quod fluxile ac facile mutabile eſt mortale corpus, & pro tranſmutationis modo aliis alio tempore auxiliis indiget. ob quam cauſam ad docendum tempore tanquam tertio quodam vtī conſueuimus, licet reuera tertium præter duo dicta non ſit. In libris igitur ad ſanitatem tuendam pertinentibus, & methodo medendi paſſim aliis duobus ceu tertia additur temporis occaſio, quæ præ omnibus eſt cognitu difficilis, ac Medicos etiam celebres plerunque fallit, quia præcepta ipſa eſt, vt Aph. 1. docet Hippocrat.

Initio lib. 1. ad Glauconē, & aph. 17. & 19. lib. 1.

Eſt quando vtendi modum velut quartum addit: de quibus quatuor quatenus in medicamento vtendis Medico ſint obſeruanda hic agemus, cum reliquarum cauſarum ſalubrium vſus abunde à Galeno dictis libris & aliis ſit abſolutus.

Cum autem medicamento dandi ac etiā admouendi quantitas, qualitas, temporis occaſio, vtendi modus ad rectē medendum magnoperē conducant, ſint verò hæc cuiq; morbo
ac ægro

ac ægro sua ac propria: nihil autem proprium possit sermone explicari, communia de his docebimus; ex quibus possis proximè ad proprium cuique ægro medicamentorum usum accedere. Illa autem communia facile intelliges, si non ignoraris, quæ sanis secundum naturam communia sunt, scilicet pulsum naturalem cuiusque naturæ, ætatis, habitudinis, partium anni, ac reliquorum: adhæc temperamentum cuiusque naturæ vel acquisititium, præterea proprietates naturarum ex ægris rogandas, denique morborum omnium naturam & magnitudinem, & reliqua curanti necessarium aliquid aut vtile indicantia.

Quoniam autem quantitas & qualitas exhibendi medicamenti, & componendi ex iisdem sumuntur scopis & indicationibus, ex ipso sermone prius habito nobis de componendi ratione tibi sunt repetenda, quæ quantitatem atque qualitatem medicamenti tibi definiant. Nam causæ morborum adhuc præsentis, magnæ, inueteratæ, expulsi difficili, valentiora, aut largiora, aut frequentiora medicamenta sunt necessaria, similiter & morbus magnus, veteratis, curatu difficilibus, si ægri vires, ætas, corporis habitudo, consuetudo, aeris natura consentiant. Quod si morbi sunt complicati, vrgentioris seu eius à quo maius impendet vitæ periculum, maior habenda est ratio, & ad id præcipua curantis sollicitudo dirigenda debet, non neglectis tamen aliis. Vbi item causa morbum efficiens adhuc in corpore adest, prima est tollenda, deinde morbus si quis adhuc supersit: adhæc affectus hic primus est curandus, qui alterius curationem impedit, ut phlegmone ante vlcus est percuranda, si ambo in parte aliqua coierint. Quod si omnes complexi affectus remedia eadem postulant, ea sunt intendenda, modò nulla alia repugnet indicatio: in qua pugna quid faciendum, leges in fine lib. 8. methodi.

Præterea ut in componendo medicamento magni est momenti quantitas medicamentorum valentium: parui fit autem portio imbecillorum, etiam si largior iniiciatur. Sic in medicando valentibus cum magna præmeditatione vtendum est, ut cum morbus extremus est aut acutissimus, nullasq; dat inducias, si vires, ætas, aer, & cætera non repugnent: mitioribus autem etiam larga quantitate si vtaris, aut nullum, aut minus inde periculum ægro accedet.

*Li. 7. method.
Triplex morbo-
rum magnitu-
do.*

Vt autem paucis rem in memoriam reducam, medicamentum tam fumendi quam admouendi qualitas à morbi natura sumitur, vt calidum sit morbo frigido, frigidum calido, &c. laxans tenso, densans raro, & in cæteris contrarietas: indicationibus etiam ab aëre, natura totius, partis, consuetudine, habitu non neglectis. Quantitas verò à causæ & morbi magnitudine præfenti vel impendente, partis affectæ situ, figura, habitu, sensu, ægri natura, viribus, consuetudine, in medicamenti facultate: & substantia tenui, crassa, familiari, noxia obseruatis, vt morbo magno, profundo, longinquo, inaccessso, in parte densa, obtusè sentienti, in natura forti, fortibus assueta, aëre temperato, valentibus, tenuibus vti licet medicamenti: mitioribus in contrariis. Paucis tamen exemplis te exercere in purgantium tanquam vsu periculiosorum quantitate non pigebit: si prius vnum addidero, quod ad medicamenti qualitatem ac speciem pertinet: ne scilicet vno aliquo præsertim purgante delecto, id ipsum perpetuò vsurpemus, sed varia sunt vicissim vtēda, siue scopus idem permanet, siue alius etiam subortus est. Cui nanque assuefacta erit tempore sumentis natura, eius vim contemnet, quòd vsu longo familiare sit factum, & ei quadātenus affinis reddita sit natura. quod de mercuriali, brassica marina, cnico, terebinthina, in senibus varianda quanuis à Galeno dictum est, verum tamen est etiam in cæteris maximè purgantibus. In quibus experientia inueniet quisque mensuram legitimā ex naturarum proprietate, cum venter aliis magis, aliis minus his medicamenti sit obediens.

Lib. 5. sanit. tuende.

Ibidem.

Aloë κατωτίζικὰ seu ἱκεπρωτικὰ. id est, aluum ac sterces deiciens, est à tribus obolis seu drach. dimidia, ad drach. vnam. Perfectæ autem purgationis gratia tribus drach. sumitur aliis purgantibus medicamenti admista. Eius per se vsus hodie est rarior: hieræ verò δὲ ἀλός seu picræ creber, de qua in compositis. Hic enim magis statui simplicium sumentorum modum definire. Eadem ab aureo vno ad drach. duas bilem & pituitam purgat Mes.

Diosc.

Lib. 6. simpl.

Agaricus datur drachmæ vnus pondere vel à scrupulis duobus ad drach. vnam: Mesuæ verò bilem & pituitam vacuat, si pulvis eius datur à drach. vna ad drach. duas. In coctione autē à drach. duabus ad drach. quinque. Actuario dan-

tur

tur drachmæ duæ cum aqua mulſa, vel aceto mulſo ad bilem & pituitam: ſtomacho aduerſatur, quia ob leuitatem innatat.

Colocynthis Meſuæ bilem & pituitam vacuat data à ſiliquis quinque ad ſiliquas, id eſt, *κεράτια* decem: frequentior eius eſt uſus hodie in hiera dia colocynthidos.

Cnici ſemen phlegmagogum Meſuæ datur à drach. qua- *Lib. 5. ſanct.*
tuor ad aureos quinque, ſeu ab vncia dimidia ad drach. ſex. *tuenda.*
Galenus id cum pari modo caricarum miſtum dat duarum trium uel caricarum magnitudine. Actuarius pulpæ feminis eius drachmam vnā dat ictericis in catapotiis: in iure autē galli drach. tres pituitam purgare addit, non tamē ſine moleſtia. Cnici ſemen cibus admixtum, & vrtica, & mercurialis, & epithymum, & polypodium, & cætera quæ modicè aluum deſiciunt, iecoris cauum per vētrem vacuant. Flos eius à drachma vnā ad aureos duos Meſuæ idem pollet.

Epithymum datur drachmis quatuor cum ſero lactis aut mulſa ad purgandum humorem melancholicum. Meſuæ verò ad humores aduſtos melancholicos, pituitam datur puluis à drach. tribus uſque ad ſeptem: decoctum autem à drach. quinque uſque ad viginti datur melancholicis: & pituitofis ab oxybaphi menſura ad drach. quatuor. Actuario autem ſcrupulorum quinque pondere. Quantum verò variet Græcorum & Arabum epithymum lib. primo dictum abundè eſt. *Lib. 14. meth.*

Scammoniū Meſuæ cholagogū datur à granis quinque ad grana duodecim, aluum reſoluit duobus obolis ſumptum: drachina autem vnā aut obolis quatuor cum aqua vel mulſa ſumprū per inferna bilem & pituitam extrahit. Modus ſcammonii ſcrupuli duo, plus paulo, aut minus pro viriū ratione. *Dioſc.*

Polypodiū cum gallina aut piſcibus coctū datur ad aluum ſoluendā, & bilem atram pituitamq; detrahendam Dioſcoridi: nō expreſſo tamen pondere, vti nec Galeno lib. 13. methodi, qui in ſimplicibus purgatorium non facit. Meſuæ datur ad bilem nigram & pituitam craſſam à drach. duabus ad drach. ſex: ſenis ſcrupulis cum mulſa datur Actuario. *Dioſcor.*

Veratrum nigrum vtranque bilem vacuat ſcrupulis tribus, aut paulò pluribus, vel paucioribus. Meſuæ etiam vacuat pituitam præter vtranque bilem, à ſiliquis ſex ad partem tertiam drachmæ vnus, vel ad drachmā vnā, qui modus Actuario conſentit, licet magnum ſit intervallum in hoc ſimplici à ſcrup

scrupulo vno ad scrup. 3.

Mefuæ doses recentium medicamentorum. Rha barbarum cholagogū & phlegmagogum datur puluere à drach. dimidia ad drach. vnam & semissem. Infusum verò à drach. vna & dimidia ad drach. duas : vt mendosus sit locus hic Mefuæ à drach. vna & semisse ad drachmas decem: sic enim nunquàm scripsisse videtur.

Casia fistula ab vncia dimidia ad fescunciam.

Mefues. Tamar Indi cholagogi ab vnciis duabus ad vncias quinq; ob imbecillam eorum actionem.

Manna cholagoga ab vncia vna ad vncias tres nobis : Mefuæ à drach. sex ad fescunciam tantum datur, fortè quòd nostra sit imbecillior, aut etiam adulterata.

Turbith phlegmagogum Mefuæ datur puluere à drach. vna ad duas: infusiõe autem à drachmis duabus ad drachmas quatuor.

Cassia cholagoga & phlegmagoga datur à semuncia ad fescunciam, modum eius Mefues præterit, opinor quòd innocentissima est etiam largiore mensura.

Senna bilem adustam & melancholiam vacuat ab aureis tribus ad vnciam vnam Mefuæ. Lapis stellatus seu cyaneus idem pollet, & Armenus non lotus à semidrachma ad sesquidrachmam : lotus à drach. vna ad drach. duas Mefuæ & Alexand. Trall.

Hermodactylus phlegmagogus ab aureo vno ad duos.

Quæ alia scribunt Dioscorides, Mefues, purgatoria partim sunt clementissima, partim ob vehementiam hodiè à Medicis damnata : quæ omnia fusiùs & doctiùs explicauit Ioannes Tagaultius commentario secundo in Mefuæ simplicia, quæ causa facit, quòd minùs diu hic immoradū existimem: præsertim quòd ex his quæ vires habent minùs vehementes, neque corpori noxias, mensuram si paulò velaugreas vel minuas, nihil peccabis, siue medicamentum componis, siue exhibes iam compositum aut simplex. Valentioribus verò aliis rarissimè vtamur: cucumere agresti, tithymallis, & lactariis aliis, quibus multis vim purgatricè tribuunt Dioscorides & Mefues, quæ percensere scientes omittimus. De his aliàs plenius dicturi, cum simplicia solis pharmacopolis explicabimus, nò etiam medicis. Qui labor post hunc secundus mihi est propositus, vt ea scilicet fusiùs declarè, quæ ad pharmacopœorum

pœorum artem magis pertinent, ea supprimam, quæ illos ro-
uisse est sæpenumerò perniciosum, dum in messem Medico-
rum falcem suam mittunt, & pharmaceuticen iniquissime
exercent maxima mortalium pernicie.

Hydromeli cui incoctum sit absinthium tenues succos in *Lib. 7. metho.*
ore ventriculi contentos, commodè deorsum impellit.

Empetron ad solas pituitæ & bilis purgatiões videtur esse *Lib. 6. simp.*
accommodum.

Absinthij coma pota bilem ex vētriculo deturbat vt aloë: *Lib. 6. sanit.*
pituitosum verò succum ventri magis affigit, cum detergen- *tuenda.*
di vim non habeat absinthium insignem. Nec aloë valde his
conducit, quòd ei bilis trahendæ sit facultas: ob id salubriter
excogitata est compositio hiera picra, quæ acrimonia calore
cinnamomi, & aliorum quæ continet crassos & lentos succos
dissecat ac deterget.

Ius galli veteris pituitam & melancholiam magna men-
sura sumptum ad lib. tres Mesuæ, cui nullus ventriculus fuisse
cerit. Eius parandi ratio est apud Alexand.

Terebinthina resina sumitur aliquando nucis ponticæ, id *Lib. 5. sanit.*
est, auellanæ magnitudine, aliquando duarum triúmve: hodie *tuenda.*
à drach. vna ad drach. quatuor vel quinque exhibemus, vel
bolo cum puluere glycyrrhizæ, vel cum pulueris rha barbari
drachma vna, quando drach. resinæ tres rarò excedimus, vel
potu ex decocto cicerum vel eius loco aquæ illius aut olei de-
stillando separati vnc. dimidiam cum vino albo propinamus
nephriticis, purgatis priùs venis primis & ventre reliquo.

Diacnicum sumitur, vt dixi, duarum triúmve caricarum *Lib. 5. sanit.*
magnitudinis modus, quem legitimū in omnibus talibus ex *tuenda.*
ipsa experientia inuenies, cum venter aliis magis, aliis minùs
sit medicamenti obediens.

Mensura diacodij siue cum sapa ad somnū conciliandum *Lib. 7. c. ph. p.*
in catarrho acri & tenui, siue cum melle ad sputum promo-
uendum, quæ mediocris est duorum cochlearium iustæ ma-
gnitudinis, augēda & minuenda pro ætate, regione, parte an-
ni: vt si hæc frigida sint, minus eius detur: sin calida, plus &
ad defluxionis quantitatem & qualitatem respiciens, plus mi-
nus exhibe. Quod præceptum præsidii omnibus est còmune.

Non easdem vires habent antidota, si ante deleteria & post *Li. 1. antidot.*
ea sumantur. Ob id si quis quotidie ad præcautionem sumat
antido

antidoti theriacæ, vel alterius similis fabæ Aegyptiæ quantitatem, sufficit: post sumpta aut deleteria quadruplo aut quintuplo aucta detur, & bis quotidie, non tantum semel.

Lib. II, simp. Aescrion morsis recenter à cane rabido dabat per dies quadraginta quotidie cineris cancrorum fluuiialium vstorum cochlearium magnum: iamdiu autem morsis duo cochlearia.

Lib. the. ad Pison. Quantum tribus digitis capi potest nilui pulvis cum aqua potatur. Aliorum tam simplicium quam compositorum mēsurā, pondus, numerus adscribi hīc posset, nisi infiniti propē esset operis, & parum necessarij, præsertim cum in compositis libro quarto horum partis maximæ dosi declaranda sit: & cuius, liceat ex probatis authoribus exempla plurima proferre. Numerum autem in remediis quibusdam, ut catapotiiis, ramis exquisitè obseruari ridet Galenus: quod addunt nonnulli volentes auxilium agere nō temperamento, sed mirabili quodam naturæ cōsensu hominibus incognito. Quem consensum in his quæ tota substantia agunt, cum Galeno recipimus, sed constitutum in elementorum mīstione nobis sola experientia cognita, non in numero.

TEMPVS SVMENDI VEL ADMO- VENDI MEDICAMENTI.

DVo igitur nobis præcipuè supersunt declarāda, ad vsum rectum medicamentorum necessaria, vtendi modus, & temporis occasio. Quæ cum magnarum sit virium, non in remediis tantum medicis omnibus, sed aliis etiā cunctis in rebus, ut poëtæ ac philosophi fide bona testati sunt. Pro dignitate nobis est tradenda, ut intelligat Medicus, quibus sibi sit opus ad rectè vtendum temporis occasione in medicando, & si vis, in cæteris quoque remediis.

Finis vsus medicamentorum est, ut affectum è corpore præter naturam profligent, siue morbus sit, siue causa morbi, siue symptoma, siue duo ex his, siue omnia simul, siue morbus omnino factus est, siue nondum gigni cœptus, sed in procinctu ut fieri incipiat, siue partim genitus, partim adhuc in gignendo, & partim generandus, siue is affectus sit intemperies aliqua, aut incommoderatio, aut solutio cōtinui. Cum igitur medicamentorum vi siue purgante, siue alterante, siue glutinan

glutinante, vel aliud quiduis affectibus præter naturam curandis necessarium præstante, affectus ipsos ex corpore ægro vel neutro expulimus, finem vsus medicamentorum iã consequuti sumus: modò id fecerimus nullo aut saltẽ quoàd fieri potest minimo virium incommodo, quas ostendunt integras aut minimùm læsas substantiæ triplicis nostræ spirituosæ, carnosæ, solidæ iusta quãtitas & proba qualitas, actione inculcata æstimandæ. Ne scilicet nobis probro obiiciatur, morbũ quidem sanatum esse, sed ægrum aut mortuum, aut mortuo simillimum esse redditum, aut in alium incidisse affectum ex nostra curatione lethalem, aut priore peiorem, vel non minorem: cùm Medici munus sit, vt dixi, citò, tutò, iucundè curare: aut si omnino curare nõ possit, saltẽ leuiorem reddere morbum, aut non augere, neque contrarium affectum inducere. Quod his sæpe accidit, qui nulla methodo curant affectus planè nõdum cognitos, ignorata etiam parte in eo affecta, ne addam per remedia, quorum vires omnino ignorant: In vitium enim ducit vitij fuga, dum caret arte.

Porro affectus præter naturam è corpore citiùs, tutiùs, minore ægri molestia pelluntur, vel cùm nondum radicauerunt, vel cùm iam victi à natura fuerunt: quomodò plantæ omnes ortu primo etiam parua digitorũ duorum vi promptè euellantur: vbi autem radices altiùs egerunt, ne multarum quidem manuum violentiæ diuturnæ cedunt: sic principio morbi remediis clementibus tolli possunt, nisi ea sint natura, vt etiam principio ardeant, et sæuiant. Vbi autem in naturam nostram diutiùs egerunt, remediis quantumuis generosis non vincuntur, vt sæpe ferro sit opus & cauterio. Quomodò item cùm agricola omnes magnas arboris radices concidit, terra ligonibus effossa, fessus is vires interdum alterius requirit exiguas, quæ arborem prosternant: sic victo à natura morbo, nondum tamen ob lassitudinem ipsius profligato, adiutrices Medici manus postulat. Quæ alioqui solet quem vicit morbum per se profligare, vt arborator arborem: quando autem certamine aut longo aut vehemēti contra morbum longum, magnum, malignum, ipsa etiam priùs haud ita valens, fuerit fracta, tunc auxilio eget nostro, nisi antè succumbat, etiam nobis eam adiutantibus, sed planè victam, cadibundam, & moribundam.

Cùm

Aph. 2. & 23.

& 25. lib. 1. &

Aph. 2. & 3.

lib. 4.

Cum autem purgatio sit humorū sua qualitate molestantium facta vacuatio, vomitu, aut potius deiectione, si talis humor vel à natura, vel à Medico eius imitatore vacuetur, qualem abundare indicat morbi nō modò præsentis, sed aliorum quoque consuetorum natura, ægri ætas, tēperatura, vitæ conditio, habitus, consuetudo, victus ratio, pars anni, regio, præfens cœli status, confert talis vacuatio, estque ægro toleratu facilis: vt si bilis flaua calidis siccis prædictis omnibus, pituita iisdem frigidis humidis vacuetur. ab his igitur ipsis & aliis humorem in corpore redundantem demonstrantibus (quæ in semiotice latius docuimus) qualis humor sit purgandus, coniectabis. Qualitatis signa hæc sufficiant nobis ad eligendū qualem noxium humorem nos vacuare oporteat. Quantum autem sit vacuandum humoris eius noxij, tolerandi facilitas nobis indicabit: & si talia deiiciantur, qualia deiici opus est, quòd scilicet superabundante vacuato humore, æger seipso fiat leuior; & morbum melius ferat. Si enim humor aliquis naturæ adhuc familiaris vacuetur, vires soluuntur & læduntur. Item si plurima & repētina fiat vacuatio, etiam corruptæ materiæ: nam omne nimium & repentinum naturæ est inimicum. Antè tamen coniectura quadam artificiosa ex morbi ac causæ eius magnitudine, ægri natura, proprietate, viribus, ætate, habitu, consuetudine, aëris temperie, & medicamenti viribus præsumendū est, quanto purgante remedio (vt idem in cæteris auxiliis intelligas) tali vt catholico, cassia in tali tēpore, morbi talis, à tali & tanta causa, in hoc aëre, hoc corpore sit opus. Quam coniecturam feliciorem tibi reddent probatæ iamdiu doses, & mensuræ dandorū medicamentorum, tam simplicium (de quibus paulò antè) quàm compositorum (quas lib. 4. dicemus.) In his enim minimam & maximam medicamentorum mensuram inuenies: illam omnibus dictis causis paruum requirentibus vacuationem: hanc contrariis, in vtriusque medio collocatas causas pro vicinia aut recessu extremarum coniectabis: in omnibus tamen tutius est à minoribus incipere, & pro effecto augere vel minuere.

Aliarum autem vacuationum, vt eius quæ phlebotome sit, quantitatis idoneæ signa præter hæc sunt alia, vt coloris sanguinis mutatio, in phlegmonis sectæ venæ propinquis, pleuritide, synanche: vt animi deliquium ex multa vacuatione in maximis

I. i. 9. method.

maximis phlegmonis, in adurentibus febribus, in vehementissimis doloribus, si vires prius erant integræ & valentes.

T E M P V S . P V R G A T I O N I S .

ALiméntum quoque, alioqui naturæ amicum ad suas vires tutandas, prohibetur in accessionibus, & aliquandiu ante accessiones, nisi virium imbecillitas adsit (tunc enim omni tempore cibandum) multò magis per ea tempora à medicamentis naturam omnino alterantibus & inanientibus, ob id plurimum infirmantibus, est abstinendum, si tamen febris sit aut continua aut intermittens, sed cum longissimis accessionibus, tempus est deligendum in accessione mitius, aut aliquandiu ante accessionem, vt aliménto dando, sic medicamento exhibendo. In febribus verò intermittentibus si vnum saltem diem cessent, eo purgandum est, non die accessionis: si duos dies, obseruandæ sunt vires, quas reliquit accessio præcedens, & accessioni succedens per sudorem vel aliud vacuatio. Si enim fractæ multum videantur, priore illo die sunt reficiendæ, postero vacuandum: sin erunt robustæ, & nulla post accessionē insignis facta est vacuatio per sudores, vrinas, vel aliter, neque accessionis vehementia immodicè naturam alterauit, priore intermissione die purgandum, vt simul accessionis præcedentis reliquias vacues, quæ febrile in corpore aliquid fouent, & accessiones anteuertere compellunt, & sequuturis accessionibus materiam adimas.

Tempus autem idoneum dandi medicamento præcipue ostendunt, motus naturæ (leuiores enim plurima à quibusdam traduntur) vel morbi, vel vtriusque, adhæc ægri vires, & æris conditio, & quæ præcesserunt, vel adsunt, vel impendent spontinæ vel nostræ vacationes. Cum nanque natura integrè ac perfectè crisi ipsa non vacuauit, vel nō vacuat noxiam materiam, quod deficit addet medicus vel medicamentis, vel aliis remediis, ne à reliquiis ipsis recidiua excitetur: vacuabit autem naturæ motum imbecilliolem adiuuans, si is per partes idoneas vacuabat, vt per nares hæmorrhagia, si ex nare fluat lateris dolentis, si quod fortè dolebat: per intestina, fluore alui: per vterum, per hæmorrhoidas venas, per vrinarium meatum, per poros cutis, promouendo ad has partes vacuan-

*Aph. 11. & 19.
lib. 1.*

Lib. 9. meth.

Aph. 20. lib. 1.

Aph. 12. lib. 2.

Aph. 21. lib. 1.

da. Si verò natura deprauatè mouet excremēta, vt ad pulmo-
nem, thoracem, cor, vel aliam partem principem, vel effluxu
libero carentem, tunc quia maius damnum est sequuturum,
hunc naturæ morū prohibebimus, & ad contraria transfere-
mus & auertemus. Deprauatus etiam est naturæ motus, si
ante coctionem symptomaticè vacuat: nam concocta medi-
cari oportet: si verò etiam iusta crisi immodicè moueat, mo-
tus eius est inhibendus, in contrarium reuellendo.

Aph. 11. lib. 1.

Aph. 24. li. 1. et

Aph. 10. lib. 4.

Aph. 22. li. 1. et

lib. 8. c. ph. p.

Aph. 29. lib. 2.

Aph. 30. lib. 2.

Aph. 29. lib. 2.

Morbi quoque motus vel celer in acuris, vel errabundus
etiam in aliis, in principio crudam adhuc materiam vacuari
interdum permittit: in acuris enim morbis raro & cum præ-
meditatione, sed in principio medicamētis purgantibus vt en-
dum, in aliis verò concocta medicari oportet non cruda, nec
in principiis, modò non turgeant: si enim turgeat materia, &
ad excretionem tendat, vel in nulla parte firmam habeat sta-
tionem, etiam initio purganda, non expectato eius in partem
aliquam decubitu, quem postea vincere non fuerit facile.
Dum enim tales morbi inchoant, vacuanda est hæc materia,
sed clementiore medicamento: nec minus in principiis mor-
borum salubrium, si magna est cacochoymia, vacuandum est,
vt reliquam materiam parciolem facilius natura percoquat.
Huc pertinet quòd symptomata etiā vires prostermentia cir-
ca morborum initia, vt etiam in declinatione, sunt mitiora.

Eadem verò quia in morbi vigore sunt valentissima, & vi-
res multum prostermentia, ob id dum morbi consistunt, à pur-
gantibus medicamentis abstinendum est. Non modo autem
in vigore vniuersali à medicamentis abstinendum, sed etiam
in particulari, atque adeo particulari principio: si enim est in
accessionibus ab alimento, vt pote nocituro (quia naturam à
coquēda morbi causa ad alimenti coctionem auocaret) absti-
nendum multo magis à medicamēto. Porius enim die est in-
termisionis vacuandum, quòd si accessio vel longissima sit,
vel continua, medicandum, vt paulò antè dixi, quado morbus
est mitior: si autem sit febris homotonos aut anabatica, initio
potius medicandum, viribus adhuc integris, & materiæ co-
quendæ copia naturæ subtrahenda. Tunc enim dandum est
medicamentū, cum vires validæ id in actum ducere possunt,
& materiam nondum fixam expellere ad medicamentum at-
trahens, & talem ac tantam vacuationē ferre, qualem hoc est,

*Aph. 2. 3. et 25.
lib. 1.*

cuius

eius humoris scilicet noxii, & quantam medicamentum hoc facturum coniectura per experientiam longam firmata, colligimus. Deiectiones enim non multitudine sunt æstimandæ, *Aph. 3. lib. 4.* sed si talia deiiciantur, qualia pro morbi natura, ætate, parte anni præcedente victus ratione deiici oportet, & ægri facile tolerant. Neque enim semper optatiora sunt medicamenta, quæ multam faciunt etiam noxiæ materiæ vacuationem, nisi æger tantam vacuationē facile toleret. Plurimum enim atque *Aph. 51. lib. 2.* repente vacuare, vt replere, malum: quod omne nimium & *Aph. 27. lib. 6.* repentinum naturæ sit inimicum. Ob id etiam Hippocrates empyis ipsis pus, & hydropicis aquam vniuersim euacuare per sectionem vel vstionem thoracis & ventris cauit, quia alioqui omnes moriuntur. Ab aëre autem sumpta indicatio medicamenti hoc tempore dandi vel non dandi postea fusius tractabitur, & antea obiter est perstricta.

Cum igitur circa initia & fines morborum symptomata, *Aph. 30. lib. 2.* accessio, vigilia, dolor, sitis, cibi fastidium sint imbecilliora, vt morbus horum causa est mitior: cum verò morbi in suo vigore consistunt, dicta symptomata sunt fortiora, & tunc natura coctioni materiæ vacet. Purgandum aut initio morbo- *Aph. 29. lib. 2.* rum est, aut sub finem vniuersalem morborum, aut vtroque *Aph. 10. lib. 4.* etiam tempore: Initio quidem, vt minorem iam redditam materiam possit natura facilius coquere.

Medicari etiam in valde acutis, si materia turgeat, eadem *Aph. 24. lib. 7.* die: tardare enim in talibus malum est.

Item in acutis morbis si materia turgeat, ea est in principio purganda, cum maius commodum huius materiæ febrē committentis vacuationē sequatur, quàm incommodum ex aucto calore per medicamēta purgantia, quæ omnia sunt potestate calida: si verò multus illis crudus succus inest, vel crassius, vel lentus, à quo hypochondria inflectur ac tendantur, vel immodicè caleant, aut sit viscerū inflammatio, in his periculosa est purgatio in morborum acutorū initio, sed prius humores noxii, crassi, lenti sunt tenuandi, incidendi, tergendī, ad fluxū parandi, & liberandæ sunt obstructions, aperiendiq; meatus, per quos est humor à medicamento purgante trahendus, & transmittendus, faciendaq; vacuatio, vt in morbis longis tales causas sequētibz fieri cōsuevit, & quibusdā acutis: nam acutissimi nō dant horū auxiliorū inducias. Corpora enim cum quis *Aph. 9. lib. 2.*

purgare volet, oportet fluida facere, citra quam operā si purgare vomitu aut deiectione coneris, difficilis fit purgatio cum torminibus, vertigine, multo fastidio, pulsu malo, dissolutione viriū & difficultate, ac rofione ibidem: quia omnes succi crudi sunt pigri, & ad motū inepti, ob crafsitudinē & frigiditatē. Quo fit, vt vias omnes anguftas etiam obftruat, per quas id quod medicamentū deiicit, ferri ad aluū debeat, ac ita nec ipfi educantur, & aliis fint impedimento, lib. 4. fanit. tuendæ.

Aph. 22. lib. 1.

Aph. 20. lib. 1.

Concocta nanque medicari & purgare oportet, non cruda, nec in principiis, nifi turgeant: plurimæ verò materiæ non turgēt, fed firmatæ sunt in parte aliqua, quas ante coctionem neque medicamento, neque aliter mouere expedit: vbi autem cocta erit, vacuanda, quia tunc naturam habemus euacuationi adminiculantē: hæc enim coquendo fecernit, poſtea excernit ſuperflua, & crifes facit, quas ſi perfectē agit, ſinenda eſt: ſi imbecillius, iuuanda, & quod de legitima noxiū humoris vacuatione deficit, à nobis ſupplendum medicamento purgante, humorem ſibi proprium trahente, & natura eundem expellēte, aut alia vacuatione feliciter à natura incœpta, & per loca conferentia, ſed non abſoluta. Eam autē vacuationem abſoluimus, quia quæ ex morbis poſt criſin relinquuntur, materiæ humorū noxiorum in corpore, recidiuas febres facere conſueuerunt. Cū enim alieni ſint à natura, nec nutrire poſſint, corrumpuntur & putrent, idq; celerrimè, quòd ſint in loco calido: ante verò putredinē appetentiam proſternunt: ſi in ventriculo collecti ſint, aut corroborari corpus, etiam ſi alimentū idoneū aſſumat, qui ex morbo illo reualuit, prohibent, & quo plus alimenti ſumit, tanto peius habet, quòd corpora non pura quanto plus nutries, tanto magis lædes.

Aph. 8. l. b. 2.

Aph. 10. lib. 2.

Ex quibus apparet, initio morborum purgandos eſſe noxios humores, vel qui ventriculi ſpatium occupant & inteſtinorum, & ſi vis primarum venarum, modo impacti eis valentius non ſint (qualis multus eſt harum regionum frigidarum hominibus voraciſſimus) vel qui motu errabundo huc illuc per corpus incitati feruntur. Tales enim ambo facilè à medicamento etiam clemente, vel ducuntur, vel trahuntur: vt neque contingāt dicta prius ſymptomata difficilium purgationum, vertigines, tormina, lipothymia: neque morbus augeatur. In id enim blandioribus, vt caſſia nigra, hiera picra,

era, & similibus utimur, quorum vis ultra hepar non fertur, aut non multò ultrà.

Purgandum secundo in fine status vel declinatione morborum, cocta iam materia & coepta à natura expelli, sed ob virium eius lassatæ imbecillitatem nondum omnino expulsa. Quam vacuationem etiam tentare licet, simul dum natura crifum mouet imbecilliter, ut geminatis motibus, naturæ & medicamento, perfecta tunc fiat noxiæ materiæ vacuatio, eaq; per loca conferentia.

Sic hieram dat Galenus in phlegmone vètriculi post ipsius declinationem, nullo phlegmones ipsius tempore, modo non turgeat materia, neque ad excretionem impellatur, & nullam adhuc firmā inclinationem ad vllam partē habeat, aut stationem. Purgantia autē succos crassos & tenaces ut pituitā & melancholiam, facilius paulatim & sæpe purgant, intereā tenuatos, incisos, deterfos, quàm affatim: sic enim corpus exagitur, & solum tenue & aquosum vacuatur: Alexāder Trallianus in cephalalgia à crassis & lentis & frigidis humoribus, & iterū in podagra phlegmatica. Sumpto autem medicamento purgante modicè corpus ambulatione mouendū, ut celerius descendat, quod sumpta hiera præcepit Galen. & sumpto elleboro, Hippocrates Aph. 14. & 15. lib. 5.

Lib. 8. c. ph. p.

Lib. 7. meth.

Postquàm autem assumptum est medicamentum purgatorium præsertim validum, ptissanæ cremorem sorbendum dat Hipp. lib. 2. rat. viēt. acutorū, ut quæ portio medicamenti gulæ & stomacho adhæsit, tergeatur, & deorsum trahatur, & alteratio à medicamento in dictis partibus facta corrigatur. Vbi autem fieri inceperit purgatio, negat dandam ptissanam, ne vis medicamenti exoluatur. Hodie quoque quod lauatorium vocant, ferè horis tribus à sumpto medicamento exhibent, hora circiter vna ante pastum.

Lib. quos med. purg. oportet.

Si verò medicamentum vel nihil egerit ob naturæ ægri proprietatem, aut medicamenti imbecillitatē, aut portionem exiguam, aut intestina stercore duro per clysterem prius vacuando obstructa, aut magnū naturæ impetum celeriter medicamentum deturbantis, vel non reducentis in actum, vel ob causas contrarias immodicè mouerit: singulorū remedia habes in canonibus Mesuæ. Quòd si retineatur, & clemens fuerit retentum, præterquàm corpus non lædit, animalis fit ali-

mentum. Valentia verò lædunt si retinentur, & in qualitatē deleteriam & venenosam vertuntur.

*Lib. 4. sanit.
tuende.*

Purgantia vomitū interdū ieiunis dantur: sic Philotimus & Praxagoras crudorum succorum copiam ex ventriculo & primis venis vomitū vacuabant, data largiore mulsa cui incoctum erat hyssopum, quā etiam hi succi crudi ante vomitū sunt tenuandi & coquendi, & si qui etiam post vomitum superfunt: modò cum crudorum succorum copia, neque humor mordax sit extra venas lassitudinem vlcerosam faciēs, neque alius affectus vomitū illum impediens: nam eo acres humores per halitum digerendi intra venas in corpus intimū traherentur. Vomitum etiam impediunt hyems, Aph. 6. lib. 4. phlegmone vetriculi & partiū vicinarū, phthisis Aph. 8. li. 4. dolor capitis, quia id vomitus replet, ob id dānatus Asclepiadi: si quis item ægrè vomit, non est cogendus, aut paulatim ad vomendum victu humectante est parandus, vt Aph. 13. lib. 4.

Li. 1. loc. affec.

*☉ Aph 6. ☉
7. lib. 4.*

Lib. 5. vsus partium.

*Sic fotū aque
calide in pun-
cturā neruidam-
nat Gal. lib.
6. method.*

Vomitū etiam purgantur corpora post cibum, non quemuis, sed falsum, amarum, acrem, seu incidentem, tenuantem, tergentem. oxymelite autem cum succo raphanidis misto, & multò largiore quā potus, aut deiectionis gratia sumpto, facilius & promptius fit vomitus, adhæc efficacior: nam qui ex aqua tepida vim retentricem ventriculi dissoluēte, & corpus eius à frigido concretum velut resoluente fit vomitus, etiam si vinum dulce superbiberint, tantum vacuat, quæ in eius capacitate innatant, non etiam quæ tunicæ eius internæ hærent, multo minus quæ altius in tunicas ipsas recepta sunt & impacta: Ad quæ vacuanda, hieram picram Galenus docet esse efficacissimam.

*Lib. 6. sanit.
tuende.*

Vomitū etiā bis in mense Hipp. lib. de somniis ægrorū. Post vacuatū ventriculum vel bile flaua in ipsum cōfluentes, vel etiam in ipsius tunicas alius imbibito excremento, illa per comam absinthii, hoc per hieram picram, ventri admove foris vnctiones modicè astringentes, vt melinum æstate, nardinum hyeme, mastichinum vere. id enim medium est inter melinum, quod frigidum est, & vnguentum nardinum, quod calidum, potissimum cum amomū liberalius immissum habet. Qui locus etiam indicationem ab aëre ad vsum rectum medicamentorum conferre declarat.

Astringentia primis epulis sumpta aluum cohibent, post cibum

cibum ingesta aluum soluunt. Causa huius est libro 6. sanit. tuendæ, & 1. lib. & 2. alimētorum. Qui verò thorace sunt angusto, & ob id pulmone contracto inepti sunt vomitoriæ purgationi, præsertim per elleborum album. Vas enim vomendo sibi ruperint in aliquo respiratiōis instrumento. Quòd si alius elleboro purgandus est, cibo & quiete corpus antè humectetur, & vomitui assuefiat.

Fiunt quoque purgationes vti & phlebotomæ interdum ad præcautionem morborum impendentium, non præsentium curationem: vt cùm quis vere ineunte corpus vacuat, vt à vernis morbis aut æstiuus sit liber: vt autumno, vt vitet autumnales morbos ac hybernos. Eadem ratione si quis in spontanea lassitudine morbum aliquem prænunciantem vacuet, morbum perfici prohibet. Item si quis noxiorum humorum ex morbo præcedente reliquias vacuet, vt recidiuū morbum prohibeat, vt prius dictum est: sic dum plethoricum & optimū corporis habitū vacuumus vt corpus ipsum nutriri rursus incipiat, & ne calor natiuus suffocetur, aut vasa præ copia rumpantur. Aliàs sanos ipsos nunquā medicamur, quia medicamenta difficulter ferunt, & vertigines ac tormina patiuntur, & ægrè his purgatio procedit, & celeriter exoluuntur.

Aph. 5. lib. 2.

Aph. 3. lib. 1.

Aph. 36. & 37.

lib. 2.

Phlegmones initio sola repellentia, augmento miscenda coquentia, statu digerentia, quibus solis in declinatione vtendum. Eadem ratione in morbis aliis à fluxione prodeuntibus, nisi fluxio eruperit in partes principi alicui parti, vt cerebro, cordi, hepatis, ventriculo propinquas: aut nisi materia sit venenosa & pestilens: aut nisi materia crassior, glutinosior, impactior, profundior, vt in pleuritide, ischiade. In horum enim affectuum initiis anodynus vtimur, post coquentibus & digerentibus, habita prius ratione totius corporis, si vacuatione egere videbitur.

Hæc de temporibus vniuersalibus & particularibus morborum, quibus medicamenta sumi vel adiuuari possint, sufficiant, reliqua ex methodo repetantur.

Tempus aliud quoque spectandum est in recto vsu medicamentorum, non morbi quidem, sed motus primi mobilis respectu, quod propriè & absolūtè tempus dicimus, & ab eo partes anni & diei.

Lib. 7. meth.

Cùm morbus dat inducias & delectu habito purgamus, siue morbi initio, siue cocta iam materia (vt diximus) ferè purgatoria damus medicamenta, cùm ventriculus hesterno cibo est vacuus, hoc est, manè. Quod tempus intellexit Galenus, cùm dixit, hiera picra dabitur solito purgantium medicamentorum tempore. quanquàm in libro quos medicamentis purgare oporteat, & qualibus, & quando, temporis huius non meminit, nisi in ea operis parte, quæ desiderari videtur, id addiderit. Quem verò librum de compositione purgantium medicamentorum promisit libro 1. comp. ph. part. adhuc desideramus. Cumq; catapotia dedit ex aloë & hieram diacolocynthidos bis initio lib. 1. comp. ph. part. temporis huius nullam facit mentionem, tanquam id omnibus notissimum esset, prætermittens. Id tempus etiam hodie seruamus, quoties siue ad curationem, siue ad præcautionem corpus est purgandum porione, vel bolo (vt vocamus) vel tesserris saccharatis & scammoniatis.

Si verò catapotii purgandum, magna ex parte media nocte læuissimè cœnatis, aut post primum somnum ea dantur, vacuo iam (vt videri potest) vētriculo, vt in eis ad actum reducendis solis occupetur. Quæ res ei est difficilis ob crassitatem & duritiem, ob id orobi magnitudine & molliora facimus, cùm citò vacuare libet, & minore ventriculi molestia. Nam crassa & dura, vt diutius agant, vtq; potētius à corpore toto attrahant, si ea vi sunt prædita, tamē crassitie & duritie, & mora longiore ventriculo molestissima esse cōsueuerunt.

Cùm verò tantum ventrem inferiorem, ventriculum, intestina, ac venas primas purgare libet, etiam hora vna ante vel post epulas damus leuiora quædam cathartica, vt catapotia Rufi, & mastichina, & ex aloë, & quæ ante cibum vocant à consueto vtendi tempore: item cassiam nigram. Quæ etiā minore mensura largius purgare videntur, quòd secum cibum prope omnem ac potum deturbent. Quibus item aluus natura aut euentu aliquo est astrictior, his succurrimus datis duabus drachmis cassiæ huius, aut circiter paulò ante tres passus, idq; singulis hebdomadis, si opus est, repetere suademus magno ægrorum comodo.

Quibus hepar est calidius, his hora vna ante matutinum purgantis medicamenti vsum propinamus, ptissanæ vel alterius

rius similiter refrigerantis & humectantis cyathos duos, vt pars in melius alterata minus à medicamēto mutetur: & horis quatuor à prādio vnc. duas syrapi rosati, vel similis exhibemus, præsertim aëre calido: aut ante cœnā, aut horis duabus vel tribus à cœna medicamentū idem damus, hepate iam per alimentū temperato. Qua ratione iisdē exercitationē (si qua aut celeris, aut robusta, aut vehemēs est obeunda) ante cœnā suademus & venerem, si sint vxorati, innocentiorē eis paulò ante cœnā aut ante mediā noctem cūm prædixissemus, experientia verissimū comprobarunt: & falsa aromataq; summa mensa vinumq; generosius & meracius innocenter magis ferunt, quā primis epulis. Hac de causa enim quietem, hoc est, leuiculam mutationem, qualis est ambulatio, calidæ naturæ præcipit Hipp. Hac opinor ratione Veneriis & Italiæ magna parte, & calidis aliis regionibus medicamenta scammoniata præbent vel paulò ante cœnam, vel horis duabus à cœna, vt cibo potuq; vis eorū vehemens inducta mitescat, & secum quæ in ventriculo & primis venis pigrè cessant, trahat. Quam rem largissimæ deiectiones sequantur, & parua ægri molestia, quam profectò calidæ siccæq; naturæ maiorem experirentur, si in vacuum ventriculum, hepar, venas calentissimum id medicamentum feratur.

In his verò frigidis regionibus & pituitosis maxima parte naturis non ab aëris natura modò, sed in expleta ingluuie, à purgantibus scammoniatis ventriculo hesternæ cœna vacuo non timemus, quòd in eo larga adhuc pituita & fluitet, & hæreat, & aliùs imbibita sit. Ob id ferè matutinum tempus purgationi destinamus, horasq; duas, tres, quatuor inter medicamentum & epulas interponimus pro medicamenti facultate & ægri natura. Nam scammoniata non multò pòst quā sumpta sunt, vacuant, egentq; primū in iusculo, quod ipsa celerius per intestina deiiciat, & noxam partibus imperitiam eluat. Rha barbarum verò cūm tardiùs agat, longius sibi tempus postulat ad trahendum, neque cito de corpore pellendum: quia tantum abest, vt visceribus obsit, vt etiam sua vi astrictoria (quam cum purgante coniunctam habet in diuersis scilicet substantiis) firmiora reddat.

Vbi autem morbi non expectati violentia vrget, quocūq; tempore is vacuationem postularit, si ea perfici possit, & vi-

res ferre queant, à nobis imperatur etiā vehemens, quòd extremis morbis extrema exquisita remedia sint optima: & in talibus morbis à vehemētissimis sit incipiendū, nō quomodo in clemētioribus à leuibus remediis curatio initur. Quomodo vlcus omne remedia siccātia morsus expertia requirit: quę verò maligna sunt vlcera & putrida, acribus egent, & ignis modo exedentibus, misy, chalciti, arsenico, calce, sandaracha.

Lib. 2. ad Glaucon.

Lib. quos medic. purg. oportet.

Lib. de curat. morb. per phlebot.

Partes quoque anni temporis appellatione venientis aliquid etiam ad purgationes vtile indicant. ob id veris initio pituitam siue bilem flauam, & autumnio atram, ad vitandos vernos, æstiuos, autumnales, & hybernos morbos purgare, & venam secare cōsuevit Galenus, non æstate nec hyeme: nam æstate corpora calidiora & sicciora, & ab aëre ambiente dissoluta, medicamētis purgātibus & sanguinis vacuatione maximè lædūtur, quòd illa calfacit, siccāt, infirmit, ac dissoluit, hæc inanitione virium substantiam dissipat: hyeme verò excrementa concreta ad motū pigra medicamento trahenti dū non parent, lucta in corpore torminosa sit & molestissima, cui etiā lipothymia sæpe succedit. Phlebotome verò aëre frigido dum calorem natium multum vacuat, & eius pabulū subtrahit, extinguedi reliqui caloris periculum affert ab ambiente frigido. Ob id etiam æstate raris vtimur medicamentis purgantibus, præsertim sub cane & ante canem, vel similem aëris statum, iisq; cholagogis potius & vomitu magis purgātibus, quòd eo bilis tunc largior magis repat. Hyeme phlegmagogis vel melancholiam vacuātibus vtimur magis, & his deiectoriis non vomitoriis.

Aph. 5. lib. 4.

Aph. 4. lib. 4.

Hipp. de natur. hominis.

Aph. 4. & 6.

& 9. lib. 4.

Aliud etiam tempus, astrorum ortu & occasu variū spectare iubent astrologi in vsu medicamentorum apto, quòd tamen hodie Medici propè omnes negligunt, quòd id Galeno obseruatum non legimus, nec obseruandum putamus, longa experientia & ratione optima persuasi. Tamen recipimus spectandas Medico magnas in aëre fieri solitas mutationes circa ortum & occasum magnorum quorundam siderum, de quibus multa Aëtius lib. 3. cap. 174. Alexander item lib. 4. in podagra medicamentum Trachii philosophi dat veris initio, sole Pisces ingrediente.

Est præter hæc tempus obseruandum, diei pars matutina, meridiana, vespertina, nocturna, ante cibum, post cibum, vel alia

alia quædam remedia, vel mox à cibo, vel alio remedio, vel multò post. Cuius magna vis est in quibusdā, quorum postea aliquot exempla leges.

Ad tempus quoque referri potest affectus prior curandus, qui est alterius causa: vt si fluxio à capite in oculos est, caput primùm est curandum, deinde oculorum firmitati est prospiciendum, vt eorum quæ confluunt minus promptè quicquā recipiant. Aliud prætereà tempus ante morbi generationem, dum præcauemus & morbo iam gigni cœpto, aut etiā genito, quando curamus: ad præcautionē enim minor quantitas remediorum requiritur, quàm ad curationē. Ob id the-riaces fabæ Aegyptiæ quantitas ad præcautionem semel die sufficit: venenato autem, vel alio affectu cui hæc medetur, affecto & largior & crebrior danda. Et Aeschriion plus pulueris *Αἰὰ νὰνῖνον* dabat iam diu morsis, minus recenter morsus. Et Galenus microcolis, quibus quod per cutim quotidie transpirat, est acre, lauare semel in die & modicè cum paucō oleo dulci fricare sufficit, cū valent: vbi verò stipata cutis est ab adstringētibus, aut emplasticis, aut siccatibus, sic vt iam inæqualitatem caloris horridam sentiant, vel etiam inde iam febricitent: soluta accessione bis & ter lauat, oleo sabino pinguit & molliter vberius fricat, pro causarum magnitudine & multitudine.

Lib. 7. meth.

Lib. 11. simp.

Lib. 8. meth.

Quædam nullo discrimine ante cibum vel post cibum sumuntur, vt catapotia ante cibum vulgò dicta, quæ etiam post cibum accipi & dici possunt.

Diospolitici puluis cremori ptisanæ, vel aliis aptis inspersus, vel ipsum cum melle optimo & curiosè despumato mistum, sumitur ante & post cibum ad flatu discutiendos, & aluum soluendam, præsertim si nitri tantum habeat, quātum cumini, piperis & rutæ, quibus 4. simplicibus constat.

Lib. 4. sanit. tuende.

Medicamentum dia trion pipereon datur ad flatu discutiendos, & iuuandam coctionem, non semel bis'ue quotidie, sed etiam sæpe: siquidem manè & ante cibum & post, etiam cubitum euntibus cochlearii pleni mensura, & eius quidem parui in paruis corporibus, maximi in maximis, in mediis ad portionem. Vbi indicationem quantitatis medicamenti sumit etiam à quantitate corporis.

Ibidem.

In fine lib. 6.

Diacydonio datur ieiunis mediocris mystri mēsurā, nec à cibo

sanit. tuende.

cibo

cibo sumptum lædit: commodè etiam datur ante cœnam post prandium. Detur autem duabus aut tribus horis ante cibum.

Sic condita electaria, pulueres, & id genus alia roborando vètriculo idonea, modò antè cibū, modò post sumi iubemus.

*Lib. 4. sanit.
tuenda.*

Quæ verò ad alimenti in corpus distributionē vehemētiorem faciunt, ea sunt sumenda manè: quòd si per ea vacuationem eorū quæ in carne cessant, molimur, post frictionem matutinam, ante exercitationem & balneum sumantur: quando Galenus dabat diacalaminthē in lassitudine vlcerosa cum cocta cruditate primarum venarum.

*Lib. 6. sanit.
tuenda.*

Quæ hepar obstrnctum liberant incidentia, tenuantia, tergentia, vacuantia danda sunt eo tempore, quod inter surgendum à somno & lauandum interuenit, postquàm scilicet iam confecta sunt, quæ ex ventre ad hepar redduntur, & temporis aliquid eorum operi ante cibum sumendum dari non inutile fuerit.

DE MODO VTENDI MEDICAMENTIS.

*Initio lib. 4. c.
ph. p.*

VTendi modus superest dicendus, cuique propè medicamēto suus, cuique item parti suus propemodum. Sumitur autem à partis natura, figura, situ, connexione, magnitudine, sensu obtuso vel acri: affectus natura, situ, figura, magnitudine, duratiōe: ægri natura, ætate, consuetudine, viribus: æris temperie, medicamento denique viribus, consistentia, & cæteris prius in compositionis methodo dictis. Quæ enim methodus est componendi propria partium medicamenta, eadem his vtendi. Ipsa nanque compositio veluti vsus respectu efficitur, dum id spectant, qui medicamenta conficiunt, vt ipsorum vsu ægris auxilientur. Tamen in multis partibus nō opus est solū, qua methodo remedia sint inuenienda scire: sed etiam quomodò inuentis decēter vtendū sit: vt in affectibus capitis, auriū, oculorū, narium, oris, & cæteris post leges, si prius familiaribus exemplis prædicta breuissimè declarauero. Partibus natura frigidis, vt capiti, oculo, etiam si morbo calido laborant, actu vehemēter frigida, qualia sunt narcotica, adhibere veremur: licet ab æstu calfactis olea etiā niue refrigerata capiti affundimus: & oculis calentibus aquā frigidis

Lib. 6. c. ph. p.

frigidissimam applicamus. Quia capiti rotundo & probe sphærico affusum oleū non cohæret, ex alto per mediocrem lanæ modum sincipiti affunditur. In partes cauas, vt aures, nares, os, & reliqua ei connexa, vterum, meatum vrinarium, sedem, sinum, medicamenta impelluntur, vel attrahuntur, vel recipiuntur corpore in id figurato: in aures enim otencyta, id est, oriculario clystere vel strigili infunduntur: in nares statu per tubum impelluntur, vel inspirando attrahuntur, vel turunda immittuntur. In os imposita nunc gargarizantur, nunc per foramina palati expiratu propelluntur, nunc deuorantur, nunc paulatim deglutiuntur, nunc faucibus retenta sensim inspiratu trahuntur in pulmones, nunc ore retinentur, vt ventriculum vel cerebrum roborent, vt fluxiones acres temperent, cogant, reprimant. Cavitas narium, & sedis, & vteri, & quorundam sinuum deorsum spectat, ob id vel corpus in contrariam figuram constituendum, vel liquidis materiis in hos meatus iniectis, bombace, turunda, pello est opus, vel alio operculo, ne materiæ refluant.

In os & fauces recepta, foraminibus palati, gutturi & gulæ communia sunt: in illa autem efflatu, in asperam arteriam inspiratu, in gulam deglutione feruntur, quæ ipsi, vel ventriculo, vel hepati, vel lieni, vel tenuibus intestinis, vel venis mesaraicis, atque adeo toti corpori per venas & hepar coniuncto cum ventriculo salubria esse voluimus, vt in crassa intestina per sedem, in capacitatem vteri per collum vteri, in vesicam, per meatum vrinarium, in sinibus cauernosis & fistulosis, pro cuiusque figura, situ, & connexione iniectiones fiunt nunc hæc, nunc illæ.

Quæ hepati foris imponuntur linimenta, vnguenta, cataplasmata, emplastra, sint latiora, quàm lieni, quàm alteri reni: minora quàm ventriculo, & ventri reliquo.

Quæ capiti magno epithemata, cucuphæ nobis dictæ, vel emplastra, vel alia remedia applicantur, sint maiora quàm paruo: & quæ cruri circumponuntur maiora, quàm tibiæ: & quæ sedi imponuntur pertusa cornua (canones buxeos vocamus) in puero minora sint: & pessus in recens facta, quàm in grauida sit maior.

Clyster largior magno, vacuo, quàm paruo & pleno, siue ab hydropo, foetu, stercore, siue à flatibus, cibo, & aliis. Item parciore

parcior vtero & vesicæ iniectio fiat, quàm intestinis, quàm ventriculo: etiā potio immittitur, nisi recens fœta sit mulier.

Quæ partes sensu tactus carent, vt glandulæ, ossa, cartilagine omniū remedium vim ferunt etiam causticam sine dolore. Quæ sentiunt qua parte magis sentiunt, vt dens interior, muscoli caput & tendo, oculi cohærens tunica, os ventriculi, palma manus, & internum digitorum: hæc mitiora postulant remedia, & minùs mordacia, quàm si affectus est in alia ipsarū particula minùs sentiente. Et qui sunt delicati, mulieres, pueri mitiora postulant: rustici, fossiores, baiuli, nautæ, valentiora in simili affectu remedia ferūt, siue sumenda, siue admouenda, facienda, educenda sint.

Morbus calidus alia, quàm frigidus: humidus contraria quàm siccus remedia postulat: & calidus primo recessu alia, quàm calidus secundo aut tertio aut quarto: & intemperies sola solis alterantibus pariter contrariis corrigitur: quæ verò cum materia est, illius quoque vacuationem ad sui curationem indicat. Intemperies simplex alia quàm composita, & pro vario compositionis modo aliis atque aliis remediis vtendum, & recentibus alia sunt vsui, alia veteratis. Præterea modus est alius sanandi intemperiem, alius incommodationem, alius vnitatis solutionem, & in quoque horum genere modus alius, atque alius vtendorum remedium pro varia horum specie. Aliter enim fracturam curamus, aliter vulnus, & vulnus recens aliter quàm vetus, & simplex aliter quàm cauum, & sordidum aliter quàm purum, & æquale aliter quàm cauum, & putridum ac malignū aliter quàm salubre. Intemperies sublimis mitiora requirit remedia quàm profunda, vlcus, aut tumor superficiarius admotis remediis idoneis cedunt. Interna etiam sumptis ægrè vincuntur, vlcus intestinorum, vteri, viarum vrinalium, oris: & aliarum partium præhumidarum, & calidarum immodicè ægrè vincuntur. Vlcus etiam rotundum haud temerè ad cicatricem peruenit, fractura in modū raphani ægrè alligatur, sinus ægrè curantur, quàm alia vlcera. Magno vulnere non sufficiunt vt paruo partes commissæ & deligatura, sed ferè futura aliqua opus est. Magnæ phlegmonæ si non sit sanguis missus, & remedia alia idonea sint adhibita, superuenit cancrena & sphacelos. Magnus dolor dentium, coli, & aliarum multarum partium vires deiicit, & sæpe

& sæpe est lethalis. Magna febris seu quia est acutissima, seu quia actiões principes inultum prosternat, ferè est lethalis, & extremis exquisitè remediis eger. Achoribus, alopeciis, cephalalgis, & aliis affectib⁹ veteratis, ob id sanatu difficilioribus valètiore opus est remedio. Febrib⁹ diuturnis vel aliis affectibus natura lógis, post coctionē etiā clemētiora remedia sufficiunt, ob id quotidianas & hecticas initio blandè tractandas imperat Galenus, veteratas etiā solus aër vernus aut æstiuus p̄sanat. In delicatis tertianā exquisitā pleniore victu curat Galenus, in aliis si vires valent, tenuiore. Iisdē purgantiū vim liquori delicato trāsmittimus, eū colamus, saccharoq; & vulgari cinnamomo condimus, aliis ipsorū substantiā totam exhibemus: assuetos vni purgantiū generi aut formę ad vtēdi modū aliū trahimus. A medicamētis abhorrentibus ea iusculis incoquimus, aut aliter alimēto, vel re iucunda tegimus, ne purgari se cognoscāt, priusquā facta iam sit vacuatio. Sic phlébotomen formidāri velatis oculis secamus, aut aluum largiūs deicimus. Quibus partes infernæ laborant, purgationes supernas si faciles iis sunt, & consuetæ imperamus: contrā quibus aliqua superiorum pars laborat, vt tabidis, cephalalgicis, deiectiones molimur non vomitus. Quibus ventriculus est imbecillus, adeò vt medicamentum ferre nequeat, vel antè roboramus, vel acri clystere vacuumus. Fluente aluo immodicè ad vrinas, sudores, vomitus retrahimus: obstructo hepate, liene, renibus, aut inflammato, aliis atq; aliis vtimur medicamenti pro causarū ratione. Nam si multum excrementum est, secta prius vena si omnia cōsentiunt, postea clementer purgamus: si crassum, tenuamus, si lentum, incidimus, & tergemus, potionibus, apozematis, electariis, id genus aliis.

Senes, spadones, & multæ mulieres, & qui alij gula sunt angustiore, catapotia etiam orobi magnitudine ægrè deorant, potionem faciliūs. Florentes ætate, genus omne medicamenti quauis propè forma sumunt, nisi proprietates naturæ obstat, aut à medicamenti offensi ipsa refugiant.

Quomodò consuetos labores faciliūs ferimus, etiam si imbecilli simus ac senes, quàm non cōsuetos: sic & medicamenti formam nobis consuetam faciliūs toleramus, quauis ratione hac minùs sit efficax, vtpote nobis iam tempore familiaris reddita, vt imbecillibus venam cubantibus Medici se-

*Lib. I. ad
Glaucōnem.*

cant:

cant: sic imbecillis mitiora & forma maximè iucunda exhibent medicamenta. In robustis minùs sumus solliciti de viribus medicamenti & de forma.

Potiones hyeme calidas imperamus, æstate frigidas, nisi affectus aliquis repugnet, vt ventriculi intemperies illic calida, hîc frigida. Aestate capillum audenter tondemus & radimus, cùm affectus postulat: hyeme vix audemus, nisi vrgeat morbi magnitudo.

Catheretica in hyperfarcosi larga adhibemus, eadẽ summa specilli lata parte puluisculo parcissimè vlceri cicatrice tegendo inspergimus. Valentia purgantia vstionibus, lotionibus, trituris, aliorum mistionibus meliora effcimus & salubriora, exhibemúsque cum his quæ viribus eorum obsistunt.

Cauistica cùm adhibemus, vndique munimus cera, vel alio, ne vis eorum latius serpat. Galbanum medio emplastro imponimus, quando ad eam partem quam ipsum tanget, largiùs trahendum est.

Crasiora medicamẽra vt emplastra, quia phlegmonas sua duritie lædunt, aliquo aptiore liquido mollimus, & liquidiora misis crasioribus corpulentiora reddimus, vt diutiùs hæreant.

Quorundam ex prædictis scopis ad modum vtendi medicamento obseruandis exempla aliquot ex Galeno maximè proferamus: nam omnium fuerit proluxius, & fortasse parum vtile.

Lib. 1. c. ph. p.

Pilos auferimus vel nouacula, vel psilothro à parte, cui emplasticum medicamentum imponimus, & à toto corpore in picatione ad renutritionem, aut picationem inter duo lintea facimus, vel picem oleo aut butyro, aut simili minus tenacem reddimus.

Ibidem.

Pueris, eunuchis, mulieribus, & ceteris cute & carne molli præditis, digerentia adhibe mediocria, si ex corpore illorum, vt ex cute capitis in alopecia dissipandum est: ex talibus enim prauis humores facile discutuntur. In vlceribus eorundem medicamenta morsu carentia vtenda sunt: hæc enim vel sine molestia omnino agent, vel nihil nocebunt. Quæ verò parem noxam commodo afferunt, non sunt tentanda, vt quæ polypodas efficaciter purgant, si eos exacuunt, non sunt adhibenda.

benda. Multò minus quæ plus nocent quàm profunt, nisi noxa sit corrigi facilis: vt noxa ex balneo frigide per calfacientia in hecticis mox tollitur. *Lib. 10. meth.*

Antidota ante deleteria parua quantitate semel quotidie sufficiunt: post illa verò quadrupla aut quintupla, & bis quotidie sunt sumenda. Id quod etiam ad modum medicamenti refero, vt Galenus semel aut bis, aut frequentius cibum dare in morbo retulit, Aph. 17. lib. 1. Sic Aeschrius morsis nuper à cane rabido dabat cochlearium magnum pulueris vstorum cancrorum, iamdiu morsis cochlearia duo quotidie. *Lib. 1. antid. Lib. 11. simpl.*

Cùm singulis medicamentis validis vtimur, initio clementiora ipsa offeremus, mistis his quæ vim eorum validam obtundunt, vt oleo, cera. cùm autem imbecillibus vtimur, vt thure, amygdalis anaris in alopecia, post vsum primū & secundum, obserua affectum à medicamento in corpore relinquitur, pro cuius varietate medicamenti vires vel augebis vel mitigabis. Valentissima igitur non statim ab initio adhibenda, sed à mitioribus incipiendū est, nisi affectus sit maximus. *Lib. 1. c. ph. p. Lib. 2. c. ph. p.*

Quoties simplicia aut composita facultatibus cōtraria miscemus, initio parum eius quod est generosius miscendum, secundo & tertio vsu augendum, si successerit: vt in diuturno capitis dolore ab intemperie calida, cum spiritu flatuoso, in primo transgressu ad calida polygonium cum pauca ruta vel serpillio miscendum. *Ibidem.*

Plethorico corpore in arthritide sanguis primum mittatur, mox deinde fiat purgatio. Ex successu remedii loco affecto prius adnoti vel etiam sumpti coniecta an eodem sit perseverandum, vel ad aliud transeundum consilio Hippocratis, Aph. 52. lib. 2.

Quæ sunt polychresta, id est, multi vsus seu multis simul partium aliquarum, vt aurium dispositionibus accommodata medicamenta, neque multum opuluntur, neque obsunt, si perpetuò ipsis vtamur. Quæ verò vni tantū dispositioni conueniunt, illam optimè curant, alias interdum præterquàm quòd nihil iuuant, etiam exacuunt. *Lib. 3. c. ph. p.*

Medicamenta media omnibus partis dispositionibus conueniunt, tamen his quæ leuiora aut valentiora requirunt, neque bonum neque malum magnum afferunt. Ob id polychrestum, id est, ad multas dispositiones vtile medicamentum *Lib. 4. c. ph. p.*

r nullum

Lib. 3. c. ph. p. nullum potest optimum inueniri, sed quod singulis est proprium, id melius est. Polychresti autem compositio utilis est ei, qui vnum medicamentum ad multos affectus mediocriter idoneum habere cupit.

Lib. 4. c. ph. p. initio. Partibus laborantibus vt capiti, oculis topica ne adhibeas, nisi vacuato prius toto corpore per phlebotomen, purgationem. In oculis autem etiam caput prius per apophlegmatismos vacuandum est, errhina enim ad oculos trahunt. Quod si emplastica oculis prius adhibes, vehementem excitant dolorem, dum fluentem materiam extra vasa vacuari prohibent, ob idq; tunicae horum distenduntur ob copiam affluentium humorum, & nonnunquam rumpuntur vel eroduntur. Nec solum his vacuationibus oculum, vel aliam parti idoneam ad curandum reddimus, sed etiam reuulsionibus, vt in oculo primum ad inferiora corporis: deinde ad occiput & curim capitis: interdum & in his arterias incidimus transuersas post aures. Post hæc genitam in tunicis oculorum dispositionem curamus, quæ etiam bonum sanguinem affluentem per venas in oculum corrumpit. Curamus autem per desiccantia sine morsu humorem in oculo noxium, qui quod influit corrumpit. Astringentia autem nec siccant eiusmodi dispositionem, & mordacis saniei effluxum cohibent: acria verò & mordacia succorū qualitatem augent: laxantia & digerentia vacuant quidem hanc saniem, vlcus autem cicatrice non tegunt, nec affluxum reprimunt: vt nec coquentia thus, crocus, myrrha, quamuis dispositiones coquere non mediocriter bonum est. Acida & amara rodunt, & tales dispositiones exacuunt, & his magis nitrosa, salsa, austera: sola igitur medicamenta rosionis expertia sanant vlcus cum acri fluxione, longiore temporis spatio viriosum affectæ partis humorem consumentia: vt collyrium libianum, quod Paulo libanium dicitur, cygnus à colore albo, ex multa cerusa Rhodiana, terra Samia, amylo.

Lib. 4. c. ph. p. Per tempora morborum varia dantur remedia, vt per initia phlegmones, & vehementes influxus austeriora, per statum dolente multum phlegmone mitigatoria, laxantia, coquentia. Quod si aliquid phlegmones reliquum durefcens & solutu contumax euaserit, à repellentibus ad digerentia paulatim est transeundum. Si verò habes medicamentum vnum excellens, vim eius exolue misto alio: si imbecillum, intende.

Oleum

Oleum lentiscinum recens in vase duplici est tepefacien- *Lib. 5. c. ph. p.*
dum, ad sedandum dolorem phlegmonarum in gingiuis, tu-
nica linguæ, cute totius: quia citra molestiam & asperita-
tem repellit, quam habent plurima austera, & citra rosionem
discutit.

Afsidua fiat rasura in alopecia ante medicamenti imposi- *Lib. 1. c. ph. p.*
tionem. Rasa cutis nitro tergitur ante digerentium applica- *locis varijs.*
tionem, postea cutis derafa fricatur linteo subaspero, aut fo- *ibidem.*
liis fici, vt per rarefactam eam ad radices imas pilorum me-
lius penetrent medicamenta humorem prauum digerentia.
Medicamentum in alopecia metasyncriticum, id est, ex alto
euocans, admove in aëre calido, & si potes in sole æstiuo:
hyeme autem in laconico.

Ceratum Gal. *δι' ἐν ποσσίον* in hemicrania frigida veteri, aut *Lib. 2. c. ph. p.*
ischiae frigida ante balneum semel illitum statim affectui *in fine.*
medetur, sic vt æger sanus post balneum omnino euadat.

Capiti ab æstu immodicè calenti (vnde febris diaria nasci *Lib. 8. meth.*
solet) rosaceum niue refrigeratum ex alto per hapsum lanæ
impingitur.

In dolorificis capitis dispositionibus calidis aut frigidis sed *Lib. 2. c. ph. p.*
diuturnis remedia adhibentur idonea, emplastri vel cerati
modo confecta, capiti derafo: liquida verò eadem tonso ad
cutim, seu breuissimos habenti capillos.

In dolore auriū ex inflammatione vehemētissimo, opium *Lib. 3. c. ph. p.*
æquali portione castorii multò ante vsum miscendum est, vt
vis eius frangatur: amboq; sapa ex musto sunt dissoluenda,
quia dolores magis lenit, quàm vinum duke.

Si quid auribus infundendum est supinis, liquore idoneo
resoluatur in consistentiam, quæ per auricularem clysterem
immitti possit, vt trochiscus ex opio & castorio cum sapa co- *ibidem initio*
actus, sapa dissoluatur. Castorium per se bene tritum cum *Lib. 3. c. ph. p.*
opio in sapa dissoluto misce, & fac pastillos, quos tempore
vsus sapa resolue ad eam consistentiam, quæ per otenchyten,
id est, auricularium clysterem in aures phlegmone detentas
possit infundi, vel potius specillum lana mollissima inuolu-
tum, liquore prædicto mersum in aurem dolentem blandè
immissum eas foueat, & liquorè sensim demittat, & cætera.
Quæcunque applicantur auribus & oculis, vt lac muliebre; *Initio lib. 3. c.*
albumina ouorum, mediocriter calfacta esse oportet. *ph. p.*

Pastillus & collyrium diaglauciu & diacrocu ex aceto in cote medica læuigatis & calfactis auri infundendus est.

In vlcere aurium glaucium ex aceto infundendum : si verò cum fluxione sit, aut pure, pastillus primum Polyidæ, post hunc Andronis, deinde Bithinus. Cui similis est aut etiam melior pastillus Gal. diachartu, vt à leuioribus incipiamus.

Lib. 5. c. ph. p.

Ad dolorem dentium remedia in aurem lateris nunc dolentis, nunc oppositam infundit Archigenes. Auris initio prius tergenda, ne pinguedinem habeat, quàm infundas medicamenta narcotica, referantia, coquentia, laxantia, digredientia.

Quæ auribus instillantur, mellis aut mellis tenuis habeant spissitudinem, siue ex sapa, siue ex aceto, melle, vino Creten- si, mulso, lacte muliebri, albuminibus, sanie expressa ex carne bubula parum super prunas assata Asclepiadi, succo perdicii, marrubii, conizæ, cæpæ, porri, spondilii infundantur. tepida autem sunt infundenda. In nares etiam puluis continenter potest inspirari polypo vel ozæne idoneus, quia perpetuo humorum affluxu eluitur, quomodò & in lippientibus oculis.

Lib. 3. c. ph. p.
Ibidem.

Linamenta & spongiæ, & alia quæ naribus sanguine fluentibus immittuntur, lino per acum dato deliga, vt retrahi possit.

Lib. 4. c. ph. p.

In quibus oculorum collyriis astringentia præpollent, copiosissimo liquore opus est, paucissimo medicamento astringente, præsertim si id astringens est metallicum. In quibus verò collyriis eorundem crocus, myrrha, castorium, thus, lycium superant, crassiore medicamento vtendum est.

Quæ moderatè influxus in oculum repellunt, ocularibus remediis indita iuuant : quæ verò vehementer repellunt, dolorem augment, tunicas exasperando magis quàm influentium impetum reprinunt. Vtilissima igitur lippitudinibus & aliis omnibus in oculum defluxionibus, vlceribus, pustulis, quæ modicè astringunt, vt rosarum folia, flores, succus, ericæ fructus, spica nardi, crocus, lycium, hypocisthis. Eadem medicamentis visum acuentibus mista contrahendo & constringendo oculorum substantiam iuuant.

Collyria oculorum in cotibus nonnulli terunt, ex mammis lac boni succi instillantes, vel liquorem tenuem oui, vel si vlcus est decoctum fœnigræci : id enim nonnihil terget, liquor oui nihil, lactis serosi pars magis, sed cum morfu, ob id noxia.

Nam

Nam quæ vlcera replent, tergent sine morſu. Quæ oculis adhibentur, exactè trita eſſe oportet, & horum quædam inuerſa palpebra ſpecilli parte lata illinuntur.

Lib. 3. meth.

Oculi inflammati foueantur decocto meliloti & fœnigræci ex ſpongia ſemel aut bis in die, ſi parum dolent: ſi multum, ter quater, præſertim longis diebus æſtius. Quædam horis omnibus adhiberi poſſunt, vt xerocollyrium Galeni.

Lib. 4. c. ph. p.

Phlegmonæ oculi albumen oui craſſum & lentum ſine morſu eſt anodynum, & diu adhæret. Si in ictero oculi manent pallidi reliquo corpore perſanato, trahe in balneo narium cochlear vnum aceti acerrimi, & multum bilioſæ ſubſtantiæ deſluet. Quia ex naribus, gutture, gula facilè medicamenta ab humoribus per has partes deſcendentibus ex cerebro vel aliunde eluuntur, continuè ſunt applicanda collyria liquida, vel ſicca ſtomatica, vel ſtoniachica, vel arteriaca, ſiue ozænas, ſiue polypos, ſiue vlcera narium, vel etiam alios dictarum partium affectus curas.

Initio lib. 9. c. ph. p.

Datis apophlegmatifmis vel à dente trahentibus medicamentis, ore hier æger, & deorſum ſpectet, vt poſt medicamenti uſum humor facilè deſluat.

Lib. 5. c. ph. p.

Si affectus eſt in aſpera arteria, vel muſculis laryngis, vt laſſitudo motoria phlegmonodes ex vociferatione, ſiue ſumuntur cibi, vt lac, amyllum, chondrum, oua: ſiue arteriacæ & hypoglottides eiufdem cum arteriacis facultatis, vt ex vino thereo, gummi, tragacantha, glycyrrhiza, lenta ſint & emplaſtica, vt partibus quas attigerint, hæreant, aſperitates læuigent, reliquias inflammationis coquant & perſanent: tuncq; medicamenta linguæ ſubdita dum paulatim liqueſcunt, larynx quod in eam deſluit, excipiat, æger autem oborienti tuſſi reſiſtat, & ſe contineat, vt medicamenti aliquid in laryngem & arteriam deſluat. Eclegmata quoque vt decoctum hyſſopi, ireos, ficuum, nucleorum pineorū ſorbemus, vt cùm inſpirato aëre etiam portio decocti in aſperam arteriam trahatur, aut id calidum quantitate parua dum faucibus continemus ſemiſupini, aliquoties inſpiramus, aut paulatim deglutimus ſaliuæ miſta.

Initio lib. 7. c. ph. p.

Stomaticis tribus modis vtendum eſt in laxata vua: primò cum aqua præſertim per initia, vel cum mulſa, vel cum chylo, & cremore priſſanæ. Secundo modo medicamentū ſtomaticum

ticum purum, vel digitis vuæ illinendum est, vel cochlearⁱ attingendum & apprimendum. Tertio vuam foràs ad linguam educendo, id quod maximè confert, vt abscedat à rectitudine, quam vt plurimum ad fauces habet.

Lib. 6. c. ph. p.

In affectibus partium oris, vt inflammata aut laxata columella A sclepiades per fistulam expirat, & flando expellit medicamenta in partem affectam, aut inspirari iubet. Quod merito damnat Galenus, nam bona ipforum portio in gulam & asperam arteriam delabitur. Præstat igitur siccis columellam ex cochleario attingere.

Lib. 4. meth.

Si vlcera sordida in ore puerorum tangis medicamento valente, specillo lana inuoluto in medicamentū intincto tangatur pars, ita tamen figurato puero, vt non deuoret: pòst col-lue decocto lentis aut rosarum mellito: vt in vlcere intestinorum crassorum clystere iniiciuntur medicamēta ei vlceri idonea: in vlcere vtriciuli bibuntur: in vlcere tenuiū, vtrinq; dantur: in vlcere gulæ non semel, nec totum simul sumendū, sed paulatim & assiduè. Nam ex transitu & contactu his vlceribus vtilitas accedit, non ex continendo & diutius adhærendo, vt ventriculi vlceribus: tamen crassiora & glutinosa ex gulæ figura & situ facere ea didicimus: hæc enim cibi & potus est transitus, ob id medicamentis æger, quæ hæreāt, vndique quasi concrecant & agglutinentur, non eluantur & defluant promptè. Crassa autem promptè cōcrescunt, lentè agglutinantur, ob id his tragacantha & gummi miscentur.

Ibidem.

Vlceribus gulæ & cæteris internis adhibētur hypocisthis, malicorium, balaustium, cytinus, acacia, succus rhus & rosarum, aster famius, figillum lemnium, & cætera vlcus interdū sanantia, & nullam noxam inferentia visceribus. Dantur autem ex decocto summitatum rubi, myrti, vitis, lentisci, mali cydoniorum, vel vino austero, si phlegmone absit. quæ si vlceribus gulæ applicas, gummi misce, & tragacantham.

Purgantia damus nunc potione, cū celeriore & parciore vacuatione opus est, aut cū in alios meatus facienda est vacuatio, vt mox in hieræ exemplo audies: nūc bolo, vt vocamus, cū diutius ventriculo immorari medicamentum volumus, vt minus sit vomitorium quibusdam, vel à longinquis plus attrahat: aut catapotiiis, cū diutissima in ventriculo mora opus est. Alia item forma aliis multis de causis damus, vt
in comp

in compositis patebit, & ante hæc ac post, vino vel alio liquore grato os abluimus, vel anisum cōditum, vel rhodofacchar, vel simile sumimus, & illa tegimus vmbra, vase denso, foliis auri, carne & cute fructuum coctorum, pane azymo: siphone etiam prælongo fauces attingente quidam sic deglutunt, vt linguam saporum indicem nec attingant, nec afficiant.

Sic hieræ picræ drach. vna Asclepiadi vel Galeno cum aquæ cyathis quatuor sine melle, quia stomachum evertit, datur tardè coquentibus, aut vomentibus, aut aliter fluente ventriculo afflictis, & cū declinant phlegmonæ internæ, aut cū vis mouere vrinam vel menses cum hydromelite, aut potius cum vino, aut potius cum cœnomelite. Sic enim ex ventriculo eius distributionem iuuabis & delationē ad vrinas, & quæ vtero inhærent, dissolues & incides, & robur addes partibus, per quas transitur, & calorem partium per quas fertur, augebis: qui etiam multum confert ad fundendum & vacuandum humores inhærentes. Ex quibus apparet magni interesse, quæ medicamenta cum quibus sumantur vel admoueantur. Ob id in vsu asteris stomachici liquorē dispositioni conuenientem requirit Asclepiades. Asterem egregium in cephalalgia fronti idem illinit cum aceto: ad auriū verò dolores perdicii succo diluit: ad sanguinis eruptionem, cum vino myrteo: ad sanguinis screatum, dysenteriam, choleram, cum succo polygoni: ad tussis, cum vino Thereo aut passo: ad phthises & empyemata, cum succo marrubii: ad serpentis ictum, cum rutæ decocto: ad menses, cum succo arthemisiæ: ad stranguriam & vuluæ strangulatum, cum mulso: ad arthritidas, cum decocto gentianæ.

*Lib. 8. c. ph. p.
Ibidem.*

Sic eniplastrum diachalciteos ex contrariis compositum, vt in compositis audies, vlceribus glutinandis & cicatrice regendis, & phlegmonis curandis accommodum redditur, aliter atque aliter factum & liquatum. Si enim phlegmone magnum parti dolorem affert, oleum & adeps recentia sint magis blanda & mitia: eadem vetusta minus dolenti & diuturnæ phlegmonæ conueniunt: hæc quæ quò diuturnior & contumacior, hoc magis vetera illa profunt & sola curant, modò amplius nihil affectæ parti affluat: siquid verò affluit, compositum diachalciteos conuenit mista facultate præditum digerente quod influxit, & repellente quod influit: pauca verò

phlegmonæ sunt diuturnæ, quibus nihil affluat, cùm diuturnæ esse soleant ob affluentes in ipsas humores. Cùm autem phlegmonæ incipiunt, & augentur, refrigerantium & astringentium virtus præpolleat, emplastrum igitur tunc solvatur vino vel aceto, vel aqua, vel oleo crudo, vel Hispano, vel Histrico, vel, si validius erit astringendum, myrteo & melino, vel dulci aliquo, vt sit anodynum.

Lib. 13. meth.

Phlegmonarum in artubus initio spongia imponitur ex aqua frigida, vel ex oxycrato: phlegmonis autem hepatis calida applicanda, melinum, myrteum, mastichinum, nardinū, lentiscinum, absinthites, & cataplasma item calidum.

Ibidem.

Phlegmonæ irritantur à duris, qualia sunt multa emplastra: nisi hæc oleo vel alio simili molliantur.

Lib. 5. c. ph. p.

Quavis astringētia etiam sola phlegmonas initio iuvent, id quod influit repellendo, & etiam interdum aliquid humoris in parte inflammata contenti exprimendo ad venas particulam nutriendas: tamen quod valentius astringit, tantum abest vt phlegmonas iuuet, vt etiam dolorem partibus inflammatis intendat eas velut contundendo, & substantiam earum violenter contrahendo: sic valenter digerentia sua acrimonia quid erosioni simile in parte excitant. Quæ verò modicè digerunt, augmento phlegmonarum & statui conueniunt, doloremq; leniunt: moderatum igitur vtrunque est præstantius quàm immoderatum. Tamen si dentes dolent citra gingivarum phlegmonem, siue in ipso corpore dentis siue nervo sit causa doloris humor aut flatulentus spiritus, medicamentis acerrimis opus est, siue repellere, siue digerere causam doloris libet. Ob id plurima ipsorum ex aceto acerrimo parantur.

Lib. 10. meth.

Ibidem.

Ceratum Galeni refrigerans non maneat super ægram partem, donec manifestè incaleat, sed assiduè subinde mutandum: imponendum autem parti primò affectæ & refrigeratione egenti, vt cordi, hepati, renibus, non autem toti thoraci propter cor, nec toti ventri inferiori propter hepar vel lienem vel ventriculum, ne partes refrigerationem non postulantes, tamen refrigeratæ cogant te ante tempus à refrigeratione partis primò affectæ cessare.

Lib. 11. meth.

& cap. 21. lib.

5. simpl.

Ad ventriculi & hepatis robur absinthium ponticum oleo incoctum est salubre, nisi à calore & siccitate laborent. quia
qualit

qualitas absinthii amara præit, & viam astringenti facit.

Contra morbum, qui generosè ex arte pugnat, terminus ei fit, vt tutò medicetur: ei verò, qui dolorem mitigat, virium totius aut partis custodia terminus est, cùm vtrendum est narcoticis, præcipuè in calido corpore & affectu: nam in crassis & glutinosis succis alienissima sunt narcotica. Oleum quia tædium affert, post actionem ab eo editam tergendum, lib. 8. *Lib. 12. meth.*
in diariæ à stipatione, curatione in bilioso homine.

Oleum phlegmonis oculorum vel oris nõ infunditur: infunditur rosaceum etiam cum aceto phlegmonis incipientibus aurium non oculorum. Contrà diamorum & stomatica alia oris phlegmonis incipientibus conueniunt, non aurium vel oculorum, quanquàm genere sint ex his quæ indicantur. *Lib. 13. meth.*

Fomenta & penicilli, & alia id genus ventriculo & stomacho abundè calentia imponantur: nam tepida ventriculi firmitudinem dissoluunt. *Lib. 8. meth.*

Neruis vulneratis aqua calida est inimicissima, cùm præfertim eorum substantia ex refrigerata concretaq; humidior materia sit condita: omnis enim talis cõstitutio per ea quæ simul calfaciunt & humectant, resoluitur ac putrescit. *Lib. 6. meth.*

Vnguenta & nardinum ad roborandum fomento ventriculi & stomachi, soleo calfacere in vase duplici vtique coniecta prius in vas maius aqua feruente: nam aliter calfacitis vitatur eorum facultas. *Lib. 8. meth.*

Vteri, & vesicæ vlcera iisdem medicamentis siccantibus egentia, requirunt prætereà instrumenta quæ intrò ea liquore aliquo soluta transmittant, vt crocum, myrrham cum succo plantaginis vel simili mistum: siphonibus, aut catheteris, aut metrenchytis infundimus. *Lib. 9. c. ph. p.*

Vlceribus quæ ad cicatricem veniunt, multis consequenter diebus pharmacum epuloticū immanere debet, quò melius & citius ita cicatrix ducatur. Oñ id medicamentum ex aqua & oleo copiosiore & lithargyro coctum donec liqueatur & alteretur, tam fit glutinosum, vt ne à lotis quidem decidat. Vtile autem est epuloticum teneris corporibus, pueris, mulieribus, grandioribus, cute candida mollem corporis habitum testante præditis, si vlcera habent parua sed praua, & dysepulota ob vitiosum ipsorum succum. *Lib. 1. c. ph. g.*

Lib. 2. c. ph. g. Sinibus implendis emplastrum diachalciteos, vel aliud idoneum oleo largo solutum, per cornu recta perforatum cum vesica porcina clysteris modo infundendum. Ex rosaceo autem solvatur, si parvæ phlegmones suspicio adhuc adsit: si paulò latius est foramen sinus, clystere infundendum, vtendumque piulcis, id est, pus attrahentibus instrumentis, quales sunt nostræ clysterum syringes. Quæ enim sunt substantia crassiore, vt emmota, infundi sinibus nequeunt. Contrà in superficie caua vlcera crassioribus egent medicamentis, quòd liquida statim defluunt, & linamentum siccum reliſcunt. Ob id in iis ceratis validè tergentia miscentur, in sinibus oleo, vt dixi, largiore solvuntur.

Ibidem. In sinibus item & fistulis splenium excinde, vt excernendo humori liber sit exitus: hic enim mora in parte eam exedit, & vim medicamenti obtundit. Eadem causa cannulatas turundas, hoc est, pertusas, ex solidiore aliqua materia penna, plumbo, argento, auro, iisdem immittimus, vt puris emissarium perpetuò sit liberum. Vbi vlcus erit penitus repletum & planum & æquale, nec quicquam illi cauum manebit, ipsis vlceris oris specilli mucrone imponendum siccum epuloticum medicamentum: super reliquum linamento dato, quod imbutum sit aliquo medicamento consistentia humido ex his quæ cicatricem inducunt.

Eodem pertinētia exempla perquam plurima potest proferre, qui vult ex lib. 3. 4. 5. 6. methodi, vt exempla rectè vtendi medicamentis intemperaturas curantibus, & morbos partium organicarum proprios ex libris aliis methodi, & lib. comp. ph. part. & gen.

**Li. 10. c. ph. p.
& alibi.**

Repellentibus initio chiragræ & podagræ vt aliorum affectuum à fluxione pendentium vtimur: ischiadis autem initio vt pleuritidis mitigatoriis non repellentibus, quia sanguinem ex vasis ambientibus & musculis in ischion & thoracis partem affectam protruderent.

Ambientis temperatura rectiorem quorundam medicamentorum vsum facit, ob id prius alopeciis medicamenta docuimus adhibenda in aëre calido, vt sub sole æstiuo, vel hyeme in laconico. Item in ictero oculorum acetum in balneo naribus trahendum, & psilothra in balneo tentāda. Quæ res magni est momenti, vt apertis à calore poris, humores ab eodem

eodem liquati promptè trahantur.

Emplastrum liquidum ex farina fœnugræci, sinapi, man- Lib. 9. c. ph. p.
na thuris, myrobalanu pyesmate, spuma nitri, oleo cedrino
decocto, applicatur lieni scirrroso, quandiu id pati potest: de-
inde in balnei folium ducto homine fascia in aqua soluitur.

Malagma ex fœnugræco, calce viua, nitro, melle imposi- Ibidem.
tum lieni scirrroso aut ischiadi, donec mordeat, si tunc ductis
in balneū auferatur (alioqui ægresceret) sani balneo exeunt.
Archigenes apud Galenū. Herbæ iberidis (quam nonnul-
li lepidium vocant, alij nasturtium sylvestre) radicem tufam
adipe suillo excipe, emollitam emplastri modo applica ischio
ad horas tres, deinde in balneum dimitte. Eadem etiam vetu-
stos capitis dolores liberat vice sinapisini & thapsiæ.


Si in ictero oculi manent pallidi reliquo corpore persana- Lib. 9. c. ph. p.
to, trahè in balneo naribus cochlear vnum aceti acerrimi, &
multum biliosæ substantiæ defluet.

Medicamentum in alopecia metasyncriticum, id est, ex al- Initio Lib. 1. c.
ph. p.
to euocans, admoue in aëre calido, & si potes, in sole æstiuo:
hyeme autem in laconico, id est, prima domus parte, quam
stuphas vulgò vocamus.

Ceratum Galeni dia euphorbiu in hemicrania frigida ve Lib. 1. c. ph. p.
teri, aut ischiade frigida ante balneum semel illitum, sta-
tim affectui medetur, sic vt æger post balneum sanus omni-
no euadat.

DE LIMITATIONIBVS AD RECTVM

*medicamentorum & aliarum causarum sa-
lubrium vsus necessarius.*

 *ἰογισμὸς* Latinis distinctio, limitatio, determinatio est,
definitio ac declaratio facultatis remediorum, cui affe-
ctui differentiæ, à qua causa, in qua natura, quo aëre
idoneorum: citra quas cum quid absolutè pronunciat Gale-
nus, ad naturam temperatam in aëre temperato referri vult:
vt cum scribis remedia ad achoras, id est, tineam, vel alios af-
fectus, adscribe ad quales & quantos, & quo affectuum tem-
pore illa sint salubria. Si vino quoque intus aut foris uten-
dum erit, ad rem mergendam vel diluendam, quale velis di-
stingue. Nam multæ eius differentiæ facultatibus etiam con-
trariæ,

Lib. 1. c. ph. p.

trariæ, quanuis interdum ex scopo medicamenti potes vini genus inuenire, vt austerum, si astringendum: acre, si digerendum: sic in cæteris differentibus, aut virtutes contrarias habentibus, obserua quem scopum medicamenti compositio habeat, vt scripta absolute & sine limitatione distinguas. Et in reliquis remediis similiter.

Porro limitationes ad rectè vtendum medicamenti non mediocriter conducunt: neque sunt recipiendi, qui medicamentorum vsus citra distinctiones scripserunt, dicentes ad dolorem idoneum est hoc medicamentum, non addentes, à qua dispositione & causa ortum dolorem intelligant. Rectius hi qui dispositionem, doloris causam exposuerunt, ratione nixi: vel etiam experientia, quæ signa euidenter apparentia sequitur: qualia in oculo dolente fuerint affluens sanguis largus, paucus: rodens, rosionis expers: rubor maior, minor. Venæ plenæ sanguine multo, paucæ, sed vaporosæ. Phlegmones oculi tumor, maior, minor. Color eius præter naturam varius. Lippitudo in angulis oculi crassior, tenuior: largior, parciore, seu maior, minor. Dolor & doloris species ab ægro nobis declarata, tensius, rodens, pulsatorius, cõprimens, & contrahens, & quassans, & contundens.

Non manifestè verò apparet, an internis vel externis cranij partibus fluxio fiat, multò minùs an per venas, vel per arterias: ob id distinctiones ab his sumptæ parum sunt efficaces. Specta igitur differentias dispositionum dolorem excitantium, secundum quas scribendæ sunt tibi distinctiones, vt lib. 13. methodi in oculorum affectibus à Galeno scribuntur. Ad frigidas & pituitosas dispositiones, si albæ sint: ad melancholicas, si liuent, & melancholici humoris malitiam prodant: ad calidas & igneas dispositiones inflammatorias quidem, si rubet: erysipelatodes verò, si flauent: ad dolorem mediocre, vehementem, tendentem, grauantem, pungentem, pulsantem. Ad vlcera simplicia, caua, plana, sordida, sinuosa, pascentia, phagædenica, chironia, Telephia, cacoëthea, dysepulotica, cum phlegmone, cum erysipelate, vel sine his.

Ad aphthas albas, nigras, depascentes, citra depasitionem, depascere incipientes, & ob id multam saluam reddentes.

Lib. 6. c. ph. p.

Ad affectum quenuis incipientem, augefcentem, vigentem, declinantem, exiguum, simplicem, mitem, magnum, mediocre,

crem, aliis complexum, malignum, putrem.

Qui cephalalgie remedia citra distinctionem scripserunt, *Initio lib. 2. c. ph. p.*
 plus noxæ quàm commodi attulerunt his, qui fidem ipsis adhibuerunt. Cephalalgia enim omnibus non accidit ob vnam corporis dispositionem, sed ob plures causas, quibus singulis propria est curatio. Aliæ etiam distinctiones ex particularum affectarum natura sumuntur: aliquando enim extra cranium, aliquando intra, aliquando utrobique causa doloris est, aliquando in venis, vel arteriis, vel nervis, vel membranis, vel cerebro, vel cere, vel quibusdam horum, vel omnibus simul. Difficillimum igitur est locum affectû in his inuenire, nisi Medicus sit doctus, & multa ægrorum inspectione exercitus.

Species igitur affectus est explicanda, cui vtile auxiliû dicimus, siue ea sit morbus, siue morbi causa, siue symptoma, & in horû triû singulis specialissimû est explicandû, vt ad febres biliosas, melancholicas, pituitosas, & à qua bilis alterutrius, aut pituitæ specie sint. Ad diariâ à tali vel tali causa externa, nisi remedia sint omnibus diariis cõmunia, vt balneum aque dulcis in declinatiõe. Ad febres easdẽ clementes, recentes, vel malignas veteratas. Ad phlegmones principiû, augmentû, statum, declinationem, in hoc vel illo corpore, in tali parte.

In infantibus, adultis, senibus alia atq; alia vsurpanda sunt medicamenta, vt etiam reliqua auxilia. In pueris item, mulieribus, eunuchis, & cæteris molli carne præditis: vel contrà in agricolis, fossoribus, nautis, baiulis, & cæteris duræ carnis hominibus hoc, illud vtendum adscribas, quod ab ætate, temperamenti ratione, & virium, & à corporis habitu diuersæ sumuntur indicationes limitationibus exprimendæ.

Frequenter vnica sufficit limitatio, vt à tempore, vt ad incipientes alopecias: sæpe non sufficit, vt butyrum benefacit parotidibus incipientibus: addendû enim est mitioribus, modicè dolorificis, paruum abscessum faciētibus. His enim sufficit butyrum, præsertim in molli corpore, vt pueri, eunuchi, mulieris, & reliquorum molli carne præditorum: non sufficit autem vehementioribus cum dolore magno & pulsatorio, & cum vigiliis, & cum magno abscessu. *Lib 3. c. ph. p.*

Distinctio etiam fuerit sufficiens, si dicas remediû ad capitis dolorem à tali vel tali causa vel affectu, & sine febre, vel cum febre. Item ad achoras incipiētes, sine malignis corporis

poris totius humoribus, aut saltem sine his copiosis, vel ad inueteratos cum copia humorum prauorum.

Quidam suis medicamentis limitationes adscripserunt, sed generales tantum, aut si particulares, non integras, & in quibus multas adhuc requiras: ut qui scripserunt remedia cum his titulis, ad aurium affectus, ad aurium dolores, ad vocem abscissam: & adhuc alij generalius, ad vocem læsam, non significantes qua offensa, & à qua dispositione seu causa læsa vel abscissam vocem intelligant: cum tamen quæuis causa, et ab ea dispositio in corpore relicta, remedium flagitet sibi proprium. Scribendum ergo fuit ad aurium dolorem, grauem, pulsatorium, &c. à tali vel tali causa.

*Inisio lib. 8.
c. ph. p.*

Ad stomachicos Andromachi & hieræ limitatio est, sed confusa nimis: quia cum stomachicorum significatio latè pateat, non addunt ad quos stomachicos sua remedia velint efficacia: ob id ea quibusdam profunt, quibusdam nocent plurimum, ut cætera indistinctè scripta.

Est tamen quando promptissimū est cuius in simplicium facultatibus versato, & affectuum naturas callenti dicere vim medicamenti alicuius compositi, etiam si eam titulo non exprimat, & inuenire qualenam ex his vel illis indistinctè scriptis qui partis huius dispositioni, & quali & quantè idoneum fuerit præsidium, & quo tēpore, quæ qui ignorat, maximam sæpe noxam ex usu indistinctè scriptorum infert. Quia tamen id discernere non omnes possunt, neq; in omnibus possunt, commendandi maximè sunt, qui limitationes integras medicamenti non solum generales, sed etiam particulares maximè adscripserunt. Inter quos primas iure meretur Herophilus perpetuò iubēs, ut Medicus sciat, quæ, qualis, & quanta sit morbi causa, & quod cuique potissimum sit remedium, ut singulis congruam curationem moliatur, lib. 3. comp. ph. part. Non sunt recipiendi, qui diminutè scripserunt, multò minùs qui absoluto sermone sine limitatione scripserunt, ut ad ulceratam arteriam, vel asperatam, vel vocem abscissam aut raucā. Multæ enim possunt esse causæ vocis abscissæ vel raucæ, ut destillatio vetus à capite, empyema, tabes, vociferatio multa, inspiratus aer frigidus, potus frigidior, raucitatis sunt causæ. Qualia plurima in libris Archigenis, Heræ, inuenias: & quod mireris in lib. Apollonij Herophilæ, cum tamē
Herophi

Herophilus omnium maximè distinctiones commendavit: Apollonius autem eas alicubi sequitur, est ubi malè negligit, ut ad aurium dolorem cum scripsisset remedia, subiecit calida, frigida, humida, sicca, & omnibus propè secundis qualitatibus diuersa, lib. 3. comp. ph. part. Debit enim diffinire, cui aurium dolori, & à qua causa singula remedia sua sint vtilia. Sic enim scriptis indistinctè qui fidem adhibent, non medio-criter decepti ægros plerumque offendunt. Ex quibus ap-
Lib. 7. c. ph. p.

paret, parum probandam medicamenti compositionem, nisi dispositio indicetur, in qua eo medicamento sit vtendum. Sed ne fallare, omnibus citra iudicium ne credideris. Nam multa medicamenta titulo magna promittunt, opus autè eorum interim nullum est, interim valde exiguum apparet, ut ad suffusiones differendas myrrha, stacte, & collyrium ex fel-
Lib. 4. c. ph. p.
le scari piscis, inualida enim deprehendes. Expende igitur vires simplicium, & totius, & quid affectus huius, hæc illa differentia, ab hac vel alia causa procedens, in hac corporis natura, ætate, consuetudine, in hoc aëris statu pati ab hoc remedio queat: tum demum te in consilium adhibe, & si potes, peritos, an tali remedio sint vsi, & in quo affectu, & corpore, & in quo successu.

Sine periculo non imitatur eos, qui indistincta scribunt remedia, nam pro varia causa sunt mutanda, ut aurium dolori à frigore, statim medentur calorifica. Eadem tamen dolorem capitis pulsatorium ab inflammatione aut acrimonia mordaci exacerbant: quanquam ea ipsa inflammationes mediocres & non pulsantes sanant, ut acetum mistum rosaceo exactè & calfactum. Archiginem reprehendit lib. 5. c. ph. p. quòd absinthium, hyssopum, origanum ad suggillata scripserit admouenda, nec addidit, coctà ne an cruda veller adhiberi. Adhæc quòd voluit illa applicari aut seorsum, aut cum melle, aut cum aceto, aut cum aqua, perinde ac si hæc viribus essent similia, aut proxima cū aqua, nec cutim nec vlcera mordeat, acetum ambo mordeat, mel solum vlcera.

Malè item Apollonio apud Galenum scribitur, lithargyros cum oleo laurino vel albo, id est, communi, quod malè ceu simile laurino adscribitur, et à laurino ex aduerso distinguitur, cum tamen à laurini virtute multum absit. Idem malè loco lithargyri cerusa vtitur, & mergit eam oleo myrteo, vel laurino,
Lib. 3. c. ph. p.

rino, medicamentis multum differentibus: nam illud repellit, aptum igitur incipientibus: hoc admodum calidum & digerens, vtile est cum humor achoras gignens infixus est ac firmatus, vt prædiximus.

Abfurda similiter est scriptura, si ad aliquem affectum scribis cataplasma, vel alia remedia viribus diuersa, aut etiã contraria: vt si scribis ad affectum aliquem, fiat cataplasma ex blitum cum oleo leuigato, vel ex semine melanthij cum oleo ricinino: nam eidem affectui ambo conuenire non possunt, nisi distinguas, vt illud quia imbecilliter refrigerat, humectat phlegmones initio, & affectibus calidis attribuas: hoc quia calfacit, siccatur phlegmones declinationi, & affectibus frigidis magis minus pro vi remedij & natura partis.

Neque solum ad rectum medicamentorum & aliorum remedium vsum valent hæ limitationes, sed etiam ad rectam medicamentorum compositionem sunt necessariae. ob id si rutam scribis, adde vtrum siccam an viridem velis: illa enim quam hæc multo est calidior & acrior. Quod si indistincte scriptum legis, cõiecta ex viribus & scopo in quem affectum potius vtra sit vtenda. Sic serpillum acre & calidum magis quam viride, sic mētha. Ob id malè scribit Archigenes, menthæ viridis aut siccæ, & rosarum viridium aut siccarum, vt malè ad achoras scribunt quidam apud Galenum oleum rosatum, vel vrina tauri aut cameli acerrima. Illud enim minima virtute præditum repellendi incipientibus achoribus auxiliari possit: hæc vrina admodum calēs & digerens vtilis est, cum humor achoras gignens ibi est infixus ac firmatus.

Limitationes in compositione requiri facillè ostendit vinum miscendum, cuius qualitates & tempus sunt adscribendæ. Multum enim interest, an acerbum, austerum, acidum, dulce vel acre sit vinum, crassum item an tenue, & album an rubrum vel nigrum, & an oligophorum vel valens & vinotum. & an recens aut vetus. quod enim calidæ naturæ & vetus digerit, acerbum & austerum repellit. Tamen inueniuntur composita vt simplicia, quæ siue à tota substantia, siue causa alia ignorata ad omnes sunt affectus efficacia, vt hepaticum admirabile Pharnacis herbarij apud Gal. lib. 8. cõp. ph. part. quanta eius promissa licet Galenus non reprehendat, falsa tamen mihi videntur. Cum enim aromatum catalogo constet, qui ca

qui calidos hepatis affectus iuuare possit? Galeni theriace omnes à pestilentia seruat, qua si correpti fuerint, omnes euadunt vsu theriaces, qui fuerunt sanabiles: sic quæ à tota substantia agere diximus. Tamen in his etiam quædam limitationis necessitas videtur, aut cur Aescrion recens morsis à cane rabido dabat semel in die cochlearium magnum pulueris *Διὰ καρκίνων*, iamdiu verò morsis dabat cochlearia duo. Cur item Galenus ad præcautionem mitius remedium sufficere ait, ad curationē largius & valentius, etiam si id tota sua substantia agit, vt alysson in morso à cane rabido. Hæc tamen quæ tota sua substantia seu suæ totius substantiæ proprietate vel similitudine vel qualitate, aliquē affectum profligant, hoc est, elementorum 4. mitione simili si trahunt: contraria, si pellunt, sed vtraque nobis nulla ratione, nullaq; coniectura comprehensibili: sola enim experientia, vt antè docui, cognoscitur diuina illa rerum quarundam proprietas nobis indicibilis & incomprehensibilis. Ex his patet, quantam vini habeat ad artis medicæ constitutionem distinctio medicamentis ad partium affectus varios inscriptis adhibita: contra autem quantū noceat confusio & indistincta verborum series, qualis toto propemodum Dioscoride, Celso, Scribonio, Apuleio, Actuaria, Simeone, Psello, Celio, Plinio, & aliis propè infinitis, qui medicamentorum vel simplicium, vel etiam compositorum facultates describere tentauerunt. Quibus carere fortasse æquius ac præstātius fuerit, quàm vestigia sequi, nisi quis Galeni methodis exercitus ex natura affectuum & facultate medicamenti cognita, facilè inueniat, cuius talis affectus speciei, & in quo tempore, & an recēti aut veterato, & in qua parte, & in quali corporis habitu, virtute, ætate, consuetudine, viribus, sensu tactus, hoc illud medicamentum tantum, sic sumptū & admotum, cum his, post illa, ante illa est idoneum. Verissimum enim est, quod Galenus vsurpare cōsuevit, Curatio agnitionem & prænotationem sequitur. Rectè nanque is solus curabit, qui omnium nunc dictorū vires tanquàm ipsas literas cognoscet, & qui præuideat, quale & quantum ab his vel ab illis remedijs effectum proficiſcetur, vt si moderatius est futurum, prohibeatur: si inferius quàm opus sit, intendatur: si prout rei propositæ conuenit, sinatur.

DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM AD

COMPOSITIONEM PRAE-

PARATIONE, LI-

BER III.



MEDICAMENTA componendi metho-
do à nobis absoluta, cōpositionis modum,
exēplaq; varia sed celebratiora trademus,
si prius pauca quædam docuerimus, partim
prædictis affinia, partim sequuturis nō uti-
lia solum, sed etiam necessaria. Ad medi-
camentorū siquidem delectum (de quo multa libro supe-
riore diximus) non minimum pertinet scire simplicium ve-
rorum & natiuorū signa, quibus à nothis & adulteratis pro-
bè secernantur. Adhæc cū nomen vnum multis est simpli-
cibus commune, quod ex his, nomine simpliciter pronuncia-
to, intelligēdum sit. Postremò cū simplex aliquod compo-
sitioni necessariū desideratur, quodnam eius loco substituissē
liceat. Ad ipsum verò compositionis modum felicius ob-
eundum necessaria est, simplicium quorundam delectorum
præparatio per ignem, lotionem, trituram, solutionē *χύλωσις*,
id est, vt sic dicam, succationem, muccationem seu muccilagi-
nem, purgationē, & quam vocant clarificationē, quæ ad pur-
gationē referri potest, vt & colatura, clarificationi necessa-
ria. Cuius præparationis etiam in theriaca meminit Galenus,
& alibi passim, præparationumq; libros à quibusdā scriptos
ait idem lib. 2. simpl. cap. 15. Præter hæc instrumentorum
non paucorum, vt ponderum, mensurarum, vasorumq; alio-
rum elegans, pura, proba supellex ad rectè componendum, &
composita recōdenda est necessaria. De quibus omnibus vbi
dixerimus, ad rem nobis propositam aggrediemur.

DE DOLIS SEV ADVLTERIIS

MEDICAMENTORVM.

Medicamenta simplicia, præcipuè rara, & ob id pretiosa
adulterantur, & falsa pro veris, fictitia pro natiuis sup-
ponuntur,

ponuntur, idq; multis modis. Nam simplex idem est interdum sed facultate dolo ablata: vt rhabarbarum maceratione dierum quinque in aqua exanimatum, deinde ficcatum, vel alia virtute, sed improbiore addita, vt si idem rhabarbarum aqua possit maceretur, vel destillata ex tithymallis, vel simplici quidem, sed in quam succus tithymallorum sit dissolutus, aut scammonii. Interdum simplex idem genere est non specie aut loco, vt lib. I. in cinnamomo & casia diximus: & plurima quoque docebimus titulo sequenti. Nonnunquam idem est etiam specie & loco, sed vel intempestiua collectione, vel improba ad repositionem praeparatione, vel ipsa repositione in loco parum idoneo, vel seruatione diuturniore vitiatum est, quorum tam magna est copia, vt exempla deesse nequeant.

Est frequenter quando simplex pro simplice subiicitur, vt pro costo radix enulae Campanae, pro acacia succus prunorum sylvestrium. Frequentius pro simplici multa eius ipsius substantiam, magnitudinem, figuram, qualitates denique omnes quoad fieri potest mentita, substituuntur: vt pro galbano colophonia cum farina fabarum purgatarum, & quae mox plurima leges. Frequentissime ambo simul miscetur, portio scilicet simplicis alicuius veri, sed vel ligni sui vel aliorum mistura aucti & conspurcati, quod in myrrha, ladanum, opopanace, & aliis prope infinitis, malum euidentissimum est. Huc pertinet, quod verorum simplicium nunc puluere fictitia integuntur, ac velut incrustantur, interdum illorum decocto vel infusione macerantur & imbuuntur, vt etiam qualitates ipsorum & substantiam simulent.

Haec autem simplicium medicamentorum adulteria fieri consueuerunt primum & maxime ab his, qui a se ignoranter, animo malo, intempestiue collecta in vrbes conuehant & vendunt: deinde a mercatoribus in regiones alias transferentibus, & postremo ab ipsis rhopopolis ac pharmacopolis. Adeo autem callide nonnulla hi omnes adulterant, sicq; veris assimulant, vt etiam exercitatissimis quandoque imponant: id quod ne frequenter accidat, quorundam figmenta partim prius diximus, in multis simplicibus, partim hic dicentur. Quanquam haec adulteria non publicanda censer Gal. ne prauis homines ubi ea obiter didicerint, opere ipso vitiet & cor-

Lib. 1. antid. et lib. 9. simpl. in diphryge. rumpant. Eadem ratione eos accusat, qui lethalium pharmacorum descriptiones inuulgant. Tamen cum vix regio ista aut velit aut possit hæc vitare, non rarò autem ab institoribus & interpolatoribus externis fallatur, è re publica Gallorum fuerit scire, quibus quædam falsò repræsententur, & quibus notis deprehendantur: præsertim cum etiam ipse Galenus suam illam sententiam interdum non ita anxie seruauit, sed quorundam simplicium adulteria in antidotis, & alibi passim leuiter attigerit: licet quorundam aut nulla aut non exacta est discretio, sed eorum & dolosè paratorum notæ confunduntur. Quædam contrà nullam adulterationem recipiunt, vt agaricum, xylobalsamum, carpobalsamum, pen-taphyllum, polium, zingiber.

Lib. 1. antidot.

Cum igitur omnium nobis bonorum post Hippocratem author Galenus planè intelligeret, quantam vim habeat ad rectè medendum integritas medicamentorum, vt aliarum materiarum medicarum, sollicitus magnoperè fuit, vt medicamenta singula apud se præstantissima haberet, partim ea quotannis ex omni regione ab amicis fidelibus recipiens, partim ipse in loca ipsa profectus, vt Cyprum, Lemnū, quæ volebat exportans, quantum sibi in vitam reliquam sufficeret. Vbi verò simplex aliquod præstantissimū nactus erat, identidem explorabat totam eius naturam, substantiam, colorem, odorem, saporem, vires, vt experientia illa crebra verorum medicamentorū perfectam haberet cognitionem. His enim veris cum vitiato collatis, facile secernebat tanquàm indice quodam germanum & natium à spurio. Vt enim rectum sui & obliqui est demonstratorium, sic verum mendacii, sic præstantissimum medicamentum sui & vitiatorum. Quæ via præterquàm quòd breuissima est, (veritatis enim simplex oratio, & in vnoquoque genere rerum quod perfectum est idem simplex: imperfecta verò ac vitiata propè infinita, vt à signo ad signum linea recta est vnica, infinitæ autem obliquæ esse possunt.) etiam est turissima, ob id quòd simplicis etiam vnus tantum vitiati mistio, totam sæpe compositionem conspurcat & vitiat, vt medicamentum vires non sit habiturum, quas illi maiores dederunt, & quas tu fortasse sæpe es expertus: quo fiet, vt spe tua frustratus tristeris & iridearis: & mirum ni etiam calumniam sustineas, ægro scilicet

licet per id non sanato, quod futurum promiseras, & fortasse ne adiuto quidem : est etiam quando grauiter offenso.

ADULTERIA SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM.



Cacia succo & carne prunorum agrestium re- *Auicenna 2.*
praesentatur dolo parum malo, cum vtraque *canone.*
viribus conueniant.

Aloës crassae partes & impurae lotione separatae aqua marina & croco Mesuae adulterantur: sed croci odor dolum aperit. Alii acacia, alii gummi immiscendo adulterant, tuncq; minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius. *Dioscor.*

Ambra puluere ligni aloës, styracis, ladani, ambræ largioris moscho in aqua rosarum soluto. Sed hæc manuum attritu multo ceu cera mollescit, vera non mollescit, Platearius.

Amomum planta amomide simili, sed inodora, ex Armenia delata, feminis dissimilitudo vitium detegit. *Dioscor.*

Asphaltum, id est bitumen pice mista Dioscoridi licet adulterari non posse, ut neque carpobalsamum, neque xylobalsamum scribit, Gal. lib. 1. antid. *Serapio.*

Aerugo multis modis adulteratur Dioscoridi : sed hodie syncerior videtur, si adulteratam suspiceris, notas ex eo repete.

Aeris flos delimita æris scobe. *Dioscor.*

Bellium adulteratur gummi, sed ita vitiatum minus est amarum, & suffitu odoratum, Dioscorid.

Balsamum, id est opobalsamum, vitiatur terebinthina pauco opobalsamo mista, vel sine hoc, croco orientali & succo foliorum citri, vel oleo nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

Bitumen adulteratur pice, ut in Asphalto dixi. *Dioscor.*

Castorium variè adulteratur: vitium autem facile deprehendes attentus notis, quas in vero & laudatiore castorio diximus, in partibus animalis medicamentosis.

Costus radice prædura Helenii Comagenii, sed odor Helenii minus vehemens, neque caput tentans, & sapor minus acer quam costi. *Dioscor.*

Crocus misto crocomagmate tunso, flore cneci, vel oleo & puluere berfilii, ut vocant, qui fricando dolorem detegit: vel saporem subtili

sublitu, & lithargyro, vel plumbagine ad pondus augendum, vtrunque minus odore vegetum est: prætereà hoc est puluerulentum. Adulterati quoque croci color & odor celeriter euanescent: veri diu permanet, Gal. primo antidot.

Casia odorata, corticibus capparis & radicis tamaricis mistis.

Caphura, gummi iuniperi: sed hoc est minus odorum & durius: illa est friabilis, & odore valentior. Platearius.

Caryophylli vetustate exanimati vino puluerē optimorū caryophyllorū habente irrigantur, siccantur, foris solūm caryophyllos olent, & vix ad dies decē: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palæstinæ oppido affertur, autor est Diosc. adulterari tamen non posse affirmat Gal. lib. I. antidot.

Dioscor.

EVphorbium lacte hœdino, sarcocolle, & glutini mistione conspurcatur, experientia veri est difficilis: nam euphorbium leui gustu os diu accendit, ita vt omnia gustata euphorbium respiciant. Idem iniectum igni odorem edit fastidendum. Dioscor.

Ebur vltum (quod cur spodium vocet vulgus non video) ofsibus canis vltis vel albo marmore vltio: id verò grauitate proditur, illud forma ofsis, & linearum desiderio.

CAlbanum mutatur resina, farina fabarum excorticatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis syncerum deprehendes.

Galanga acris cypero europeo insipido, vel falso, vel bistortæ (vt vocant) radice austera: si verò dictæ radices aceto puluerem veræ galangæ & piperis habente biduo macerentur, foris solūm galangam referunt. Platearius.

LAdanum stercore caprino & puluere nigro, id autē tractando non mollescit, sed in puluerem abit modo ladani vetustate exucti. Viribus prætereà & odore ladani caret, quod sic vitiatum est.

Dioscor.

Lasër omne antequàm siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento, sed maleficium deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione, Dioscorid.

Dioscor.

Licium quibusdam amurca, succo absinthii, felle tauri, sed id à

id à viribus synceri multum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, vt nemo verã à falsa possit discernere: sic & Lycium Indicum, & plurima alia, vt verorum notæ à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alii semen fœniculi aut seseleos admiscentes ligusticum dolo vitiant.

Lentiscina resina, id est, maltiche thuris & resinæ pineæ nucis mistura.

Moschus pelliculis incisis puluere carnis colubinae siccatæ, sanguine hœdino, pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquandiu sit grauius, est legitimum: si pristinum pondus seruat, supposititium.

Manna arabum saccharo & folliculis fennæ.

Myrrha adulteratur gūmi macerato in aqua, in qua myrrha maduerit, Diosc.

Nardus adulteratur stimmi, seu stibio cum aqua aut palmeo vino inspissationis ponderisq; causa inspirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus ab odoris grauitate vocatur, sed herba candidior sine cauliculo, minoribus foliis, radice nec amara nec odorata, vti vera nardus est.

Opi omnes adulterantur addito sagapeno, antequàm inarescant, colore, odore, sapore dolus deprehenditur: & quia cū aqua vel salua nō mox soluuntur adulterata: adulterantur etiā furfure & farina præcipuè *καυλίας*, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior: *ρίζας* verò, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule quod effluit crassum & lentū *ὀπός*, id est, liquor dicitur, lib. 8. simpl.

Opium, semine lactucae agrestis.

Opopanax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua si digitis teratur, non soluitur, nec latefcit vti syncerum, Diosc.

Os ex corde cerui cartilaginofum, simili ex maiorum animalium corde.

Opobalsamum tam variè adulterant & astutè, vt eius adulteria etiā exercitatissimos fallant. Hæc verò adulteria inuulganda non censeo, ne maligni etiam vitient à nobis edocti.

Vitiatur misto vnguento terebinthino, lentiscino, Cypri-
no, balanino, fusino, metopio, melle, vel Cypria cera liquida:
sed maleficiū facilè deprehēditur. Nam verus liquor in ve-
stem laneam fusus maculam non facit, & post lotionem no-
tam non relinquit: cū vitiatu in hæreat. adhæc merus, lac si
instillatur coagulat, & in aqua aut lacte celerrimè liquatur,
& colore lactescit. Alias quasdam notas apud eundem & Si-
meonem si libet, legeris potius, quàm apud barbaros hoc se-
culo adhuc legi solitos, profunda hominum ignorantia, & ma-
gno mortalium incommodo.

Piper longum fraudulenter præparatum, est herba quæ-
dam flaua, quæ à Xene affertur, aspectu quidem, non au-
tem gustu macropiperi similis: hæc autem aqua irrigata sol-
uitur: natiuū macropiper insolubile perimānet, Gal. lib. 1. an-
tidotorum. Piper longum verum ex Barbaris affertur: adul-
teratum verò duplex est, alterum, quod in Alexandria maxi-
mè conficitur: alterum herbæ cuiusdā germen. Quod facti-
tium est, si per diem totum in humore maceretur, illico li-
quatur ac soluitur, lib. 4. fanit. tuend. Illud fortè ex maza sub-
acta aqua, in qua dissolutum aut maceratū sit piper, & in for-
mas effictas, coniecta post siccata. Vidi etiam adulteratum ex
germine & velut nucamento betulæ & coryli.

Pastilli theriaci ex radice pentaphylli, id est, tormentillæ,
Veneriis malè componuntur, non ex viperarum carne, Her-
molaus in Coroll. Musa.

Dioscor. Phu radice rusci admista vitiatur: sed maleficiū facilè de-
prehēditur, quia hæc dura est, frangi contumax, & sine vlla
odoris gratia.

Dioscor. Pompholyx taurino glutine, ouillo vel marino pulmone,
aut grossis vel quibusdam aliis crematis.

Lib. 1. antid. Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium nihil simile habent in
plantis, ob id non adulterantur.

Mesues. **R**ha Ponticum, radice centaurii magni.
Rha barbarum exanimatur maceratum aqua diebus
quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus
nigricat, varietatem in fracturis amisit, densius est, astringit
magis: ex aqua verò illa siccata trochisci fiunt regibus.

ῥήον cum viget ac integrum est, valēter astringit, densum est ac contractum tota substantia, tamē celeriter perforatur. Incolæ regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquā trahunt: deinde rheum siccatum tanquā integrum sit, nec coctum transmittunt, sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astrictionem retinens. Quantum aliis notis rheon à rha barbaro differat, alibi diximus. *Gal. lib. 1. antidot.*

SAgapenum succo lasaris & galbano Diosc. id non eliquescit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissolvitur, *Gal. lib. 1. antid.*

Sarcocolla puluerizata est suspecta adulterii, Dioscor. à quouis pulvere misto: integra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulteratur, sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis. *Dioscor.*

Santala lignis aliis, rubrum berfilio inodoro: flavum & album ligno cedrino odoratiore linguam calfaciente.

Scammonium lacte tithymalli & sarcocolla, vel erui farina, tunc linguam minus valenter pungit & mordet. *Dioscor.*

Saccharum intus fæculentum aut spuma succi cannæ eius auctum, tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

TVrbith, gummi dissoluto quibusdā radicibus extremis illito: verum autem si frangitur, gummofum est intus.

Tamar Indi prunis adulterati non splendent, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorum, multum à semine Tamar Indorum diuerso.

Thus pini resina & gummi: suffitum autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet: odore etiam maleficium proditur. *Dioscor.*

Thuris cortex pini aut nucis pineæ cortice horum tamē index, lignis: nam reliqui cortices suffiti quanquā incēduntur, sine odore fumant. Thuris verò cortex ardet, & odorum fumum edit. *Dioscor.*

Thuris manna adulteratur cribrata pini resina, aut polline aut cortice thuris confuso, sed hæc igne deprehenduntur. *Dioscor.*

Hæc abundē fuerint ei, præsertim qui veras simplicium syncerorū notas ex libro primo accuratē didicerit. Nā cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio huius docuimus, &

in vnoquoq; rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac vnicum. Id si cognoueris, alia ei cōgeneria aut etiam arte affīnia nullo negotio secreueris.

Iam tradamus simplicis alleuius nomine scripto absolute & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figuræ, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorū, florum, seminū, & cæterorū, quodnam sit eligendum: nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus. Quam in rem te iuuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quæ enim radicibus solis sunt efficaces plantæ, illarum nomine, radices veniunt, quæ foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi, sunt vtilis ac medicamētosæ māgis, dum plantæ nomen effertur, partem eius vsurpari solitam elige: quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamēti constituendi forma, vt ammi, anisum, apium, carum, cnicus, cuminum, gith, libypticum, nasturtium, psillium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idq; solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

Anisum Cretense lib. 4. fanit. tuend.

Hagnus, id est, flos eius aut semē, licet folia etiā sint vtilia.

Agaricus, albus & fæmineus.

Aloë. i. succus ei⁹: aloë Indica lib. 9. simpliciu in diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia præstantissimū. libro comp.

pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino non hydromelite vel cereuisia.

Lib. 6. simpl.

Aristolochia pro re proposita explicanda est: rotunda enim cum multum tenuare crassum humorem, tergere vlcera, digerere ex vtero: longa autē cum miora hæc volumus. Clematidis autē, quia fragrantior in vnguentis expetitur.

Amomum, Scythicum lib. 8. comp. ph. part.

Ammi Illyricum lib. 9. eiusdem Aegyptium alii laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligēdum quàm carpobalsamum aut xylobalsamum, lib. 2. comp. pharm. part.

Bryonia alba quia efficacior quàm nigra.

Buglossū vtrūq; foliis & flore efficaci⁹ radice tñ nō inutile.

Casia

Casia vel casia in libris Græcorum. Casia syrix optima, & cinnamomo viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadē lignea dicitur: altera verò fistula his dicta ponitur, cū medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius. Capparis, cortex radicis.

Centaurium, minus in purgantibus medicamentis, in cæte *Gal. in simpl.*
ris maius dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthe, montana, quia efficacior quàm domestica.

Costus, amarus, cū subamarus & valde acer solum nominetur: dulcem tamen nescio quem Arabes inuexerunt.

Cypressus, id est, nuces eius in astringentibus medicamentis, lignum aut folia in diureticis.

Cinnamomum, optimum, de quo in simplicibus abunde.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Aethiopicum, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis: nam satius pastinaca est alimentum verius quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesuæ, quia salubrior, albus Galeno, Aph. 1. lib. 5. Obserua igitur, an compositio sit Arabica aut Græca. Elleborus uterq; & helenium ex locis æditis præstāt.

Eruca, sylvestris, quia efficacior hortensi.

Epithymū, Atticum, melancholiā ex ventriculo purgat: id in Græcis cōpositionibus vsurpādum, in Arabicis Arabicū.

Fœniculus, semē, sed in collyriis succ° foliorū aut radicū.

Galla, solida efficacior quàm perforata.

Gūmi, Arabicū: id em̄ oīm pfectissimū vel Plinio auctore.

Gluten, mastiche, cæteris glutinis efficacior, vt vitrū etiā glutinet, quibusdam intelligitur: aliis ichthiocolla, aliis taurocolla magis placet glutinis nomine.

Hyssopus montanus hortensi melior, vt calaminthe montana efficacior domestica. Hyssopum Cilicium Diosc. Creticum verò Archigenes, apud Gal. lib. 8. c. ph. p. Hyoscyamus, albus, seu album eius semen: quod tamen interdum exprimitur, frequentius tacetur.

Iris, radix ireos Illyricæ veteribus, nunc pharmacopolarum ignauia Florentina vsurpatur, cū illa per Venetos facile haberi queat.

Lupinus amarus: nam dulcis esculentus est, vt ille amaritudo *Lib. 6. simpl.*
dine per macerationem in aqua deposita.

Lactu

Lactuca, semen, præterquàm in victus ratione, vbi herba potius intelligitur.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyros, auri : tamen lithargyros chrysitis aliquoties in lib. c. ph. Gal. legitur.

Mastiche, Chia lib. 7. meth. & alibi passim. Aegyptiā tamē ac recentem ob id pinguisimam laudat lib. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum, alterum aëromeli seu mel aërium & rosidum.

Margaritæ, solidæ meliores perforatis, nisi etiam sint flauæ, obscuræ, solidis pares.

Medulla si non additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, ceruina miscenda valentior quàm vitulina, lib. 6. comp. ph. part.

Nuclei, pini, oliuæ: dactyli autem Auicennæ.

Oleum, oliuum ex oliuis expressum.

Opium, Thebaicū Galen. lib. 7. simpl. & post eum omnes.

Petrofelinum, Macedonicum, & in hoc Astreoticum, & huius semen maximè in vsu est lib. 8. comp. ph. part.

Pruna, si aluus deiicienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multò præstantiora, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia : si ad cohibendum & astringendum fit medicamentum, Damascena immatura, vel potius quæ lorana nobis dicuntur. s. Iuliani & Turonica.

Papauer, album semen.

Piper, album quia acrius, & linguam magis pungit quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalauit, Gal. lib. 8. simpl. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minùs est acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum. Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus: sicca, in siccantibus, vnguentis epuloticis & glutinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Pæonia, mas seu eius radix, vel semen, Manardus ætatis nostræ medicus longè doctissimus in epistolis.

Polypodium, quernum vulgò vsurpatur, murale & à saxis prætulerim cum Narbonensibus quibusdam, quod frequentissimum, & pro querno omnes venditant, nisi si quando astringe

Etione opus est: qua ratione hederam quoque quernam non-nuls expeti audio.

Quatuor emollientia, malua, althæa, viola nigra, acantibus.

| | | | | |
|-------------------|---|---------|---|--|
| Quatuor semina | { | Frigida | { | Maiores, melonū, cucum. cucurb. citru. |
| | | | { | Minora, lactuce, portulacæ, itybi, cich. |
| | | Calida | { | Maiores, cumini, carui, anisi, fœniculi. |
| | | | { | Minora, apij, dauci, ameos, amomi. |

Quinque radices vreticæ, apij, petroselini, asparagi, graminis, rusci.

Resinarum, primas non iniuria meruit lentiscina, id est, *Lib. 8. simp.*
mastiche: inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior
quàm colophonia, & phryctæ dicta: aut illius loco ponitur la-
rix dicta, terebinthinæ propè similis, Gal. lib. i. comp. ph. ge-
ner. recentioribus verò pinea intelligitur.

Ruta, folia rutæ agrestis, Græcis verò folia rutæ domesti- *Lib. 9. c. ph. p.*
cæ. Illam verò & illius semen, moly vel besanum, vel besasa,
vel cum Syris, apud quos nascitur Hermola ferè vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus, sicca in astringentibus.

Raphanus, sylvestris.

Rosmaris, folia, interdum flos, quem nescio cur hodie vul-
gus *ἄνθος*, id est, florem absolutè appellet.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stœchas, stœchados Arabicæ flos.

Stryrax, calaminthes: nam liquidus vulgò dictus est myrrha
stacte, si verus sit.

Santalum, flauum. Spica, nardi Indicæ.

Sulfur, *ἄσφαλτος*, id est, ignem non expertum seu viuum est
nobilissimum: ad quædam extinctum ceu nobis familiarius
præfertur.

σχοῖνος, id est, iuncus, pro scœnu anthos.

Tres flores cordiales, violarum, buglossi vtriusque.

Thymum, Atticum aut ex editis locis & siccis, libro 4.
sanit. tuendæ.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesima-
lis, quòd in ea tempora flos ferè incidat, & eadem recens si
haberi potest: nam sicca inefficax.

Zizipha, id est, iuiubæ recentia & bene matura, aut saltem
integra, non putria aut vetustate exucca, quod illis post sex-
tum mensem ferè accidit.

Sic quæ

Sic quæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen Mileesium.

Agaricus Ponticus Andromach. iuniori in theriaca,
Myfi Cyprium

*Lib. 6. sanit.
tuendæ.*

Nitrum Berenicium

Sinon Syriacus

Cuminum Hispanum, alibi Aethiopicum, melius Aegy-

Lib. 9. c. ph. p.

ptio. Anisum & Thymum & alia plurima Cretica, lib. 4.

Lib. 1. antidot.

sanit. tuend. in diatrion piper. & diacala.

Meon Hispanum & Macedonicum.

Aristolochia Pontica, & hac melior Cretica, lib. 10. c. ph. p.

Phu Ponticum,

Castorium Ponticum.

Daucus Creticus, semine & radice bonus, cæteri solo semine. In Dicearchia quæ nunc vocatur Puteoli, ærugo, cerussa, æs, squama æris, & alia nonnulla. Romæ argenti spuma sit optima: ex Sicilia item, magna Libya & Cræta quotannis multa præstantissima Romam afferebantur.

De his multa libro secundo in delectu medicamentorum diximus, quædam dicturi quoque libro quarto in theriace.

Q V I D P R O Q V O.

Quid, id est,
quod medica-
mentum pro
quo supponen-
dum.



Ἀπὸ ἀλλόθεν, hoc est, simplicia, quæ aliorum facultate similiū penuria supponi possunt Medici consilio, quæ nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet, quod statim ipso initio Galenum citat. Adhæc anacardij fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima, ut loco agarici, euphorbium: pro serpyllo, potamogitona: vice gallæ, sordes gymnastiorum: in locum polypodij, radix chamælexæ aut chamæleontis: pro polythrico, absinthiū, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quæ recipienda magis sunt, tum indidē, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus utcumque proferemus, ut pro

Aqua pluuiæ, supponi potest aqua fontana pura: & ab omni mistione syncera, Galenus lib. primo comp. pharm. part. in diacodio.

Acacia, succus & caro prunorū agrestium, vel hypocisthis,
Auic.

Auicē. 2. canon.

Afaro, acori par pondus & dimidium. Carpesium quoque pro afaro & cum afaro, lib. 2. c. ph. p.

Abfinthio, cum Galeno abrotanum: & contrā pro abrotano abfinthium.

Acanthij semine, lychnis, & cōtrā, ἀντιβαλλομελῶν author.

Acantha Arabica seu Aegyptia herba (quæ succha Serapioni dicitur) acantha leuce nostras, eidem dicta bedegar.

Alicacabo, semen solani.

Asphalto, pix liquida, brutia. Aethiopicæ oleæ lacryma, lacrymarum acaciæ partes duæ, seu pro gummi elemni, gummi Arabicum.

Acoro ad flatum & hepar ac liēnem iuuandum, cumini par pondus, & tertia pars aristolochiæ Auic.

Anchusa, hyacinthus. Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina. Amygdalis amaris, abfinthium.

Aristolochia quauis, vna ex tribus aristolochiis, quancūq; habueris, Gal. lib. 3. comp. pharm. part.

Adipe vulpis, vrsinus.

Adipe ceruino, anserinus. Alumine, sal fossitius.

Pro Balauftio, malicorium. Buccinis, ostrea vsta.

Balsami liquore, myrrha stacte.

Pro Cinnamomo, casie aut amomi duplum ad odoris gratiam Gal. lib. 5. comp. ph. p. in dentifricio. Pro cinnamomo; Lib. 6. sanit. tuende.

duplum optimæ casie, vel cum Quinto Medico duplum vel Lib. 1. antid. multum carpesij, vel certè non paucior casia, Gal. lib. 2. 3. & 8. Gal.

comp. ph. p. & lib. 1. antid. Quidam carentes cinnamomo in vicem eius ponunt æquale pondus ex semine cardamomi; Damocrates in Cyphi lib. 2. antidotorum Gal.

Casia, cinnamomum, Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Casie cortice, nardus indica vel malobathri foliū: vel contrā, lib. 6. comp. ph. p.

Chamæmeli floribus, duplum foliorum & radicum.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidium, vel baccae cedri, vel radix helenij, vel ireos.

Cimolia terra ex Cimolo vna cycladum, retrimētum ferri & molæ simul attritorum.

Struthio, in sternutamentis elleborus albus.

Cardamomo maiore, minus: & contrā.

Calamin

Calaminthe omnis, mentastrium, pulegium similia sunt facultatibus, ob id inuicem sunt antiballomena.

Pro croco, crocomagma. Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen rutæ vel agni. Clinopodio, heliotropiū.

Colocynthide, semen ricini. Capparis radice cortice, cortex radice tamaracis vel ericæ.

Cicutæ femine, coriandrum.

Pro dictamnino, elelisphacus vel nepitha.

Doronico, dimidium seu duæ tertiæ caryophyllorū, Auic.

Damafonio, eryngium. Pro Elaterio, succus foliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, lignum Gaiaci: & contrà. Nam quas vires hodie in ligno Gaiaci experimur, ebeno tribuit Gale. lib. 6. simpl.

Eupatorio Mesuæ, absinthij & asari ana dimidium pondus eius, vt ambo simul mista æquent pondus eupatorii Mesuæ, ab eupatorio Græcorum diuersi.

Pro Folio, folium caryophylli, nardus Indica si inuenitur, cassia. i. vulgare cinnamomum, macis, Auicenna 2. canone.

Ferrum, ferrugo, squama ferri idem propè pollent, & pro se mutuo ponuntur. Fimo palumbis, fimus columbæ.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

Pro Gentiana, asari & radice capparis ana dimidium.

Gongilide, heliotropiū. Glycyrrhizæ succo, æquale radicis eius, Androm. in arteriace, 15 apud Gal. lib. 7. c. ph. p.

Gnidio cocco, semen lathyridis, & contrà.

Galbano, sagapenum. Pro Hammoniaco, propolis.

Hermodyctylo, in doloribus iuncturarum folia anchusæ & dimidium bdellij.

Hederæ gūmi, gummi perfici. Hyacintho, flos Isatidis.

Pro Iride Illyrica, helenium odoratum.

Pro Lapide asio, lapis gagates. Pro lapide magnete, lapis Phrygius. Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argyrites, Libystico, semē staphilini. i. pastinacæ, præsertim agrestis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanariæ radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radice cetaurij magni, lib. 7. simpl. aliis succus baccarum periclymeni, autor libelli Dynamæon, Gale-
no malè adscripti. Pro Melle, mel ærium vel saccharum.

Malabathro, cassia, vel nardus Indica.

Myrrha

Myrrha troglodytica, calamus odoratus. Myrrha, Smyrium, & contrà, Dioscorid. in Smyrnio.

Pro nasturcii semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, par spica. Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

Pro oponanace, hammoniacum, vel galbanum, vel sagapenum, vel bdellium, lib. 2. ad Glauconem in curando scirrhus.

Ozimo caryophyllato, melissa in affectibus cordis.

Oleo laurino, pix liquida, licet illo inferior, vel oleum cedrinum, vel cicinum, vel vetus, vel oleum ex lucerna cum Hera, Galen. lib. 1. comp. pharm. part. vel coctum, sic enim tenuius fit, & veteri ac cicino simile, vel sordes lucernarum luti crassitie. Ibidem.

Oleo rosato, violatum, nymphææ: amygdalinum autem loco rasacei boni, id est, ex multis rosis cum oleo omphacino insulso facti, lib. 3. c. ph. part. initio.

Oleo ricinino seu cicino, raphaninum.

Opobalsamo, opocarpasum Galen. vel myrrha stacte, vel liquor myrti.

Oriza, hordei farina. Oesypo, medulla ceruina.

Lib. 6. c. ph. p.

Omphacio, succus rhois, vel vinum austerum.

Pro Pipere longo, album: pro albo, nigrum optimum, id est, grauissimum: & contrà, 4. sanit. tuendæ.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radice eiusdem drachmæ tres. lib. 9. comp. pharm. part.

Phœnicobalanorū pinguium carnis drachmis tribus, palmulæ seu dactyli tres, aut sex, Galen. lib. 7. c. ph. p. in arteriace 15. Andromachi. Psyllio, lens palustris.

Petrofelino Macedonio in theriaca, alterius regionis petrofelinum, Gal. lib. 1. antid.

Pro resina phrycta, pix, aut pix brutia, Gal. lib. 9. cōp. ph. p.

Rubigine, scorïa ferri. Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem cyathus vnus, Gal. lib. 9. comp. ph. part.

Rosis, flos rosarum, vel contrà, Gal. lib. 6. comp. ph. part.

Rhoë coriario, rhus obsoniorū, & contrà, Gal. lib. 6. comp. pharm. part.

Pro Staphide agria, pyrethrum. Spodio Græcorum, cinis super fornacem aurariam inuentus melior quàm ebur vstum, quod nescio cur hodie Barbari spodium vocent.

Stryace, castorium. Sale Indo, saccharum candefactum.

t Sagap

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.
Spuma nitri, nitrū molle, vel aphronitrū, Gal. li. 3. cōp. ph. p.
Sulfure viuo, flauum vel vstū & purgatum.

Satyrio, semen erucæ, vel scincus : vel contrā.

Sinapi, cardamomū vel cardamū. Scammonio, ricinus.

Stribio cōtuso, squama æris, stannū vstū. Sepiæ osse, pumex.

Serapiade, pæoniæ radix. Scilla, bulbus.

Pro Terebinthina, larix dicta resina, ei propemodum similis, Gal. lib. 1. c. ph. gen.

Thapsiæ succo, chamæleontis nigri succus, vel nasturtiū, vel nasturtii aut erucæ seminis pondus æquale, licet illa sint multò inferiora thapsia, Gal. lib. 1. c. ph. p.

Tamaricis succo, succus sambuci, Gal. lib. 9. comp. ph. part.

Pro Veratro albo, nigrū. Visco querno, chamæleō niger.

Vino falerno, aliud quoduis colore fuluum substantia tenuē, vt perluceat, & sit odorum vehementer, vt Ariusium ex Chio, Lesbium ex Mitylene, Cresso, Methymna & Tmolites, Gal. lib. 1. comp. ph. gen.

Pro Zedoaria, aristolochia. Zingibere, pyrethrum.

Ανθρακίμυξα, vel horum aliqua vel alia potest quæuis regio noua desideratis facultate affinia facere doctorum medicorum consilio : nam si Arabibus & Græcis pro sinapi cardamomum fortè ipsis frequentius licet substituere, quidni pro cardamomo frequētissimum nobis sinapi vsurpabimus? præsertim cū vt pro cinnamomo casiam, sic contrā pro cassia cinnamomum assumi probauimus: idemq; in aliis faciendum puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium melissophyllum (inquit) marrubio facultate simile, sed ipso multò imbecillius, ob id melissophyllo vtitur nemo. Nam absurdum fuerit, præfente vbique terrarum magno marrubii prouentu; vt melissophyllo. Si cui verò ad manū non fuerit marrubium, melissophyllo vti poterit, obseruata eius præ illo imbecillitate, vt ob id quantitas eius augeatur : hæc Gal. qua ratione pro cinnamomo duplum. cassiæ optimè miscemus medicamentis, vt quantitate qualitatē imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modò sint facultate proxima his quæ desiderantur : quia faciliora sunt paratu ponantur, vt in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum rustici cedrio dicto vtuntur : eius penuria

penuria pisselæo, id est, pice & oleo mistis liquida forma: interdum etiam cedrio & pisselæo simul magis & minus mistis, prout vires eius intendere student: hoc autem linunt sin-
ciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem,
Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Sed videtur antiballogenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in promptu habeamus: imò maximè egenus, cum multa simplicia veteribus laudatissima (vt Theriaces compositio docebit) hodie nobis parū sint cognita. Quæ ubi certa erunt, his vtendum potius quàm antiballogenis. Vt enim pluris est equo domini oculus quàm equisonis industria: pluris agro domini vestigium, quàm villi stercorezatio: pluris familiæ paterfamilias, quàm procurator: pluris prætor, cōsul, rex, pastor, quàm proprætor, proconsul, prorex, mercenarius: sic plustribuendum puto his, quæ maiores magno delectu & ratione optima in cōpositiones cooptauerunt, quàm quæ illorū loco coacti adoptamus.

Medicamenta quædam tum purgantia, tum non purgantia, & sumenda, & admouenda, ad compositionem per ignem præparamus calfaciendo, nutriendo, liquando, coquendo, despumando, colando, clarificando, assando, vrendo, extinguendo, lauando, infundendo, destillando, vt sint iniora, vel valentiora, vel gratiora, vel salubriora, vel facultas vna tollatur, aut detegatur, aut noua acquiratur. Multa enim solum calhant, vt dum calfacto pistillo maltichen siccā alutæ intendimus in epithema: dumq; calfacto mortario & pistillo gummi Arabicum & tragacantha siccata promptius in puluerem tenuissimum ducendo læuigantur, præsertim aëre humido: nam sicco, qualis æstate & gelu, præsidium illud non admodum requirunt, nisi sint admodum recentia.

Nomine ignis intelligo calorifica omnia, solem, simum, putrentes cortices, calorem animalis, calcis irrigatæ, & siqua sunt alia præter hæc calfacientia.

Oleum, cera, pix, resina, & similia prius calfacta abluuntur.

Calfacta promptius & perfectius miscentur, sed in calfaciendo sunt certi fines, quos ultra & citra vis medicamentorum non cōsistit. ob id aromata miscemus aliis ab igne depositis, ne ab igni ipso vis eorum dissoluatur, vt postea dicemus.

Medicas portiones hyeme calidas damus, & cùm vomitorias esse volumus, tepidas: cùm hydroticas, plurimum calidas propinamus.

Semina saccharo incrustanda antè calefaciendo modicè ficcamus, vt promptius in his saccharum siccitate concreascet & albescat. Caloris vis in medicamentorum præparatione tam latè patet, vt me dies prius sit defecturus, quàm caloris illius exempla, si omnia persequi liberet.

Nutriuntur, super cineres calidos lythargyrum & molybdena, & cum oxelæo celerrimè liquantur: cum hydrelæo diutissima coctione opus est.

Turbith lacte nutritur & myrobalani oleo, aqua, & aliis apud Mesuen. Sarcocolla lacte muliebri, vel asinæ, vel capræ nutrita aliquandiu post ficcata, idq; aliquoties, reponitur ad vsus. Fit hæc simplicium quorundam nutritio & velut refectio atque auctio interdum sine igni, præsertim aëre calido, vt etiam vnguentum nutritum declarat.

L I Q V A T I O.

Liquantur calore ignis, quæ frigido concreuerunt, butyrum, oleum hybernum, adipēs, medullæ, cera, resinæ: gummi melius aqua soluuntur, & ei miscentur, non oleo, vt succi lentī bdellium, hammoniacum, & similes, vel aceto. vel alio: resinæ verò oleo liquatæ eidē probè miscētur nō aquæ.

Chalcitis metallicorum celerrimè liquatur, & alimen omne, sed scissile mollescit tantum: liquatur & sandarachia & auripigmentum. Lithargyros per se tardissimè liquatur cum ærugine vel duplo oxelæi cocta citius liquefcit, quàm cum hydrelæo duplo, vel paulo plus duplo. In medio horum sunt ærugo & misy: fori autē quia terreum magis est ac saxeum, quàm chalcitis & misy, etiam tardius liquatur.

D I S S O L V T I O.

Crocum, thus, myrrham læuigata vino dissoluit, & medicamento propè cocto miscet, quæ vbi modicè liquata erunt ab igni, deponit Andromachus in arteriace 16. lib. 7. comp. ph. part.

Galbanum, opopanax, sagapenum, hammoniacum ex vino vel aceto, vel alio liquore cocta dissoluuntur. Cum siccis verò trita abeunt in puluerem.

Gummi ferè dissoluuntur liquore aliquo, aut pistillo calido,

Lib. 9. simpl. et
lib. 1. c. ph. g.

Lib. 1. c. ph. g.

do, item & pingues succi nisi ob ficcitatem teri possint, vt frequēter gummi Arabicum, tragacanthi, iuniperi, thus masticum, mastiche, & propē reliqua vetustate vel igni ficcata: recentia verò & adhuc vuida etiam calentibus digitis liquefcunt, aut saltem mollescunt. Eadem tundendo lactescunt, multò magis si pistillo calido in mortario calido tundantur. Gummi quia aquea est natura promptius cum aqueis miscetur, quàm cum oleaginis: resina contrà quia est oleagina, vt in simplicibus diximus. Multa item cōposita, vt cōseruæ, trochisci, antidoti aliis miscenda, antè liquore aliquo dissoluuntur.

Non modò autem hæc ad compositionem sunt necessaria, sed particulares quædam compositiones sæpe sunt antè faciendæ, quæ in alias maiores recipiuntur: vt cyphi in mithridation: pastilli theriaci & scillitici & hedychoon magma in theriacen. Gallia moschata, & alipta moschata in multas Arabum compositiones: & præter hæc non pauca, quæ in sequentibus compositionibus inuenies.

I N F U S I O.

Infunduntur medicamenta parum trita, & maceratur liquore aliquo calente à sole, vel igni per semihoram, per horas etiam plures, vt octo, noctem totam, etiam diem, bidduum, triduum, pro medicamenti natura, & vario medici scopo & necessitate, vt interim vis eorum tota in liquorem illum trahatur & transeat. Hac vtimur non modò in apoze-matibus & syrupis, sed etiam in potionibus quotidianis purgatricibus, vt hac ratione sint gratiores, quàm ipsa solidorum substantia. Citius etiam subeunt aut distribuuntur liquida quàm crassa: quomodo potu quàm cibo facilius & iucundius est impleri. Nec sola medicamentorum facultas in liquorem transit, sed eius substantiæ portio tenuior: interdum etiam crassioris aliquid, præsertim dum infusum valentius colando exprimitur, aut per colum rarius transmittitur. Colandum enim ac exprimendum magis aut minus pro ægri, & affectus, & medicamenti natura. Infusio veteribus parum frequens est, quanquàm multa sæpe in liquore aliquo ante decoctionem macerauerunt, non tamen ad purgationem, quo more nos hodie in ægrorum delicatorum & diuitum gratiam solemus, atque adeò alteramus saccharo & pseudocinnamomo adiectis, vt æger sumpsisse se medicamentū nesciat.

Aph. 11. lib. 2.

*Lib. 4. sanit.
tuende.*

Est quando vice infusionis iusculo aliquo eadem nodulo ligata incoquimus. Galenus verò semen abietis tritum & flores populi nigrae tritos oleo dulci & tenui macerat dies 40. interdum menses duos, tres, quatuor, plures, in domo calida, & sub sole mouet meridiano, postea linteo colatum & expressum oleum reponit, reliqua abiicit.

*Menses in cano-
nibus.*

Insunduntur seu macerantur liquore aliquo medicamenta, vt eorum vires in ipsum transeant (vt dum agaricum, fennam, rhabbarum, & alia multa super cineres calidos temperamus aliquandiu humore idoneo) vel vt simplicis facultas vehemens corrigatur, vt turbith lacte caprino recēs multo maceratum & post siccatum fit clemētius, neque ventrem postea conturbat. Mezereon quoque & esula aceto macerata acrimoniam effrenam deponunt. Vel vt facultas noua medicamentis acquiratur: sic turbith succo cucumeris agrestis temperatum materias à partibus remotis valentius attrahit & vacuat. Hermodactylus item scillæ, aut raphani succo, vel aceto scillitico infusus à iuncturis potentius euocat. Agaricus etiam oxymelite maceratus fit purgātior. Vel vt medicamentū fiat lubricum, ob id medulla colocynthidis, chylo tragacanthi promptè per ventrem totum lubricat, vt neque ventriculo, neque intestinis, neque vesicæ adhæsu suo sit molestia. Scammonium quoque oleo violato vel simili maceratum promptè subit deorsum, nulla aut minima partium noxa, quas permeat. Aut igitur liquor ipse medicamenti vires in se trahit, aut mutat ac frangit, vel auget pro varia cuiusque liquoris natura: vt si aloë decocto aromatum mergatur, illorum vires in se trahet. Sed hæc fusius & clarius nostris tabulis in canones Mesuæ expressimus.

M V C C I L A G O.

*Lib. 6. sanit.
tuende.*

Xυλῆς, id est, succus seu succago ac lentor, ac veluti mucosus ac mucago fit infusis quibusdam feminibus in liquore calfacto sole vel igni. Cuiusmodi sunt semen psillii, ex quo fortem facere expressionē contra falsam Arabum opinionē ne dubita: sic etiam extrahitur ex semine cydoniorū, maluæ, bisfimaluæ, lini, fœnigræci, vrticæ. Lini semen in aqua coctū refrigerat̃ χυλῶν, id est, cremorē lentū, efficit. Quomodo ex radicibus maluæ, bisfimaluæ, symphyti, periclymeni, & similiū: vnde emplastrū est Διαχυλῶν, seu Δια χυλῶν, id est, de muccag

muccaginibus: diuersum tamen ab eo quod de mucilagini-
bus vulgò dicitur, vt leges in emplastris Mesuæ. Ex quo au-
tem liquore succus ille sit educendus, Medicò còsultore opus
est, vt in dysenteriiis cum aqua rosarum & plantaginis clyste-
ribus iniicitur hæc mucago. In pleuritide cum aqua rufila-
ginis aut adianti, aut hyssopi, aut scabiosæ extracta illinitur,
& in aliis affectibus cum liquore alio pro variis Medici sco-
pis. Ex gummi item Arabico & tragacantho infusis mate-
ria sic lenta educitur, vt ex cæterorum gummium dissolutio-
ne. Iniiciuntur autem prædictorum libræ vni aquæ calentis
libræ tres, si crassiorē vis chylon: aut 4. aut 5. si aquosiorē,
& nocte vna, vel horis aliquot macerantur recalsa, & fac-
culo lineo imposita exprimuntur: baculo interdum etiam ba-
tuuntur, donec totus humor glutinosus effluat.

χυλὸς autem etiam succus ex tritis plantarum partibus ex-
pressus, vt lib. primo docuimus. Semperuium autē vtrunq;
portulacam, maluam, symphytum, buglossum, coryledon,
aloe, telephium, & alia permulta lentore multo prædita, vix
succum trita reddere, nisi inter tundendum liquorem aliquē
affundas tenuem & aquosum, non crassum & lentum. Aut
calathò imposita, in cella vinaria herbas tutas aliquandiu in
catinum suppositum destillaturas colloques, aut prius quàm
exprimas, mediocriter calfacias in vase duplici, si refrigerationem
obtundi times. Quòd si liquorem affundas, is herbæ
huius virtutem non vitiet, sed vel augeat, vel foueat, & fer-
uet. Sic polygono mari præsertim ex loco arido, & quando
sementescit, maioranæ, thymo, saluiæ, rorimarino, foliis lau-
ri, hederæ ex locis aridioribus liquor aliquis est affundendus
his facultate conueniens, si succum aliquem ex huiusmodi
siccioribus educere libet.

*Lib. 6. sanit.
tuend.*

CLARIFICATIO.

CLarificantur, hoc est, purgantur & puri fiunt, succi qui-
dam per se, (residendo enim, quod terreum est ac facu-
lentum subsidet) quidam coctione & colatura, quidam vt de-
cocta, alia quæ vix sine albuminibus in singula decocti libras
ferè singulis (quanuis tria etiam sex libris & pluribus suffice-
re possint) purgantur, idq; immisso vel paulò antè, vel illico
post melle aut saccharo: alioqui & albumina vruntur, & pur-
gatio parum bellè procedit. Quòd si qua apozemata aut sy-

rupi, quos vocant magistrales, agaricum recipiunt in fine ponendum, albuminibus non egetur. Albuminum loco etiam est acetum, aqua vitæ dicta, succus limonum & aranciorum. In quibus enim acetum est, despumentur coquendo, & coquantur despumando, donec spumam emittere cessent: tunc enim clara sunt quatenus eis datum est.

Veteribus non fuit in usu, sed horum loco colum panneū, nunc simplex, nunc duplex, interdū etiam triplex, vel rarum, vel densum pro re varia & scopis diuersis aliquo scilicet interuallo vt trium digitorum: angustissimum verò erat & rarissimum summum, latissimum & densissimum imum, mediocre in amborum medio fixum stabat: si quod fæcis crassitie obstructum non patebat, abluendum erat.

Albumina autem ouorum vel in aquam frigidam iniecta scopulis concutiuntur, donec in spumam abeant, quæ particulatim saccharo cum aqua feruefacto, vel decocto alicui iniiciatur, cum scilicet prior nigrescit, aliam substituendo donec clarescat, vel eadem iniecta primū saccharo cum aqua coquendo, vel decocto alicui, vel simul mistis ambobus (quod frequentius fit) scopulis similiter in spumam agitato multo abeunt, simul coquuntur, donec subsidat spuma. Dum verò id decoctum refrixit, modicè quidem si decoctum mediocrè habiturum est consistentiam, vel potius liquidæ proximam.

Magis autem, si decoctū futurum est liquidissimū, vt oxymeli, hydromeli, apozemata propè omnia colantur per pannum album laneum semel, & si non sint clara satis, bis & ter.

Quæ verò decocta succum habent crassum & lentum, vt qui paulò antè succi lenti & crassi sunt dicti, & syrupi & saccharum cum aqua coctum incrustandis seminibus, vel aliis bellariis aptum, calida omnino sunt per pannum colenda.

Aërius & Paulus ebullitionem ad tertiæ partis consumptionem faciebant ante mellis mitionem, ne, opinor, coctione multa mel amaresceret: id quod Galenus in oxymelite non metuit, quod tribus aqua, aceto, melle initio simul mistis posse coqui scribit.

C O C T I O.

*Arist. cap. 3. li.
4. meteor.*

COctio medicamentorum ferè fit elixando in humore calido, rarius assando in calore sicco: simplicia enim non modò alimenta, vt radix ari, draconitū, cæpæ, allii, porri: sed etiam

etiam medicamenta in liquorem cui incoquuntur, vim suam transmittunt, & liquores illius virium aliquid adipiscuntur. Ob hæc alimenta & medicamēta acra elixando euadunt mitiora & gratiora (nisi liquore medicamentofo elixentur) ipsum verò decoctū vires simplicium sortitum à medicis in apozema vel syrupū, vel fotum, vel id genus alia vsurpatur.

Quinetiam coctione fiunt antidoti, cataplasmata, emplastra, & reliqua propè omnia, quæ libro sequenti composita docebimus: in quorum multis non solum facultates simplicium miscentur, sed ipsæ etiam substantiæ. Quid quòd ellebóri radicem raphani radici inter cineres assandæ impositam, vt raphanus iste purget mitius, quàm per se elleborus (cuius rei meminit Gal. quos medicamentis purgare oportet, & quibus, & quando) elixari dicit Mesues: & scammonium malo cydonio circumdatum, & in eo assato coctum, vt ipsum etiam malum clementius purget, quàm per se scammoniū. Coquimus igitur medicamenta permulta, vt eorum vires imbecillas augeamus, aliorum validas nimis minuamus, aut alienas in totum abigamus, vt quoque ex omnibus etiam facultate diuersis & sæpe contrariis facultas vna concreascet & coalescat. Adhæc ad custodiæ diurnitatē coctione longa quædam siccamus, quædam etiam diu coquimus, ob destinatam medicamēti formā: vt syrupum diutius coquimus, quàm apozema vel iulep vulgare: emplastrum diutius, quàm ceratum aut malagina. Quæ medicamenta mel liberalius accipiunt, coqui largius possunt: & item quæ paucū mel accipiunt, si his parantur, qui mel & dulcia cætera auersantur. Nam eo pacto minus est dulce, & minus stomachum eorum qui à melle abhorrent, subuertit. Longo tempore etiam coquuntur: ob id initio decoctioni imponuntur aristolochia, polypodium, hermodactylus, & cæteræ radices, semina propè omnia, fructus, ligna (nisi sint aromatica, aut virtute imbecilla, aut superficialia:) violæ eadem ratione diu coquuntur, quando vis purgatrix in centro earū posita quæritur: rha barbarū, myrobalani omnes quando astringendum, acerbæ, austera, metallica omnia. Parcius verò coquuntur, quorum virtus imbecilla, aut est superficialia, aut facillè ob tenuitatem dissoluitur, aut substantia est parum firmiter contexta, hoc est, rara, vt flos violæ nigræ, si vis

*Libr. 4. sanit.
tuend. in diaco
laminthe.*

Mesues.

leniens quæritur, rosæ, & reliqui propè flores (excepto chamæmelo) epithymum, adiantum album, agaricus, semen cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, rha barbarū, myrobalani omnes, quando per hæc duo, vt rosas recentes purgādum, aperiendum, tergendū. Manna quoque & cassia, & tamar Indi,

Mesues.

Libr. 7. meth.

& 6. c. ph. p. in

diamoro, & 9.

eiusdem, & 1.

antid. in the-

riaco.

di, & cætera dulcedine, vel aciditate lubrica & humiditate multa purgantia. quia vim lubricandi aut comprimendi in tamar Indis imbecillā coctio multa perdit. Aromata quoque, vt nardus, costus, amomum, cassia, cinnamomū, iuncus odoratus, calamus aromaticus, iris, ladanum, folium malobathri, styrax, bdellium, opobalsamum, xylobalsamum, non coquantur: sed cū vas ab igni deponendum est, aut mox vbi depositum est, iniiciūtur. Quod autem in diacydonio zingiber & piper post modicam coctionem & legitimam despumationē imponit, deinde percoquit ad mellis consistentiā, priori loco non repugnat, quia piper non esse aroma colliges ex lib. 9. comp. ph. part. Si tamen hæc maceratione vires in aliquo liquore deposuerint, etiam si prius erant euanidæ, nunc volunt posse vt libet concoqui, & in liquore firmas & integras feruari, vt in syrupo de absinthio Mesuæ.

Decies deferuescente cortina Plinio dicitur in oxymelite Dieuchis, id est, rebus ipsis decies sufferuefactis, seu post decem ebullitiones: sic per alios numeros, vt cū leges apud doctos, Coque donec feruescat semel, id est, vna ebullitione. Coctio cuique medicamento est sua pro variis scopis, citra quam & ultra medicamentum est deterius, pro natura simplicium, affectuū, aëris tēperatura & forma constituenda. Nam minus cocta quo sunt liquidiora, eo gratiora, sed minus diu feruari possunt: vt oxymel Galeni multò gratius, quàm quod officinæ ad mellis crassitiē coquūt, vt scilicet diu feruari possit: cū illud aëre calido vix dies 4. integrū feruari possit. Sed de gradibus coctionis cuique medicamento composito conuenienti dicetur libro quarto in singulis propè compositis.

Coctio ad dimidias nullam habet ambiguitatem, siue interpretæ ad dimidiæ partis consumptionem, siue donec pars dimidia supersit: vtraque enim oratione res eadem significatur, Sed coctio ad consumptionem duarum partium ex tribus scilicet vt trium ex quatuor intelligenda est, qualis multa hodie fit, vt in syrups audies. Coctio autem ad secundas,

das, tertias, quartas scilicet partes, & cæteras Galeno lib. 4. fanit. tuendæ in oxymelite vsurpatur ad consumptionem tertiaræ vel quartæ partis: vt oxymeli sit potu iucundissimum, & etiam in febribus nullo caloris metu bibi possit: quæ dos ad mellis crassitiem cocto pharmacopolarum oxymeliti per se non adest. Apud Plinium autem oppositum intelligitur: nam lib. 14. cap. 9. sæpe coctio (inquit) fiat ad tertiam partem: & de eadem sapa lib. 22. cap. 2. vult eius coctionem fieri, donec tertia pars superfit, seu donec duæ partes ex tribus coquendo sint resolutæ. Qui coctionis scopus sæpe Galeno & Mesuæ exprimitur. Alibi Galenus hunc scopum neglexit, vt in diacodio, cuius finem coctionis esse vult non tertiam aut quartam, aut omnino talem aliquam aquæ partem relinqui, sed cum primum capita coquendo in aqua intabuerint. In stomaticis & stomachicis, & aliis multis sumendis scopum coctionis statuit mellis aut sordium crassitiem, in multis dum manu tractatum digitos non inquinat, nec ipsis hæret. Sed hi coctionum scopi in singulis compositorum generibus libro sequenti plenius explicantur.

Lib. 7. c. ph. p.

In fine lib. 6. fanit. tuendæ.

A S S A T I O.

QUæ assando in vitro, sartagine, alio vase, vel patella, vel prunis, vel cineribus coquuntur, nõ admodum multa sunt: neque enim raphani radix aut malum cydonium propter se assantur tantum, sed multo magis vt vires illa ellebori, hoc scammonii coquendo trahat: assando verò propter se coquuntur Medicis. Cuminum modicè frigitur in vase fictili, quod coctum in camino quàm optimè sit ad diospoliticum. Erysimi semen tostum valentius fit, lib. 7. comp. phar. part. Scilla assatur in lienosis, lib. 9. comp. ph. part.

Lib. 4. fanit. tuendæ.

Alia non pauca Medici assando, seu (vt vocat) torrefaciendo præparant diuersis rationibus. Quædam enim vt ficciora facilius ad læuorem terantur, vt gummi, tragacantham, herbæ, radices, flores, vt rosæ, crocus, vbi celer vsus pulueris requiritur: crocus etiam papyro impositus igni vel sole ficcatur. Sericum Arabibus torretur, vt puluis fiat. Psillium vulgò, nuclei pini, & bdellium torrefiunt Andromacho, libro 6. comp. ph. part. Sic sideritem & perdicidam assat Galenus lib. 5. comp. ph. p. in suo dentifricio.

Quædã vt vis eorum per ignem augeatur: vt scilla tosta & in sart

in fartagine frixa maiorem assumit acrimoniam, humiditate largius absumpta, ob id purgantior euadit. Scillam grandem luto circumdatam torret Crysermus, & corticem, ac quod in fundo duriusculum aufert, & *πυρρὴν*, in est, nucleum, accipit, lib. 9. ph. p. in splenicis.

Quædam vt vis eorum minuatur, sic cæpa, allium, ari radix sub cineribus assa, minùs acria & magis vesca euadunt. Sic asii fructus, vt poma, castaneæ flatus deponunt, quomodo elixum hordeum, & alia pleraque præter fabas, nisi iis acria, vt cæpas misces. Eadem ratione opium & meconium ob eius narcoticam malignitatem Apollonius & alij quidam insignes viri torruerunt: sed quia torrendo omnis eius in stupesciendo sensum efficacia aboletur, non tostum Galenus mauult castorij caliditate obtundi. lib. 3. ph. part. Sic psillium assando siccatum minùs aluum subducit Arabibus, cum ei solam refrigerandi facultatem Græci dederint, non etiam lubricando purgatricem, multò minùs causticam in medulla ipsius conditam: quæ Arabum somnia videntur.

Alia virtute duplici, & interdum repugnante prædita, assando facultatem vnam vel perdunt, vel minuunt, alteram intendunt, vt myrobalani & rha barbarum assando vim purgatricem amittunt, alstrictoriam augment: & balanus myrepicæ, id est, ben assando vomitoriam facultatem in humiditate nitrosa largiore positam deponit, deiectoria remanet, vel hoc valentior, quòd à vomitoria motu contrario non impeditur.

Vt rara aut virtutem imbecillam vel superficiariam fortita decoctionem longam non sustinent: sic neque longam assationem, quæ ex illis assanda veniunt, non autem vrenda sunt, ne ipsorum facultas corrumpatur.

V S T I O.

*Arist. c. 3. li. 4.
meteor.*

QUòd si assatio fiat maior quàm còueniat, à calore sicco adustio est maioris tantum ratione ab assatione differens: nisi hoc etiam quis ad amborum discrimen congerat, quòd vrèdis simplicibus multis, vt terreis, metallicis, alia quædam miscentur, quæ vel flammæ edant, vt sulfur, sal petræ, mel: vel ignis vim celerius in vrèdum corpus deducat, vt pro sua natura ipsum corpus alteret, hoc est, rarius, leuius, tenuius, purius, splendidius, acrius, siccius, calidius efficiat.

Vrendorum medicamentorum causæ sunt variæ: quædam enim

enim vruntur, quò sicciora reddita & solutiora, læuigari & tenuissimè comminui possint, pili, lana succida, testa ostreorum, buccinorum, purpurarum, vngues & cornua multorum animalium, & ossa & coria, & alia, quæ vel ob terrosam duramque corporis consistentiam & concretionem condensatam sunt fortita, & partes impendio crassas, quia ab ea vim quandam cogendi, vel ob lentorem immodicum, aut humiditatem aliquam vsui esse non possunt. Sic enim rectè vngues caprarum vsui ex aceto alopecii illinuntur: & vngues asini, & cranium hominis vsu ad epilepsiam bibuntur: & osium aliorum cinis ad arthritidem: & cornua cerui & capræ vsa veniunt in dentifricia: & testæ ostreorum in emplastra: pompholyx & hæmatitis in collyria. Nitrum si lapidosum est, vri vult Gal. lib. 8. meth. vt ad frictionem sit aptius.

Alia verò vruntur, vt essentiæ crassitiem deponant, & tenuitatem induant, aliasq; facultates igneum calorem sequentes. Metallica vrendo tenuiora euadunt, sed etiam ignis commercio mordacia & rodentia: elota autem rosionem deponunt, & lenia prorsus redduntur. Arsenicum vsutum & non vsutum est causticum, sed vsutum tenuioris est essentiæ.

Gypsum vsutum tenuioris fit essentiæ & siccantius, quàm non vsutum, & fit minùs emplasticum. Pumex vsutione tenuitatem & aliquid acrimoniæ acquirit, quam lotionem deponit. Cornu cerui & capræ vsutum terget. Cinis corij veterum calceorū siccatur vlcerum. Pili & lana succida vruntur, vt acris, calida sicca, tenuium partium fiat. Testa ostreorū & cætera terrea vruntur, non modò vt in puluerem minui possint, sed etiã vt tenuioris sint substantiæ, & cogendi quandam facultatem deponant, et contrariã digerentem accipiant. Cinis radicis asphodeli magis calfacit, siccatur, tenuatur, digerit.

Abrotanum vsutum, anethi radix, & anethum ipsum, *κρόνδα* vsa siccandi vim magnam acquirunt, & abrotanum etiam mordendi.

Alia vruntur, vt vis quædam nostro scopo aliena in superficiem trahatur, postea lotionem separetur, quo fine hæmatitem & pompholygem sæpe vrunt, & lauant ophthalmici, & Galenus lapidem Phrygium (vt post leges.)

Alia vruntur, vt colorè nouum induant ægro gratiorem: sic ærugine vsa Galenus emplastra faciebat melina, id est, coloris

*Hæc lib. 11.
simplicium.*

*Lib. 6. simp.
ibidem.*

Lib. 9. simp.

loris mali cydonij, quòd viridis multos terreret. Sic cerussa trita vsta, rudicula ferrea mota transit in sandyca, & fit rubra, vt ochra & auripigmentum: & ossa multum vsta albißima fiunt, & cornua cerui potiùs quàm capræ vsta dentes dealbant sua substantia, non sola vi deterforia sine morsu, quam vtrunque vstum obtinet.

Alia vruntur, vt in aliam transeant speciem: sic ex viperis vstis sal fit theriacus: ex cinere brassicæ aut betæ, & aliorum sapore nitroso præditorum, fit à quibusdam nitrum: ex calce vsta & fæce vini vsta cauterium: ex antimONIO vsto, sulfure vsto, cerussa vsta, calciti vsta, oleum. Sunt qui aloën, acaciam, bolum Armeniam, opium, & alia quædam adurant, sed paruo aut nullo successu.

Vrendi modus non est omnibus vnus: quædam enim humore pingui prædita per se vruntur, vt pili, lana, cornua, vngues, ossa, coria, hirundines, & aues quædam aliæ, viperæ; & alia quædam pedestria. Et hæc in olla noua operculò foraminulèto testæ sunt vrendæ, præsertim cum cinefacta disperdi possunt: quæ verò etiam vsta manent integra, vt vngues, ossa, cornua, hæc etiam viuus carbonibus tradi possunt, nisi quædam sint addenda, quæ vim eorum mutant: tunc enim etiam in olla noua vruntur: sic viperas cum substratis quibusdam medicamentis Galenus vrebat ad falem theriacum.

Lib. 11. simp.

Alia materiam aliquam inflammabilem requirunt sub-
sterni, vel aliter misceri, adipēs, resinas, olea, ceras, mel, sulfur, & id genus alia, vt libro secundo Pharmacopœæ ex Dioscoridis libro quinto & aliis abundè explicabimus. In præsens verò sufficere existimaui, causas vstionis, & modum vrendi proponere, quem vno Galeni exemplo indicare non fuerit alienum ex lib. 4. cõp. ph. part. Vritur (inquit) lapis Phrygius ad oculorum sanitatem, in minuta confractus frustula, magnitudine nucis auellanæ, & in ollam recentem iniectus, luto deinde extrinsecus circumlito, vbi operculum imposueris perforatum, vel in solo vertice, vel (quod est melius) etiam pluribus aliis partibus, vt fumosi & fuliginosi effluxus eorū quæ vruntur, per ea foramina efferantur. Vbi iam lapis totus euaserit ignitus, in vas purum ex olla traducto butyrum superfunde recens, agitando lapidis vsti particulas. Id fac, donec extinguantur omnes, & tunc cessa. Rursus ollæ redditū vires iterum

Herum carbonibus perustis, vt nihil fumidum habeant, semper euentilando, vt citius combustio absoluator. Vbi erunt igniti, nec vlla ampliùs fuligo emergit, effusos lapides restingue vino falerno, aut quodam rubro & odoro. Tertiò vre vt priùs, & vbi ignitus erit, extingue melle Attico non largo. Sic alia multa sunt comminuenda, & ollæ imponenda, non tamè omnia toties vrenda. In quo exemplo obserua operculum cum vase lutari, & ipsum esse foraminulentum, & carbonem perustos, & à materia, in qua extinguitur, igni rarefactum corpus, vires quasdam ocularias in sese trahere.

L A V A T I O.

Medicamentorum lauandorū scopi sunt quatuor. Primus, vt partes eorum impuræ tollantur, qua ratione herbæ si puræ sunt, etiam si intybus est, aut fonchus: radices, multa semina, metallica lauantur aqua pura & fontana: nec metuas cum Mesue vim superficiariam dictarum herbarum hac lotionem dissipari, quod in rosis & floribus aliis metui potest: sed hi ferè puri sunt, neque lotionem requirunt.

Secundus, vt facultas eorum velut in profundo mersa & parum efficax sit euidentior. In cadmia etiam non vsta, & aliis quibusdam tergendis vim occultam lotio detegit: sic aloë lota ventrem magis roborat.

Tertius est, vt virtus medicamenti malefica, vel nobis in affectum præsentem incommoda tollatur, & quæ expeditur, maneat: sic vsta omnia si lauentur, moderatiora fiunt, & acrimoniam vstione acquisitam deponunt, ac minùs mordacia redduntur, sed ignea illa natura in aquam deposita ipsam efficiunt tenuem & calefacientem: quod verò terrenum remanet, morsus expers vlceribus humidis fit epuloticum. Ob id æs vstum acre & subastringens lauari vult, vt cicatricem inducat in carne molli: in dura enim est epuloticum citra lotionem.

Chalcanthum vstum & lotum fit moderatius, lib. 4. comp. ph. part. & chalcitis, pòpholyx, os sepiæ, & id genus alia sunt abluenda, præsertim cum vlcere, vel oculo, vel parti alij insigniter sentienti acrimonia mordax est noxia. Testa ostreorum, buccinorum, purpurarum, vsta & lota vlcera caua & fistulosa, & ob fluxionem diuturna carne implet.

Ceruinum cornu vstum lotumque dysenteriiis salubre.

Semen vrticæ succo tragacanthi lauat Mesues, ne deuorando

Lib. 4. c. ph. p.

Li. 7. method.

Lib. 9. simp.

Lib. 11. simp.

Lib. 6. simpl. rando fauces & œsophagum adurat, cum tamen non vehementer calfacit Galeno, neque mordicet, sed tantum essentiae tenuitate & detergendi facultate titillet, ac ventrem subducatur. Quod verò partes vrtica herba contestae pruriant, id punctura sit aculeorum minimorum, quibus tota hæc armatur, magis, & minus, quos non sentias, si inferne sursum prehendas: **Ibidem.** sed contra sentias maximè. Eodem succo aloë lauatur, ne hæmorrhoidas excitet, vsu multo & crebro.

Lauantur eadem ratione plurima citra vstionem acria: acaciam lauatur Galenus, ut acrimonia per lotionem deposita siccet sine morfu. Oleum quoque, picem, resinam, ceram, & alia permulta lauatur (quod post audies) ut morsus & acrimoniae sint expertia. Gummi Arabicum in aqua lotum ad arteriacen vult Andromachus, lib. 7. comp. ph. part. Aloë lota minus vacuat, magis ventrem roborat. Lacca lota minus soluit, magis aperit obstructions ventriculi, hepatis, lienis.

Lib. 7. meth. Cyanus & lapis Armenius lotionem vim vomitoriam deponunt, & purgandi molestiam, deiectionem retinent.

Cyanus & lapis Armenius lotionem vim vomitoriam deponunt, & purgandi molestiam, deiectionem retinent.

Quartus denique scopus abluendi medicamentum est, ut à liquore facultatem aliquam nouam acquirat: ut si succo tithymalli aut decocto medicamentum aliquod lauas, eius vires in se transferat: sic aloë lota decocto aromatum stomachicorum ventrem potentiùs roborat. Turbith decocto agarici lotum aut infusum valentiùs est purgatorium pituitæ: decoctum scammonij, tithymallorum, & aliorum id genus in se lotis vim suam largitur. Aqua vel vino albissimo lauantur metallica ad emplastra alba. Aqua lauatur, si affluens in vlcus humor est acer & mordax. Vino austero, si humor affluit largior: acetum vel aqua marina, si vlcera sint tumida, & cum oris crassis & callosis attenuationem multam requirentibus: sicq; in reliquis est liquor mutandus pro affectus & partis natura, & aliis indicationibus curatorijs. Sic calida succo refrigerante, ut cucurbitæ, lota frigiditatem deposita aut saltem diminuta caliditate induunt. Contra verò frigida succo calfaciente lota, et in cæteris ad portionem: quomodo in decoctionibus diximus.

Lib. 1. c. ph. g.

Lib. 2. simpl. cap. 15. Lauandi autem modus is est Galeno, ut quæ calfacta liquantur, nec possunt aquæ misceri (qualia sunt oleum, cera, pix, resina, & alia quedam) modicè calefiant, ac mox infundantur in vas magnum oris lati, semiplenum aqua purissima omnis qualitatis

litis experte (quando scilicet medicamento nullam vim novam addere volumus, sed id tantum purgare, aut facultatem eius mesam detegere, aut noxiam tollere) sed quæ ex sole vel igne repeat. Tum id corpus lauandum in aqua ipsa teritur, tunditur, frāgitur, subigitur manibus, ut vnaquæque medicamento ablundi particula aquam tangere possit, & in ea suam acrimoniam exuere. Denique aqua hac effusa, in synceram aliam vasi infusam recalsa, ipsa medicamenta immitte: rursus admodū diu contunde: mox idem tertio, quarto, ac sæpe deinceps faciendum, donec omnem suam qualitatem in aquam deponat medicamentum, seu donec aqua nullam ex loto medicamento qualitatem amplius recipiat, quam rem gustu, colore & odore cognosces.

Oleum hac ablutione non modò mordacitatem & falsuginem exuit, sed etiam fit candidius, aquea ac rufa eius substantia separata ac deterfa: ipsum tamen lauando minus verberabis, quàm ceram, picem, resinam, ne adeò aquæ misceatur, ut ægrè postea separari possit: sed ita verbera, ut dum quiescere paulisper fueris, innatās detrahare possis: non falsum verò & omphacinum lotionem non admodum indiget.

Quæ verò lapidosa & dura sunt, ut cadmia, æris squama, *Ibidem.*
æs vstum, ea tenuissimè contrita ex aqua fontana & purissima multum diuq; teruntur, ea aqua subinde effusa, & pura in eius locum affusa, quoad nihil sordium medicamento in aqua innatet, maneatq; aqua medicamento qualitarum omnino experta. Quandiu enim aliquid eius aquæ ipsi innatabit, aut qualitatis eius quidpiam sensui apparebit, tam diu terendum & effundendum. Sic lithargyrum, diphryges, cerussam, misy, fori, stymmi, & omnes lapides, præterea calcem lauare vult Galenus lib. I. comp. ph. g. non tamen semper aqua, sed etiam vino, vel aceto, vel aqua marina, vel alio liquore, cui metalli-
ca & terrea ob innatā gravitatē facile subsidēt. Vult autē hæc toto die cum liquore illo medicamentoso contrita per noctem in eo relinqui: postero die manē illum abiici, & alium mox superfundi: postea rursus similiter teri, & sequenti aurora liquorem iterum effundi: idq; fieri, donec morsus sint expertia hæc metallica, & sordes nullas in aqua relinquāt, sintq; pura & perspicua. Quòd si hæc æstate sub sole feruenti laueris, medicamentum potentius siccabit, tenuius erit & albius.

Lauandi scopos quidam numero definiunt, vt pompholygem & hæmatitem vtenda in collyriis oculorum septies lauant ophthalmici medici. Armenium lapidem & cyaneum etiam quinquagies Alexander Trallianus & Mesues aqua buglossi lauant. Alia diutius vel parcius lauanda pro ipsorum facultate, substantia, & medici indicationibus.

DESTILLATIO.

Destillatio est humoris alicuius à planta, animali, terreo, vi caloris facta extractio. Destillatio veteribus intentata, næotericis vsitatissima propter hominū huius ætatis molliem, aut nouorum morborum malignitatem, præcipuè inuenta naturæ imitatione, quæ in maiori mundo vi solis & aëstorum & caloris in terra conditi vapores ex terra, præcipuè aqua & aquosis in mediam vsque aëris regionem educit, cuius frigiditate densati in nebulam coguntur, aut nubē, quæ soluta in pluuiam, niuem, grandinem destillat. Eadem in homine (vt animalia quædam alia catarrhis quoque obnoxia omittam) minore mundo, ex spiritu, humoribus, solidis partibus, cibo, potu, caloris aut natiui, aut etiam aduentitii vehementia vapores tollit in cerebrum, cuius frigiditate densati in pituitam coeunt, substantia, quantitate, odore, colore, sapore, tam variam, quàm vaporis elati & cerebri cogentis varia est natura: vt omittam, quòd ei ex mora in cerebro, & sæpe ex putredine vitium accedit. Tollitur autem vapor hic maxime à partium subiectarū, vt hepatis, cordis, ventriculi, sanguinis totius, calore: ex humore non minimum tamen trahitur & à capite calidiore, aut natura, aut per tegmina multa, crassa, densa, aromatibus farta, perq; solis & lunæ radios præcipuè perpendiculares, aut his proximos. Collectus postea in cerebro hic humor, dum quantitate aut qualitate, aut vtraque ipsum molestat, à vi eius expultrice derruditur, nunc qua data porta in partes subiectas, nunc in nares, meatus purgando cerebro à natura institutos, nunc verò calore interno, vt per febres: nunc externo, vt per æstum liquatus fluit: nunc à frigore externo compressus. Cùm autem dixi, ex terra & solidis partibus tolli vaporem, ne terram intellige elementarem, siccissimam, durissimam, & ossa iam planè terrea, aut partes alias in nobis continentes siccissimas, sed terram nobis notissimam,

firmam ex elementis 4. conflata, & in qua humoris aliquid inest: partes item solidas nondū exuccas. Quando vapor mediæ inter aquam & aërē naturæ non tollitur, nisi ex corporibus humiditate aliqua præditis, isq; solum vi caloris alicuius.

Hanc separandi à re aliqua humoris rationē imitata mortalitas, humida corpori (sic enim vocant latius vas, à quo vapor tollitur) imposita vi caloris tenuat in vaporem, qui capitelli, vel alterius frigiditate coactus in aquam alueolo in marginem capitelli inserto ferè excipitur, mox per nasum (sic enim etiam vulgò vocant capitelli partem, naso nostro figura & vsu finitimam) in subiectum vas (receptorium & matellam dicunt) aliquod destillat: sed aliæ sunt & vasorum destillantium & humorum species, de quibus postea fusius.

Planta ergo aut corpore alio ad destillandum composito, pars eius quæ tenuari est aptior (quæ scilicet natura tenuior, leuior, rarior, liquidior, superficialia magis) illa primum vi caloris tenuata tollitur, postea alia illi natura propinqua: postremo id quod ceu humidum rei substantificum terreas partes glutinans, pingue & oleaginum vi ignis validiore separatur, integrumq; attollitur: quo omnino extracto, velut cinis factum corpus & dissolutum cernitur. Quomodo calor in nobis valentior spirituofam primum humidamq; substantiam, & recentē, tum carnem, tum adipem dissipat, deinde veterē, postremum insitum ipsum humorē absumit ignis modo in lignis vel candelis, cineritias ac terreas faciens reliquias.

A planta igitur omni & animali ac omnibusvtriusque partibus aqueum aliquid crudum, ac velut pituitosum excrementosumq; primum extrahitur, mox coctius & tenuatum magis, postremo oleaginum, quod etiam ex ossibus ipsis extrahitur, non modò ex aliis partibus solidis, nisi quòd quædam essentia tenuioris vires propè vniuersas remittunt primas. Quin & chymistæ etiam ipsa elementa ex corporibus simplicibus sese vi ignis separare affirmant.

*Arnoldus de
villa noua.*

Porrò hæc omnis humorum extractio calore perficitur. Nam quæ per licium, penicillum (filtrum vocant) arenas, vas figulinum crudum, cissimbium, id est, vas hederaceum fit humoris transmissio, destillatio non fuerit, nisi abusiue loquentibus. Calore enim propriè dicta destillatio perficitur, & eo vel à sole, vel ab igni, vel à putredine. Vidi & à

vino in lacu feruente, & à puteis cellisq; vinariis, ac aliis locis subterraneis per hyemem elatum vaporem in operculo, qualiter in olla vsuuenit, concreuisse in aquam, quomodo per hyemem animalium exspiratio in proximis corporibus in pruinam cogitur. A sole flores magna quorundam industria aquam reddunt, floribus ipsis odore & gratis qualitatibus aliis proximam.

Ab igni autem, id est, à flamma, quæ ex aëre, & aëreis corporibus producitur, vel à carbone ignito, qui fit ex terra vel terreis corporibus accensis, destillatio fit vel nullius alterius interuentu, vel mediis aquis feruentibus, vel etiam ab his vapore, cineribus, arenis tenuibus, scoria læuigata.

Flamma prætereà ipsa vti & carbo non parum variat non solum maioris & minoris ratione, sed etiam lignorum vel putrium, vel graueolentium, vel beneolentium, & integrorum vel viridium, vel siccorum. Adde quod clibani magnitudo, & figura, & connexio magnā vim habet caloris mutandi. Præter hæc carbo ex suffocatis & semiustis lignis graueolentiam & qualitatem quandam alienam rebus destillandis, vt coquendis & aliter præparandis imprimit: quomodo qui accenditur in panibus corticeis, quos coriarii confingunt, & qui ex carbone terræ, & qui ex cespitibus, & qui ex siccatis stercorebus etiam bubulis. Sint igitur carbones omnino accensi & semiusti, vt ex eis malignitas antè expirauerit, quàm his res destillanda committatur, præsertim si in corpus est recipienda. nam ad mouendorum ratio minor habenda est. Prætereà aquæ feruentes, aut ab his vapor mitius agunt in rem destillandam, quàm vel ignis ipse per se, vel etiam per media alia sicca prædicta. Ob id vt Galenus in diplomate, id est, vase duplici (balneū Mariæ vocāt cuni chymistis pharmacopolæ) liquat, calfacit, coquit ea, quorum vires ignis violentia dissipari non vult: sic quæ mitia integriora volumus, in aquis feruentibus imposita destillamus, vel earum vapore. Quæ quamuis minus duratura putantur, sunt tamē minus à sua natura mutata. quam rem odor pristinus declarat. Fornacem huius generis habeas, cui vas æneum grande superponatur aqua plenum: ei verò vasi æneo vascula in arcū superponantur quàm plurima possunt, in quorum fundo res destillanda insit. Alii aliter fornacē velut in arcē scilicet extruunt, & eius lateribus vasa

vasa inferunt terrea, longa, fundo latiore res destillandas continente intro penetrâre, ore foris tanquàm lagena operculato, in qua vapor per apertilem eius ventrê elatus concrefcit, per os eiusdem prælongū destillat. Talis est Godefredo Cochuo Medicorum Parisiensium viatori optimo ac diligentissimo pharmacopolæ. Quæ denique destillatio à putredine fit vel fimi equini tam solius quàm cum calce paulatim irrigata & sæpe mutata, vel corticū humectatorū, vel aliorum putrentium, vt chymistis fuerit in multis utilis: medico tamen non est recipienda, propter causam in lignis putribus & ex putredine vel alia de causa graueolentibus, si præsertim intra corpus est recipienda: nam admouendorū minor habetur ratio.

Facienda igitur destillatio medicis vel sole, vel igni per flammam lignorum integrorum, vel carbonum iam ardens semiuistorum, maximeq; in vase duplici, aut aquæ bonæ feruentis vapore, præcipuè quoties sumenda destillantur.

Quoniam præter hæc variant multum vt cocta sic destillata vasorum ratione, magna in his cura est adhibēda, vt terrea sint vel vitrea potius quàm metallica: & quæ terrea sunt, ex luto sint puriore, & diligēter cocto, qualia sunt figulina nobis Bellouaca, & Britonia, & Hispanica. Vitrea autem sunt præstantiora, quia puriora & densiora, sed etiam chariora & fragilia magis, nisi paulatim incalescant & refrigerentur. In quo etiam discrimine sunt terrea. Ob id vtræque luto sapientiæ, quod vocât, paulatim vndique circumlinunt, & siccant, quantum vasis eius, ignis violentiâ attingere debet, etiam si cineribus, arenis, scoriis primum excipienda sit. Nam quæ aquis aut ipsarū vaporibus insident, vasa munimēto nullo indigēt.

Metallica verò, plumbea, ferrea, ærea, stannea, argentea, aurea, cur damnem, in promptu Galeni ratio est, in singulis propè horum metallicorum generibus. Si enim aquam plumbeis tubis delatam affirmat dysenteriam generare, quis metus ab aquis receptorio & capitello plumbeo destillatis?

Adde quod cerussa non pauca in superficie interna plumbei capitelli vt aceto destillando colligitur, sic vi empyreumatis cum vapore plerunque etiam acri, nempe ex plantis acribus, ascendentis, ea quæ aquas ipsas inficit, & magna parte lacteas reddit, donec subsederit. Ex cæteris metallis, quæ vel ferruginem vel ærugineim gignunt vasa, tantum

habent periculi, quantum ferrugo & erugo nocētiōr cerussa. Purgatiore argento & auro facta ut sunt innocentiora, sic paratu ob sumptum magis difficilia.

Neque corporum quæ vocant, neque capitellorum (quæ alembica dicunt) vna omnibus ad omnes fuecos destillandos est forma. Nam aqua trahitur quibusdā ex vino imposito in vas æneum magnum igni incubans. Cui collum crassum tripedale inest, & collo huic insidens capitellum etiam æneum in pyramidē fastigiatum, ambiente id velut situla aquam frigidam continente, ut celerius vapor largus à capitello refrigerato densetur, & ne ignem sic referat aqua vini. Aliis loco colli & capitelli vaporem excipit fistula ex ferro albo vel alio metallo, prælonga in multos anfractus mœandrorū modo & serpentum contorta (vnde ei vulgò serpentinæ nomē est) in aquam magna sui parte mersa.

Aliis alia quoque est forma. Sic quæ corporibus seu corpulentis vasis nō erectis, sed velut cubatibus imponuntur capitella limbo carent, suntque lagenis terreis vulgaribus proxima.

Interdū capitelli forma est, ut dixi, in acutum pyramidis modo mucronata, interdum parte summa capitis modo latefcit, ut plus vaporis capiat, & largiorē aquam cogat, sed tunc ferē in vas corpulentum ex vertice relabitur.

Alii vtriculos vitreos aut terreos mutuò applicant (quos musas cornutas vocant) quorum alter lutatus igni insidet, materiam destillandam continens: alter ab igni procul abest, humorem recipiens, in ambobus collis concretum.

Est quando per descensum fiunt aquæ & olea quædam, quomodo ex resinosis arboribus vrendis pix.

Sunt verò formæ vasorum aliæ propemodum infinitæ, præsertim chymistis vsurpatissimæ, de quibus plura dicere supersedeo, præsertim quod intellexerim Ioannem Baptistā Montanum Veronensem medicum doctissimum in id opus magna cura præcipuoque studio incumbere, ut habeat Medicus, quæ remedia ex metallicis corporibus, & aliis arte fusoria & sublimatoria vires habent præstantissimas & efficacissimas, ad morborum pertinacissimorum curationem.

Vidi & capitella duo, ut per inferius pertusum materiæ portio in superius ferretur, quod cum inferiore clauiculatim iungebatur, ne inferius lutatum esset auferendū, cum recens materia

materia vasi corpulento erat infundenda. Hæc autem destillata vires simplicium à quibus separantur, retinent: nisi quòd tenuiora & valentiora fiunt, quò frequētius destillantur: quod in aqua vini ferè experimur, rarò in aliis.

Huius liquoris vires quidam alterant vel illito capitello ali qua materia, vt melle, ladano, aliis: vel ea naso imposita, quod ferè fit ad odoris gratiam: moschum enim caryophyllos, caphuram, id genus alia nodulo ligata summo naso impingunt, vt per has materias transmissus liquor odoris suauitatem contrahat.

Vt verò empyreuma quod his inest paulatim expiret, satius fuerit phialas, quibus hi liquores seruantur, apertas aliquandiu tenere: obseruando tamen, ne interim odoris gratia, & cum ea virium multum exhalet.

Haftenus quæ per ignem fit medicamentorum præparatio diximus, & quæ per lotionem obiter expressimus, quòd vsta ferè lauantur, & quæ alia præter hæc lotionem requirunt, magna parte ignem aut solem quoque postulant. Nunc dicendum qualis esse ignis debeat, & ex qua materia.

Carbones iam perustos vult Galenus in vrendo lapide Phrygio, lib. 4. comp. ph. p. ne quid fumidum habeant. Vtq; emplastrum ex lithargyro sit albus, eligit idem oleum purius, lucidius, & aquam puram & candidam. Eadem lignis peruri coëptis vel perustis antè carbonibus exactè incensis coquit in aëre syncero, sub dio, in sole, quia oleum crassum, aqua turbida, aër nubilus, vmbra, fumus, medicamento nigredinem faciliè conciliant. Quæ cura in his admouendis, & horum tantum colore naturam rei parum mutâte, tanta Galeno adhibita nos magnoperè admonet nostri officii, vt ignis & aëris in coquendo etiã admouenda, multò magis sumenda, rationem magnam habeamus. Hac ratione theriacen farnentis vitis percoquit, quæ etiam boni sunt odoris. Sic antidotos stomaticas, arteriacas, stomachicas, & alia omnia coquit in lib. comp. ph. super carbones accēfos, vel igni ex lignis siccis, & ob id sine fumo: quia fumi acrimonia præterquam quòd nullius in his est vsus, etiam incommodat suo morfu.

Tali quoque igni mel despumat, & cum tenuissimo puluere trium piperum anisi, thymi, zingiberis ad finem addendo percoquit, lib. 4. sanit. tuendæ. Est enim despumatio hæc

Lib. 1. c. ph. g.

*Libr. theriaces
ad Pisonē, &
lib. 1. antidot.
Lib. 7. c. ph. p.*

Libr. 4. sanit.
tuendæ.

Lib. 7. comp.
phar. p.

non mellis solum, sed etiam aliorum quæ coquuntur, præparationis species per ignem facta. Mel enim curiosius despumatum miscetur compositioni dia trion pipereon, & diospolitico theriacæ, Mithridatio, & aliis. quia verò mellis acrimonia est pauca & utilis in arteriacis, retinetur.

Nec satis est ignem ex carbonibus accensis omnino aut ex lignis ob siccitatem ἀνασφαις, id est, fumi expertibus fieri ad rectam medicamentorum compositionem, ne odor scilicet terter ex contrariis in medicamentum transeat, sed in multis quoque & ἰσχυρὰ, id est, ignea vel qualitas vel substantia vitatur, maxime in his, quibus vis est refrigeratoria. Vitatur quoque virium in tenui substantia positarum facilis per ignem dissolutio. Ob id medicamenta, in quæ cautiones hæ cadunt, in diplomate seu vase duplici (de quo postea quoque in instrumentis pauca dicenda) coquimus: quod balneum Mariæ vulgò cum chymistis vocamus.

Ibidem.

Omnes arteriacæ, quæ vim mitigandi, leniendi, digerendi habent, optimè in diplomate, id est, vase duplici coquuntur carbonibus aut lignis perustis, ut in magno lebetes aquam calidam infusam habente, vas alterum continens medicamentum coquendum collocetur: ut si arteriacam coquis ex melle & terebinthina coqui in vase duplici ad spissitudinem qua iam coalescat: deinde galbani obolos tres adde & coque donec manus non inquinet, deinde refrigerato lævia cætera misce.

Ibidem.

Sic coquendum oleum anethinum Galenus vult, lib. 4. sanit. tuendæ: & chamæmelinum, & acopum abietinum, & ἄνις αἰγύγιον. Et semina, ac flores cum dies 40. vel duos, tres menses oleo maceramus, & ei ceram & resinam liquando miscere opus est, in diplomate miscemus.

Libr. 5. c. ph. p.

Oleum lentiscinum recens in vase duplici est tepesciendum ad sedandum dolorem phlegmonarum in gingivis, tunica linguæ, cute totius.

Aromatibus quoque ad saporis vel odoris gratiam, & sæpe vires maiores coniunt medicamenta, iisque nunc simplicibus, ut amomo, casia, cinnamomo, ambra, moscho: nunc compositis, ut alipta moschata, gallia moschata, pulueribus aromaticis, electariorum, quorum exempla non pauca in componendi ratione per ea quæ melius compositum reddunt, audisti: multa quoque libro sequenti auditurus.

Terere

Terere seu tundere est cōminuere crebro percussu, nō solum humida, mollia, & virentia, sed etiā sicca, sic vt hæc in puluerem abeant, vnde Plinio trita in farinam & tusa cribrataq; dicuntur: quanquā hoc posterius etiam de humidis intelligi potest, quæ trita per cribrum vi cochlearis aut rudiculæ aut manus cernuntur: sicca verò trita cribri succussione descendunt. Vtrunq; humidum & siccum scilicet *λαίνειν* Græci dicunt, id est, læuigare seu læue & politum reddere, & in puluerem tenuem comminuere, & cum vino vel alio liquore multum subigere: vulgus batuere, pilare, pistare, vt herbas, fructus, semina, radices, ligna, & cætera tam mollia quā dura. Succī tamē lenti gummium modo, vt galbanum, Lib. 6. c. ph. p. hammoniacum, sub pistillo dilatantur magis quā læuigentur. *κόπτειν* etiam, id est, scindere in pila, & tundere herbas, radices, & semina lib. 1. antidot. in theriaces præparatione.

τρίβειν quoque, id est, terere non tantū in puluerē comminuere, sed etiam de visis passis, de bdellio, & vino, & myrrha, & aliis similitudinibus per se dicitur in lib. c. ph. p. & g.

Vtq; illa patent latius, sic quæ ad purgationē horum pertinent: nam lib. 9. cōp. ph. p. *σαρκίνας τὸ ὑγρὸν*, id est, vbi facco transmiseris liquorem, quod hodie de farinis & siccis ferē vsurpatur, vti saccus pro cribro & incerniculo magis sicciorū quā humidiorum. *τὸ ὑγρὸν ὀδονίω ἀμυδίσαιμι*, id est humidum scilicet oleum linteo percolauimus, lib. 4. sanit. tuend. in acopo ex semine abietis, quod etiam hodie ad sicca præcipuē terrea & metallica transtulimus, idq; cicotrinizare speciatim dicimus, verbo opinor corrupto ex *κοσινίζειν*, id est, cribrare & incernere, vnde & *κόσινον ἰατρικόν*, id est, cribrū medicum dicitur lib. 6. comp. ph. part.

Ducere pistillo scilicet per mortarium aut super marmor leui cōpressu thus, mastichen, & similia, quæ tundendo latefcunt: sic rha barbarum per se, sic lithargyrum cum oleo vel oxelæo vel hydrelæo nutritum, & alia permulta non humida modò, sed etiam sicca, quæ trituram illam verberatu multo faciendam non tolerant. Quinetiam metalla vel aliud quidpiā elaboramus, & pluribus diebus, præsertim in sole cū aceto vel alio simili diu conterimus, vt lib. 1. comp. ph. p.

Teruntur medicamenta præcipuē sicca, interdum & humida, multis rationibus. Nunc vt promptius quod potentia sunt, Lib. 1. simpl. cap. 11.

sunt, id actu fiant, vt medicamenta potestate calida quo tenuius sunt trita, eo citius & facilius à nostro calore actu calida euadunt, & nos vehementer calfaciunt, cùm integra ipsa aut nullam aut minimam calfaciendi energiam assequi possint: quomodo ligna crassiora ægrius incenduntur, quàm eadem minutim concisa. Piper enim si integrum aut ore contineres aut deuoras, parum id calfacere deprehendas etiam post tempus longū, cùm eius puluis tenuissimus mox vbi linguæ impositus est, eam vehementer incendat. Eodem modo calida omnia potestate: sic folia plantarum calidarum tusa calent nobis & magis & citius quàm si integra vel sumantur vel admoveantur. Qua ratione succos plantarum, & liquores, & gūmi, & resinas, & si qua sunt alia ex his liquidiora, tenuiora, calidiora reliquiis harum plantarum, ex quibus separantur, docet passim Galenus. Idem indicium tibi esto de frigidis potentia, quæ vti calida, à calore nostro accipiunt, vt actu frigida euadant. Sic vsta vt magis siccant, accuratè pollinis modo sunt læuiganda, & cribro tenuissimo cernenda.

Nunc ad misticionis necessitatem. Quæ enim trita sunt tenuissimè, & cribro tenuissimo creta, simul compositioni miscentur, cùm partibus suis minimis se mutuò cōtingāt, promptius & valentius se inuicē afficiunt, ac tandē cōpositi virtutem vnā rectius cōstant. Quæ terendi ratio in cōpositis propè omnibus locum habet. Nunc medicamēta teruntur magis vel minus, vt facultatem acquirant à priore diuersam. Quæ enim tenuissimè sunt tusa, & cribro tenui creta, maximè in totum corporis habitū digeruntur: ediuerso crassiora in ventre hærent, quia angusta venarum ora subire nequeunt: ob id diospoliticon crassius facio, cùm aluum per id ducere studeo: tenuissimū verò & minutissimum pollinis modo, cùm vrinas mouere. Cuius præcepti in omniū medicamentorum cōpositione meminisse oportet. Hæc Galenus. Eodem fine rha barbarū, asarum, cuminū, & alia permulta negligēter trita aluū subducunt: tenuius vero cōminuta in corpus promptè subeunt, & venas perreptant celeriter, vrinasq; mouēt. Eadē ratione facilius est impleri potu quàm cibo: aqua itē & oleū terebinthinæ vel aliorum hepar, lienem, renes purgantium celerius munere suo funguntur, quàm ipsa rerum corpora. Sic scammonium tenuissimè terunt, si medicamentis corpus

peruad

*Lib. 4. sanit.
tuendæ.*

peruadentibus miscent: crassius autem, si catapotiiis aut aliis, quæ diu in ventriculo manere volunt. Aerugo item chalcitis, misy, fori, chalcanthum, æris squama, & alia similiter valentia diu ex aceto trita morsum & rosionem obtundunt, vires augēt: quia cum partium sint natura crassiorum, vim suā in altum vsque corporis curandi non demittunt: ob id vt tenuiora fiant, diu ex aceto terenda sunt & dissoluenda, vt sic curiosè attenuata ad penitiora vsque penetrent, & corporis meatus pertranseant, nusquam inter eundum retenta: & si calidioris sint naturæ, sine morsu munere suo fungentur.

Lib. 2. c. ph. g.

Quomodo humores corporis tenues facilè citra rosionem perspirant, crassiores retenti & obstruentes grauando aut rodendo: si acres sint, molestant. Ex multa autem tritura in sole cum aceto quippiam vstioni ab igne simile rebus ipsis accedit, tamen calorem igneum non assequuntur. Vsta tamen & sic trita ex aceto ac læuigata multò præstantiora sunt. Sic aromata (quæ *id est*, species Paulus & Actuarius sæpe appellant) negligenter tunduntur, cum vires eorum diu integræ sunt seruandæ: tenuissimè verò, cum his viribus in præsens est opus. Præstantius quoque est dentifricium, quanto exactiùs simplicia sunt trita, Gal. lib. 5. comp. ph. p.

Terendorum verò non vna est natura. Quæ enim substantia sunt tenuia, si sunt sicca, promptè in partes minimas disperuntur, vti humida mox per se sparguntur, & altè corpus imbuunt: crassa verò contrà. ob id illa minùs diu, hæc longiori tempore in eūdem scopum terenda sunt. Quapropter metallica & terrea cætera quòd crassa sint, etiam post vstionem maximè diu sunt terenda, præcipuè quæ oculis sunt imponenda collyrio vel sicco vel liquido. Qualiter si tenuia & rara, & imbecilla ac superficialia facultate prædita, parum diu sunt coquenda: contraria diutiùs.

Rara quoque mediocriter & friabilia parum diu terenda sunt, vt rha barbarū, scammonium Antiocheum (quod laudatissimum Mesues existimat.) Accuratiùs dēsa & lenta mediocriter, vt aloë.

Rara mediocriter addidi, quòd quæ sunt immodicè rara, vt agaricus, colocynthis, per se in puluerem tenuem comminui nequeunt, sed vel cum aliis sunt puluerizanda, aut priùs in trochiscos fingenda, siccandaque. Tunc enim nullo negotio te

tio tenuissimè teruntur : quæ res facit, ne ventriculi & intestinorum tunicæ præ mole hæreant, humoreque superfluo imbuta molestiam his partibus afferant magnam ex opprefione, & diuturnam ex pertinaci adhæsu.

Lenta quoque mediocriter dixi, quòd quædam ex his etiam ob siccitatem mediocriter iam dura, nondum tamen per se puluerizari possunt, sed sub pistillo latefcunt. Quapropter aut vetustiora sunt eligenda, aut sole vel igni siccanda, aut cum aliis siccioribus & friabilibus & tenuioribus terenda, vel aliquo liquore idoneo sunt dissoluenda. Sic tragacantha, gummæ Arabicum, thus, myrrha, mastiche, sarcocolla, styrax, bdellium, euphorbium, ladanum, succus glycyrrhizæ, & alia gummæ, resinæ, liquores, succi, dum vetustate aut aliter sunt siccata in puluerem terendo, aut pistillo diu multumque per mortarium ducendo comminui possunt, vel per se, vel cum siccioribus : cum verò sunt recentia, melius aliquo liquore dissoluantur. Eodem pertinent semina quædam, vt cnici, lini, canabis, cydoniorum, citri, bombacis, melonum, cucurbitæ, cucumeris, citreoli, amygdalas utrasque, & fructus quosdam, vt dactylos, baccas halicacabi ob lentorem & pinguedinem, quia etiam ducendo latefcunt, nõ terenda esse, sed vel scalpro, vel cultelli acie identidem verberata minutim inciduntur, vt in compositiones veniant tota sua substantia.

Adde quòd vt coctione longa non modò vires imbecillæ resoluntur, sed etiam empyreuma coctis rebus imprimitur: sic longo attritu corporum durorum pistilli, mortarij, & terendorum etiam cum humore (vt scriptum prius Galeni testimonium probat) calorem in terendis præsertim diu medicamentis vel gignit, vel auget, qui medicamentorum facultatem mutat: & si imbecilla est, dissipat, diffusiõe adiutus per agitationem illam excitata. Quam caloris ex attritu durorum generationem planè indicat farina, quæ ex breuissimo contactu molarum calida tamen in subiectam arcam decedit. Ob id thymum & hyssopum vt coctionem, sic trituram medicamentum sustinere scribit, & in aliis similiter.

P V R G A T I O.

PVrgantur, seu vt vulgò loquuntur, mundantur medicamenta quædam intus, quædam foris, quædam intus & foris, quædam nusquam. Intus, à seminibus, vut passæ, si Me-
- dicus

cus imperari: myrobalani omnes (exceptis Indis enucleatis, & magna ex parte emblicis) vva rhois, nisi in decoctum veniat, quando nec pruna passa, nec myxa, nec zizipha purgantur à nucleis: nisi quòd expressa pruna nucleos in colo relinquunt: myxa, zizipha non exprimuntur. Foris, quæ excor-
Semen tamen cucumeris are- factum & cō- tusum & cri- bratum vsur- pat lib. 8. simp. Gal.
 ticantur, vt semen cucurbitæ, cucumeris, citruli, melonum, cnici, ricini, dente, vngue, cultello, forpice purgantur. Semen quoque citri, limonum, aranciorum, pæoniæ vtriusque, staphidos agriæ, & nucleus strobili, id est, pineoli, pistaciorum, bombacis, cerasi, perfici, anacardorum, nucis Indicæ, cultello, vnguibus, malleo.

Bacca lauri in emplastro de meliloto. Ficus in diacnico Gal. lib. 5. sanit. tuendæ. Amygdala vtraque si in confecturas recipiuntur, aqua calida parū macerata, faciliè digitis depellatur, vt strobili & pistacia, & alia similia, sine aqua in marcipanes & cōdituram recipienda. Si verò in oleo exprimuntur, integra prius tunduntur: si in decocta veniunt, integra iniiciis: si verò foris admouenda sunt, cum cute teruntur: omnia prædicta foris non purgantur. Hordeum, triticum aqua calida parum diu maceratum pistillo ligneo in mortario æreo promptè deglubitur, zaa & oriza, molis: zaa iterum vt hordeum purgatur. Radices quædā solūm recentes abluuntur, & circuncisis radiculis seruantur vel vsurpantur, vt cichorij, rusci, asparagi, buglosi vtriusque.

Aliæ vtendi tempore cultello raduntur, vt radix glycyrrhizæ, gentianæ, rubiæ, pæoniæ, tormentillæ, & doronici, tunici, vt vocant.

Quarundam superficies tota circunciditur, & si quid intus inutile apparet, exciditur, vt rha barbari, agarici, ireos.

Intus & foris simul, mala cydonia in diacydonio. Dactyli etiam edendi, colocynthidis fructus cortice & semine purgantur, vt sola maneat medulla seu caro.

Radices quæ intus habent substantiam lignosam, vt raphani, apij, petroselini, sceniculi, saxifragiæ, oxalidis, peucedani, ellebori vtriusque, pseudodictamni vulgaris, pityusæ, id est, turbith, esulæ, scillæ, capparis, tamaricis. Scilla etiam nucleis & agnatis purganda. Tamen cyperus, enula, costus, acorus verus, integra teruntur aut coquuntur.

Ellebori radicū fibræ aqua paulūm macerantur, post cortices

Lib. 9. c. ph. p. in lienosis.

tices extracti in vmbra siccantur in vsus: vt & zingiber, calamus aromaticus, casia, cinnamomum, galanga vulgaris.

Et baccæ myrti, iuniperi, interdum etiam baccæ oxyacanthæ, asparagi. Piper omne, carpobalsamum, cubebæ, cardamomum, ainomum. Semina fœniculi, apij, cari, ameos, dauci, cumini, feseleos, cardui benedicti, lini, fœnigræci, anisi, anethi, papaveris, portulacæ, lactucæ, cichorij, psyllij, milij vtriusque, & cætera semina parua nec intus nec foris mundantur à pharmacopola, sed vel trita vel integra vsurpantur. Ex magnis item cicer, faba, lupinus, eruum, vicia, semen agni (manibus confricandum, vt deposita canicie nigrescat) hippo felini, cydoniorum.

Gummi quædam & fucci solidi, & liquores, & resinæ, terra, foliis, scobe, ligno, cortice suæ parentis adulterati purgantur liquore idoneo fusi vel dissoluti, postea colati.

Quorundam seminum sola medulla in compositiones recipitur, vt cnici lib. 5. sanit. tuendæ: melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli, & aliorum magnorum. Tamen solus cortex rhois est vsui, vt multarum radicum, apij, eleoselini, fœniculi, raphani corde lignoso execto. Semina illa sole siccata tere leuiter in mortario, frica manibus, cerne cribro medullam solam transmittente, si non succedit, forpicibus, vnguibz, dêtibz, cultello excortica. Semen tamê lathyreos, daphnoidis, & alia id genus non pauca vno die insolata, aut ignita patella parû assata rupto cortice promptè exilit. Amygdalæ, strobili, pistacia, nuces, aqua frigida per noctem, vel calida parum diu macerantur, aut ignita patella tosta excorticantur.

INSTRVMENTA PHARMACOPOLARVM PRÆCIPVA.

ΟλμοϞ & δύεα Gal. in præparatione theriaces, lib. i. antidotorû sæpe: δύνδωρ Damocrati in compositione Cyphios, lib. 2. antid. Gal. est mortarium seu pila. Ea autem est lignea, terrea, lapidea, marmorea, eburnea, vitrea, aurea, argentea, ferrea, plumbea, stannea, ærea, multiplex, & ex quauis materia: magna est pila, vel parua, vel mediocris. Ex eadem materia esse possunt ὑπεργοι, id est, pistilli, & in vsus eosdem ὀχλοι, id est, vectes, vt in præparatione theriaces Galenus, & magnitudine

tudine proportioni pilarum respondent. Et suæ materiæ ferè applicantur lignei pilæ ligneæ, ferrei ferreæ, plūbei plumbeæ: tamen lignei etiam pilæ lapideæ, eburneæ, æreæ in quibusdam terendis, aut frangēdis, aut deglubendis applicantur. Ferrei autem propè soli mortario æreo hodie seruiunt ob vtriusque duritiem. Ob quam pilas Aegyptias commendat Galenus in præparanda theriaca: quoniam, inquit, cum durissimæ sint, nihil inter contundendum ex earum substantia in ipsa quæ læuigantur, exteritur. Quapropter etiā hodie margaritas & alia sic dura super lapidem prophyrium terunt, nō in mortario æreo aut ferreo, vt à quibus multum substantiæ in margaritas trahatur & deradatur. Lapidei, marmorei, vitrei fragiles maximè fuerint, vt & eius generis mortaria, quorum crassities fragilitatem penset.

ὁδὸς δὲ, id est, cochlear paruum, magnum, ad commiscendum, subigendum in mortario, vt in theriaces compositione, & ad eximendum trita, vt mox ex Critone disces. Crito pilam in qua teruntur medicamēta, pelle tegit duplici in medio forata, quātum pistillo terenti, & hoc ablato, manui & cochleari satis pateat ad eximenda quæ trita sunt, vt incernantur. Altera illi ex superna parte iniecta, quæ foramen habeat minus, quantum scilicet soli pistillo satisfaciat. Hæc autem tollitur, vbi tenuissima medicamenti portio in puluisculum soluta subsistit. Item quod cretū est tegatur, donec motus eius constiterit, tūc cribrum aperi. Quam consuetudinem hodie vellē in vsu nostris esse, præsertim cum pretiosiora terunt.

*In fine lib. 1.
antidot.*

Sint autem tam pilæ quàm pistilli & vestes puri exactè, & nihil æruginis habentes, cum ferrei sunt, vel ærei, vel argentei. In pilis per pistillos quassantur, teruntur, molliuntur, subiguntur, miscentur, ducuntur materiæ medicæ ad varias compositiones. Quædam molis etiam exiguis sinapi & segetum modo teruntur quibusdam locis.

Diabesasa stanneo vase reponi vult Heras, lib. 8. comp. ph. part. Theriacam verò non ligneo, sed pretioso aliquo vase vult seruari lib. antidot.

Medicamentum stomachicum vase corneo reponitur, lib. 8. comp. ph. part. Terebinthina vase ex ferro albo aut vesica sicca meliùs feruatur, quàm ligneo, lapideo, vitreo, terreo duro etiam feruatur.

De his paulò
antè.

κρίνον & κροκίνον ιατρικόν, id est, cribrum medicum, Gal. lib. 6. cōp. ph. part. σάνη & σάνηιον, id est, faccus Medicis, & hodie vulgo Gallorum dicitur, vti & Hebræis: vnde κροκίνισεν, id est, cribrare, & σάνηισεν, lib. 9. comp. ph. part. Cribrum est setaceum, stamineum, vt nobis dicitur, ex pilis caprarum, lineum, sericum, ex ea scilicet panni serici specie, quam tafetum vocamus: & ex his quædam rara, alia densa, alia amborum media. Item quædam parua, alia magna, alia mediocria.

Τὸ ὑγρὸν ὁδονίων διηδίσταμεν, li. 4. sanit. tuend. id est, humidū linteo percolamus.

Vasa oris latioris & angustioris permulta sunt necessaria ad continendum, macerandum, infundendum, coquendum, assandum, vrendum, reponendum, cacabi, lebetes, pelues, patellæ, frixoria, hydriæ, pocula, & hæc lignea, lapidea, marmorea, ex alabastro, achate, terrea solū vel etiam plumbata seu vitrata, stannea, ferrea alba, ærea rubra, ærea flaua, ærea stannata, argentea, aurea. Vasa tamen è stanno & argento parum purgato vitanda, quia illud plumbi mistura adulteratum est, hoc citò ducit æruginem, Gal. lib. antid.

Et in his quædam vtrinq̃ue ansata, alia sine ansis, alia vnicam ansam nacta, alia item caudata à manubrio his vocantur, alia sine cauda, alia deniq; magna, alia parua, alia mediocria.

Inter terrea vasa sunt optima Valentina ex Hispania, pocula intus candore, nitore, læuore alabastritis proxima, foris pictura nitenti mirè variegata, conseruis, syrupis destinata.

Præter hæc ἀγγείον δίπλωρον lib. 1. antid. quod ibidem paulò post vocat τὸ ἐνισχυτικὸν ἀγγείον τῷ ὕδατι: in methodo autem vocat δίπλωμα, nos ad verbum vas duplex, vulgus balneum Mariæ cuiusdam chymistidis, magni vsus ne frigida calore perdantur, aut pretiosa vrantur, viresque eorum vanescant, quia calorem per vas aqua calida plenum & igni superpositum recipit. Lebetes prædicti præcipuè ærei stannati ad medicamenta coquenda fornaci exemptili incensos carbones habenti imponuntur, rudiculis (quæ σπάδαί Galeno dicuntur lib. 1. cōp. ph. g. vulgò spatulæ) nunc ligneis, frequentiùs ferreis magnitudine variis mouentur ac miscentur. Sic lebetem stanno inductum coquendo oleo Sicyonio adhibet Diosc.

Pyxides medicamentis siccis seruandis simplicibus & compositis

positis ferè sunt addictæ, & hæ sunt vitreæ, terreæ, plurimum lignæ ex trunco solido tornatæ & cauatæ, vel afsiculis coagmentatæ, sed illæ semper rotundæ: hæ verò nunc rotundæ, nunc quadrangulæ, nunc etiam quadratæ, nunc ouales, nunc ex rectis lateribus in extremo rotundantur: at verò ambæ tam tornatæ scilicet quàm sutiles magnitudine plurimū variant. Pyxide lignea pulueres quosdam reponit Gal. lib. 6. cōp. ph. p. Sub abaco supputatorio multæ cōduntur arculæ exemptiles, seminum multorum & aliorū velut loculamenta.

Sunt & stateres magnitudine varia plurimi, & mensuræ, & pondera, capacitate & grauitate multū variantia, ac etiam forma inter se differentia, de quibus postea.

In marmor seu lapidem durissimum alium, penidia & saccharum rosatum effusa paulatim concreescunt. In porphyrio lapide seu squama maris, vt vocant, seu vitro, margaritas & lapides pretiosos ducendo paulatim comminuunt. *Lib. 11. simpl.*
ἰγυθρον χαλκοῦ, id est, patella æris rubri, in qua Aeschriō cancos vrebant ad morsus canum rabidorum. Cuminum frigit in vase fictili, quod quàm optimè sit coctum in camino. Quæ enim exactè penitusq; cocta non sunt, hæc lutosa potius *Lib. 4. sanit. tuenda.*
 quàm figulina sunt, & qualitatū suarum non nihil medicamento imprimunt.

DE P O N D E R I B V S E T M E N S V -

ris, quæ Galeno præcipue, & ætatis nostræ Medicis in vsu sunt frequentiore.



Edicamēta ferè sunt sicca, aut liquida: illa magis pondere, hæc potius mensuris metimur. Tam pondera verò quàm mensuræ, quamuis propè sunt infinitæ, etiam hodie pro diuersitate regionum & consuetudine vtentium, tamen

in ordinem ac numerum referre conabimur. Primum autem pondera quanta poterimus maxima breuitate & perspicuitate explicabimus, quòd horū frequentior est vsus in medicamentis conficiendis: ad mensuras postea transibimus. Quoniam autem medici ferè Attica obseruatione vtuntur, vt lib. 21. cap. vltimo ait Plinius, non alienum à re proposita fuerit, pōdera primum Attica enarrare, & à minimis ad maxima per media ceu per gradus quosdam procedere.

Λεπτόν, id est minutia omnium minimum & indiuisibile.
 Χάλκινος, id est æreolus vel æreolum, pēdit septē minutias.
 ἑβδόμη, æreola sex. ἡμιόβολος, i. semiobolus, æreola tria.
 Γράμμα, id est, scriptulum, obolos duos.
 Δραχμή, scriptula tria, seu obolos sex.

Μνᾶ, Ἰ. Latinis Mina, drachmas centum, seu vncias duodecim cum dimidia. Hæc autem est mina maior seu Solonis, quem Plutarchus pondera & mensuras auxisse scribit, cū mina vetus & minor nunc abolita, esset tantum drachmarū quinque & septuaginta.

ἡμιμνᾶ, id est semimina, drachmas quinquaginta.

Τάλαντον, talentum, paruū quidem, minas sexaginta: magnum verò, minas octoginta, seu libras octoginta tres & vncias quatuor. Nam mina Attica drachmis quatuor est grauior quàm libra Romana, licet Plinius μνᾶν Græcorum medicorum ferè libram verterit: quæ quatuor drachmæ octuagies collectæ libras tres & vncias quatuor complent. Hocq; modo est proportio sesquitertia, vt inter minam magnā & parua, sic inter talentum magnum & paruū, vtrunque vñsitatum Græcis. Romani verò talentum non habuerunt. Cū autem Comici & Virgilius talenti vtriusque meminerunt, Græcos, à quibus sua sumpserunt, imitantur, vt etiam Liuius ex Polybio locum vertens, & Festus & Gellius: talentum autem Atticum minus hi intellexerunt.

ἡμιτάλαντον, id est dimidium talentum.

Διτάλαντον, id est, duo talenta. Τριτάλαντον, id est, tria talenta. Cū item Latini dicunt, talentum esse sex milium denariorum, per denarios drachmas Atticas (quarum sex milia Atheniensibus talentum complent) intelligunt.

Hæc verò pondera Atheniensibus etiam nummorum genera fuerunt, quæ si iusti erant ponderis, prædicta pondera æquabant. Nullum enim ferè ponderis genus tam Græcis quàm Latinis fuit, quo non etiam numisma, vel summa quædam rei nummariæ significaretur: sed γράμματα, id est scriptula pōderis tantū, non etiam rei nummariæ Atheniensibus rationē habuisse videntur. Hæc ordine cōpositorio retensuimus: resolvere contrā & diuidere potest, qui volet à summo talēto per media alia ad ipsum vsq; λεπτόν indiuisibile descendendo, quē nos ordinē iam in ponderibus medicis sequemur.

μνᾶ ἰατρικῇ, mina medica uncias continet sexdecim, ut docet Dioscorid. aut quisquis ille fuit, libro de ponderibus, & Gal. lib. 2. comp. ph. gen. in emplastro Heræ, & emplastro quarto Andromachi: seu drachmas centum & viginti octo, lib. 4. eiusdem in emplastro Philoxeni medici, & lib. 1. c. ph. g. Mina quibusdam videtur continere uncias viginti, aliis sexdecim.

Alia est mina maior unciarum viginti, seu drachmarum centum sexaginta, & hanc quidam Alexandrinam dicunt, ac ex emplastro Moschionis, & ex emplastris albis & viridibus Andromachi, lib. 1. & 2. comp. ph. gen. In usu fuisse medicorum apparet, praesertim eorum qui medicinam Alexandriae exercuerunt. Vti Attica, quæ unciarum est duodecim & dimidiæ, seu drachmarum centum in usu magis fuit medicis, qui vel in Græcia egerunt, vel antè scripserunt, quàm res Romana floreret. Medica verò (quæ est unciarum sexdecim, seu denariorum centum 12. seu drachmarum Atticarum centum viginti octo) medicis Romæ agentibus, vel in Græcia, sed Romanas res iam florentes cognoscentibus.

λίτρα, id est, libra medica, tam mensuralis quàm ponderalis, qua medici Græci pariter ac Latini utuntur in suis compositionibus, est quæ; unciarum duodecim, seu drachmarum sex & nonaginta, Gal. lib. 4. sanit. tuendæ, & in compositionibus pharmacorum passim, & Dioscorid. Sed negotiatoria est uncia- rum sexdecim, non utenda in compositionibus veterum. Libram & unciam unâ cum imperio Romano Græci accepisse videntur, hisque vocibus parum, ut apparet, corruptis utuntur, scribentes λίτρα, id est libra, & ὀγγία, id est, uncia, idem omnino pondus significantes quod Romani. Nam λίτρα ἑστὶν ὀγγία nomina sunt Romana.

Lib. 3. c. ph. g.

Vt lib. 1. c. ph. g.

Lib. 1. c. ph. g.
Ibidem.

ἡμιλίτρον Galeno pendit drachmas octo & quadraginta: Selibra dicitur Livi- & Celso: etiam libræ semis dicitur Celso & Scribonio.

Pondo per se seu absque alio pondere scriptum, est libra, sed cum alio ponderis vocabulo, id significat quod Græcis σταθμῶν & ὀλίον, hoc est, pondere, ut pondo libra, pondo uncia, ut à libra & uncia mensurali separaretur, cui μέτρον, id est, mensura, eadem ratione Græci addunt, ut à ponderali separant. Romani tamen usu eius frequentiore, etiam his ponderibus, quæ ambigua non sunt, pondo addiderunt, ut pondo

Σ 2 denarii

denarii duo, tres, quatuor in Celfo. Idemq; & Scribonius, pondo semis, pro selibra scribunt aliquando.

Dupondius, & duapondo, & trepondo, vt bilibris, trilibris, sed etiam quadrilibris. Pondo dua etiam Scribonius aliquoties scripsit. Centum pondium item, & centū pondo, & centena pondo, pro massa ferrea aut plumbea centum librarum.

Libræ partes sunt: Vncia, pars eius duodecima. Sextans, id est, sexta eius pars, scilicet vnciæ duæ, vnde à Galeno *ἕκτομ τῆς λίτρας* dicitur, vt Quadrans, id est, tres vnciæ *τὸ τρίτομ τῆς λίτρας*: & Triens, id est, vnciæ quatuor, *τὸ τρίτομ τῆς λίτρας, τοῦτ' ἕξιμ. ἐν γυγίαι δ.* Gal. lib. 5. comp. phar. gen. Quincunx, quinque vnciæ. Semis seu selibra, sex. Septunx, septem. Bes, octo. Dodrans, nouem. Dextans, decem. Deunx, vndecim. nomina Celfo, Scribonio, Columellæ frequentissima, & Latinis medicis vsurpanda.

οὐγγία, vncia, drachmis Atticis octo, seu denariis Romanis septem constat, Græcis & Latinis eaq; ponderalis, Gal. lib. 6. comp. ph. part. & libro 4. sanit. tuendæ: vbi libræ vnus partem tertiam, id est, vncias quatuor dicit æquare drachmas triginta duas, & alibi sæpe in compositionibus medicamentorum particulariū & generalium. Libro autē octauo comp. ph. part. in hiera Themisonis vnciæ tribuit drachmas argenteas octo, vel septem & semissem. Ibidem drachmam in Andromacho & Asclepiade pro drachma argentea accipiendam censet, vt recentiores medici propè omnes ætate sua nominare solebāt, & drachmam appellare, quod Romani *δραχμή*, id est, denarium vocabant: sed quid inter drachmæ & denarii pondus re vera intersit, paulò post dicemus. Tamen qui vnciæ drachmas tantum septē tribuunt, per eas denarios intelligunt. Qui septem drachmas & dimidiam, hi drachmam leuiorem denario aduertisse videntur, non tamen exactè differentiam expressisse, quam sunt assecuti, qui vnciæ tribuunt drachmas octo, non autē denarios octo. Multò minus drachmas nouem cum fæce Arabica, sua se opaca crassitie etiam nunc tegente. *ἡμιέγγυον* semuncia, id est, vnciæ medietas. Sescuncia Celfo, id est vncia vna & dimidia. Vnciæ partes præter dictā semunciā sunt Duella seu binæ sextulæ. i. scriptula octo, vnciæ pars tertia. Nam vncia pendit scriptula. 24.

Sicilicus vel Sicilicū, quasi semūciam secans, vt festo Pompeo

peio videtur, pars vnciæ quarta, nam drachmas duas valet.

Sextula est sexta pars vnciæ, id est, scriptula quatuor, quæ sexies iuncta complent scriptula 24. seu drachmas octo, seu vnciam. Tamen Ruellius ætatis nostræ doctissimus medicus ἐξάγυρ in Actuário vertit sextulam in aurea antidoto Alexandri, quo loco eius antidoti scriptores barbari habent omnes drachmam. Excusatur autem Ruellius vicinitate grauitatis, quæ sextulæ est cum drachma, quam vnico scriptulo superat, vt in drachma pòst & denario dicemus. Illa autem partium vnciæ nomina Volusio & Fannio in ponderibus, & Balbo de agrimensoria ad Celsum sunt vsurpata, & Ruellio in Actuário, cæteris medicis non appellata.

Drachma denique est vnciæ pars octaua, vt denarius septima: de quibus dicere, tempestiuum est. Ne Nicolao Salernitæ credas, vnciæ drachmas nouem tribuēti nulla veterum autoritate, cui & Seruitor nescio quis scriptor triobolaris subscribit: hosq; duces magna nostrorum pharmacopœorum natio sequitur, nulla ratione alia, quàm quòd ab illis est hoc scriptum, nulla aut ratione aut scriptorum veterum auctoritate sese tuentibus. In his tamen qui sunt humaniores, & iudicio meliore Græcorum placitum sequuntur. Quot enim drachmas Mesues vnciæ dederit, probari nequit. *Δραχμὴ* drachma Attica Atheniensibus, & denarius Romanus nummus erat argēteus, & ab eo pondus eiusdem cum suo vtrunque nummo grauitatis: quia tamen vnciam Græcis & Latinis æqualem drachmæ octo complent, denarii verò tantum septē, denarius est paulò, scilicet vna septima, grauior quàm drachma. Vnde libra ponderalis Celfo, Plinio, Scribonio est denariorū quatuor & octoginta. Nam libra est vnciarū duodecim, in quarum singulis sunt denarii septem, qui duodecies sumpti complent quatuor & octoginta denarios. Eadē libra Græcis est drachmarū sex & nonaginta: Libra enim vnciarum est etiā illis duodecim, in quibus singulis drachmæ octo, quæ duodecies iunctæ efficiunt drachmas sex & nonaginta. Cùm igitur paulò grauior denarius esset, quàm drachma Attica, pondus autem vel numisma Græci interpretes non haberent, quod exactè denario Romano responderet, Latina in Græcum sermonē versuri, per id quod proximū esset, ac non multò leuius, drachmam scilicet pro denario reddiderunt, vt

Plutarchus, Galenus in Scribonii medicamentis compositis, quæ citat lib. de compositione pharmacorum. Contrà Latini dum Græca verterunt, pro drachma Attica denariū tam pondus quàm numisma verterunt, quia pars vnciæ octaua apud Romanos nomine proprio caret (nisi cum Balbo & Latinis multis drachmam quoque Græcorum more appelles) vt Aulus Gellius, Festus, Liuius libro ab vrbe condita 44. Polybii locum recensens. Sic drachma Attica denarii argentei habere pondus dicitur Plinio lib. 21. cap. vltimo, & alibi, quoties medica transfert, pro drachma denarium vertit. Nec mirum est id eum fecisse in ponderibus minimum diuersis drachma & denario, cū *μνᾶν* Atticam (quæ vnciarum est duodecim & dimidiæ, seu drachmarum centum) verterit libram, quæ vnciarum est tantum duodecim seu drachmarum est tantum sex & nonaginta: drachmis scilicet quatuor leuior, quàm mina: & vnciis quatuor leuior quàm mina Alexandrina. Hæc enim differentia illis visa est parui esse momenti, nisi si qua essent validis admodum viribus. Non habet igitur drachma Attica denarii pondus, neque libra minam æquat. Quoties verò Romana tractat Plinius, aut denario vitur, aut drachma pro pondere denarii: vt cū ait, è libra denarios quatuor & octoginta signari: tot enim surgunt denarii vnciarum duodecim, seu libræ vnus. In mina autem Attica denarii sunt propè octo & octoginta, siue drachmæ centum. In aliis duabus minis medica, quæ vnciarum est sexdecim: & Alexandrina, quæ vnciarum est viginti, numerus maior denariorum & drachmarum. Et Liuius lib. 44. ab vrbe condita drachmas quatuor Atticas dicit trium ferè denariorum pondus habere. Nam tres denarii faciunt tres Atticas drachmas, & prætereà tres septimas vnus denarii, non tamen quatuor drachmas integras efficiunt: ob id Liuius rectè addidit ferè. Quòd si vnciæ tribuas tantum drachmas septè (quod Galenus quoddam facere scripsit, vt antè diximus) pro denario tunc est accipienda drachma, cū drachmarum octo pondus idem faciat, quod septem denarii: hocq; modo denarius drachmam explet, & prætereà partem drachmæ septimam. Nec audiendus est hoc loco Cleopatra, dicens, Italicum *δραχμῆν* habet drachmam vnam, si exactum id velit: nec Scribonius

Largus,

Largus, qui in præfatione ait, equè denarios quatuor & octoginta esse in libra Romana, quot drachmæ sunt in libra Græcorum, nisi drachmam pro denario usurpet. Sic enim vnciæ dabit tantum drachmas septem, ut denarios septē alii omnes dederunt. Quam drachmæ & denarii differentiam cum nouisset Celsus, nec obolorum (qui sex drachmam complent) voce Græca uti vellet, vnciam in septem denarios drachmarum octo vice diuisit, quorum denariorum singulos in partes sex diuisit, quæ obolis sex, in quos drachmam Græci diuiserant, responderent. Has verò partes vocauit sextantes omnium primus & solus, quorum singuli singulis drachmarum obolis sunt paulò grauiores, tum quia ipsi sex diuidunt denarium pondus drachma in sex obolos diuisa grauius. Quibus denarii sextantibus & eadē ratione quadrantibus & trientibus denarii aut libræ quādo utatur Celsus, lectori coniectandum ex simplicium viribus, affectus natura & egri & medicamenti componendi format. Drachma igitur Attica pars est octaua vnciæ Græcæ & etiam Romanæ, aut si paulò leuior est, ita ut drachmæ octo denarios septem non expleant, id auctores non curarunt.

Lib. 5. cap. 17.

Δραχμή etiam ὀλκή dicitur lib. 8. comp. ph. p. quāuis propriè ὀλκή sit pondus, vnde ὀλκή δραχμῆς, id est, pondus drachmæ lib. 8. c. ph. part. in hiera Themisonis, & alibi sæpe. ἡμιδραχμον. Gal. lib. 4. comp. ph. gen. βιδραχμον, τριδραχμον, τετραδραχμον. i. duæ, tres, quatuor drachmæ Græcis in vſu sunt.

Drachmæ partes sunt, Γράμμα Aëtio, Alexandro, Aretæo, Moschioni Græcis iunioribus usurpatum, (nam veteres διώβολον vel ὀβολοὶ ἄνθ. eius loco dicebāt) scriptulum ad verbum rectè dixeris: scrupulus tamen aut scrupulum dicitur Celfo, Plinio, Columellæ, & recentioribus Medicis: Martiali quoque, nisi in his scriptulū legas. Drachma autem habet grammata, id est, scriptula tria: Simplium scriptuli dimidium quidam ratiocinatores vocant.

ὀβολὸς obolus Plinio usurpatus est dimidium scriptuli seu sexta drachmæ pars: nam oboli sex, drachmam constituunt: & oboli duo, scriptulum vnum.

ἡμιώβολον vel ἡμιωβόλον Andromachus apud Gal. libro 7. comp. ph. part. pro obolo dimidio. διώβολον vel ὀβολοὶ ἄνθ. τριώβολον, τετρώβολον Soranus & Zoilus usurpant apud Gal.

lenum lib. 1. 3. comp. ph. part. *δυβολιαῦ* & *τροχίσκ*, id est, diobolaris, & *τριβολιαῦ*, id est, triobolaris pòdere, libro 7. comp. ph. part. His enim nominibus veteres Græci sunt vsi.

δριμύς, id est, lupini semen, est drachmæ pars nona: nam drachma pendit nouem lupinos. *κισσάριον*, id est, filiqua, est dimidium lupini, Actuário cum vulgo *καρρυσβία* dicitur. Semen autem eius vt lupini, lentis, orobi, ciceris, fabæ, non tota filiqua intelligitur: & id mediocre non enorme & habitius, neque strigosum & emaciatum, qualia hordei aut tritici grana viginti scrupulo etiam hodie damus, aurifabrorum grana omnino immutabilia, hisq; omnino æqualia appensuri, vt ponderum fundamentum nobis certius sit quàm Atticis in suo *λίπῳ*, Græcis in suo *κισσάτιω*, vel chalco, vel lentis semine.

χάλκ chalcus Plinio dicitur, aliis æreolus vel æreolum, est dimidiū filiquæ: nam filiqua pendit duos chalcos: chalcus autem grana lentis quatuor, quæ minimū pondus faciunt, vt hodie grana tritici vel hordei: sed cū grana hæc pondere plurimum varient, ob variam magnitudinē, densitatem, raritatem, humiditatem, siccitatē, eligenda sunt (vt diximus) mediocria, aut illorum loco grana aurifabrorum immutabilia. Alii chalcum oboli partem octauam faciunt, alii decimam, Attici sextam, vt prius dictum est. *δίχαλκον*, id est, duo æreola Diosc. in cucumere agresti. Drachma igitur continet scriptula tria, obolos sex, lupinos nouem, filiquas octodecim, chalcos sex & triginta: secundum alios, octo & quadraginta.

Denarii partes sunt, Victoriatus, nummus argenteus victoriæ nota signatus, dictus aliter Quinarius. Nam denarius decem asses siue libras primò valebat (vnde illi nomen) eius autem dimidium victoriatus asses quinque: quia denarius in duos victoriatos diuiditur. Postea denarius fuit libræ pars octogesimaquarta: nam ex libra denarii octogintaquatuor signabantur, Plin. Victoriato autem pondere vtitur Scribonius. Celsus passim lib. 5. cap. 18. dicere maluit semis denarii, vt p. ✕. S. vel semis, id est, pondus denarii dimidii, & alibi p. i. ✕. & semis, id est pondus denarii vnus & dimidii. Galenus victoriatum Scribonii aliquando in duos obolos, id est, scriptulum vnum, rectius & frequentius in *τριώβολον* vertit, cū Scribonii compositiones describit. Denarii vt libræ sunt

sunt sextās quoque, quadrans, triens, de quibus antè diximus.

NOTAE PONDERVM ROMANORVM

ex Volusio, Probo, Celso, Scribonio.

P. libra. PP. libræ duæ seu dupondium. S. semis. v. scriptulum. — 5 — bes. S — — dodrans. S — — dextans. S — — deunx. — — triens. — — quadrans. — — sextans. — — vncia. ½ fescuncia. ¼ semuncia. ⅓ vel 6 binæ sextulæ. ⅔ sicilicus. ⅞ sextula. ⅞ scriptulum. * vel x denarius. V victoriat. z sextans denarii & libræ apud Celsum. — ÷ — fescuncia, seu quarta pars semissis. — · — drachmæ sex seu octaua pars semissis in Scribonio leguntur. 3. drachma vna.

NOTE PONDERVM GRAECORVM

Atticorum.

ἄ μνᾶς. λι. vel λ, vel λ λίτρας. 50 ἐνυγίαις. Ἰ δραχμῆς. Δ δρᾶκμῆς, id est, drachmæ. γρ γράμματ^ο. ὀβολοῦ, :≡: δύοῖν ὀβολοῖν. κ^ε κόρατιον. & χαλκοῦ. S^υ ἡμίσι^ο, quæ duabus his velut accentuum lineolis differt à nota numeri nonagenarii.

In his ponderum tam Romanorum quàm Græcorum notis ferè exprimuntur primæ ponderis literę. In Romanis verò lineę semissi adiunctę vnciarum numerum designant ultra semissem seu sex vncias. Reliquarum Romanarum notarum ratio est difficilior, & cur Græci per Λ obliquum L drachmam figurant, cùm equius fuisset ad aliarum notarum imitationem Δγ. id est, Δ cum γ, quę duę sunt primę huius ponderis literę: item in obolo, οβ.

Mina Attica, quę est vnciarum 16. Auicēnas, Serapio, Me-
sues uti quibusdā putantur, aliis Alexandrina, quę est vnc. 20.

Vulgas medicorum iniquius pondera hodie notat, præter quàm lib. libram: & Θ, id est, scriptulum, quòd notam Romanam licet ratione mihi incòperta scriptā imitetur, ut 3 drachmam: at 3 vel 3 vnciam cur significet, nò video. Iustius mea sententia fuerit, ne notarum 3 & 3 affinitate amplius peccetur magno mortalium incommodo, drachmam & vnciā primis suis literis scribere sic, dr, & vnc. quod in mensuris vulgaribus rectè fecerunt, M, pro manipulo, & P, pro pugillo

scribentes. Faba Græca pendit duos obolos: eius meminit Gal. libr. 7. cōp. ph. p. in arteriace 14. Andromachi, cataportio fabæ magnitudine ibidem. Faba Alexandrina drach. vnam & dimidiam. Nucis iuglandis magnitudo filiquas septuaginta duas pendit. Nux Pontica filiquas octodecim. Alia numero metimur, vt pruna, ficus, piper album, libr. 7. ph. p. in arteriacis (quod aliàs obolis, aliàs vnciis metitur.) Multa prætereà metimur quãtitate discreta seu numero, vt ficus, poma, myxa, zizipha, myrobalanos, tamar Indos, nucleis seu seminibus horum maioribus ferè exemptis, vbi scilicet ad viuum componendi ratio exigitur. Est tamen quando cum nucleis numerantur, vbi penduntur, vel etiam mensurantur.

Mensuræ Romanis & Græcis duplices fuerunt, liquidorū scilicet & aridorū. Liquidorū primo dicemus.

Κουλιός Ionicè pro κολλός culeus, mensurarū capacissimus, amphoras viginti capit, seu libras mēsurales mille & sexcentas, Plin. libr. 14. cap. 4. & Fannius libr. de ponderibus. Amphora vrnas duas Columellæ, libr. 12. cap. 20. seu libras octoginta: olim etiam quadrantal dicebatur, quòd vas erat quadratum, pedis mensura in longum & latum. Vrna congiōs quatuor, seu libras quadraginta.

Congius sextarios sex Romanos, libr. 6. comp. ph. p. seu libras decem.

Sextarius quia est congii sexta pars, dictus capit heminas duas seu libram & bessēm, id est, octo vncias viginti mensurales, non ponderales: nisi liquorem quem metiris, vt mel grauiissimū, oleum leuissimum, vinum (præsertim fuluum: nam nigrum crassius & grauius) medium expresseris, & sic tot sextarii sunt explicandi, quot sunt res metiendæ. ξίστον, id est, sextarii, neq; mensura neq; nomen erat apud Atheniēses, quo tēpore scripsit Heras Medicus: nunc ex quo Romani ubi imperare cœperūt, nomen ξίστον id est, sextarii apud omnes qui Græca lingua vtuntur, extitit: ipsa verò mēsurā Romanæ æqualis non est: nam alii aliam sextarii mensuram vsurpant. Apud Romanos sextarius libram vnam & semissem, & sextam illius partē pendit, vt omnes simul iunctæ sint vnciæ viginti, quas plurimū cornibus metiūtur incisis extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus. Nonnulli falsò sunt opinati,

sextar

sextarium Romanum octodecim mensuralibus vnciis vale-
re, Galenus. Sextario Italico seu Romano proximus est chus
Atticus, ut cadus Atticus, amphoræ Atticæ.

Ut as & libra vncias duodecim continet, dictis in libra no-
minibus appellatas: sic sextarius cyathos duodecim nomini-
bus iisdem vocatos capit: unde sextarii bes, id est, cyathi octo
apud Largum compositione 116. & sextarius falerni Martia-
li, id est, cyathi duo: & seni sextates vini, id est, cyathi duode-
cim, seu sextarius vnus Suetonio in Augusto: quadrans vini
Celfo in curatione quartanæ, & Martiali, id est, cyathi tres.
Eidē triens, id est, cyathi quatuor, ac etiā Propertio & Iuue-
nali. Martiali itē quincūx, id est, cyathi quinque: septunx septē,
bes octo, deunx undecim. Pro senisse verò hemina, seu sex
cyathi, ut dodrans pro nouem cyathis, dextans pro decem.

Hemina quartarios duos capit seu vncias decē: dicta quòd
sit ἡμισυ, id est, dimidium sextarii, auctore Festo. Vox tamen
Romana & mensura est: κοτύλη autem (quam Linacer & alii
propè omnes heminā reddunt) Galeno & Plutarcho vsurpa-
tur, & Andromacho quauis Romæ agenti (quod Galenus
miratur) & Catoni Romano scriptori: huicq; diuersa est
ab hemina. Prioribus verò κοτύλη Attica mensura vncias no-
uem libræ Romanæ capit. Eamq; mensuram in pharmacis,
priusquam res Romanorum creuissent, scriptis, κοτύλην ca-
pere coniecit Galenus. Videtur & Heras cum κοτύλην scri-
bit, sextarii dimidium indicare: an verò vncias nouem ex li-
brali cornu vel decem innuat, etiam ignoratur: licet nonnulli
eam sexdecim vncias, & διμῶρον, id est, duas eius partes habe-
re statuant: sed alibi κοτύλην cum libra Romana æquauit,
κοτύλαι ἰταλικάι, αἷς δὲ ἡγεῖται διττὰς ὀνομάζουσι.

Ibidem.

*Lib. 4. sanit.
tuend.*

Quartarius acetabula duo capit seu vnc. 5. dictus quia est
pars sextarii quarta.

ξύβαφς vel ὀξύβαφος, id est acetabulū, sesquicyathum ca-
pit, seu vncias duas & dimidiā, ab aceto dictū, quod ad ciborū
intinctus capiebat. Idē κοτύλης τέταρτον, id est, cotylæ, sex cya-
thos capiētis quarta pars, lib. 1. cōp. ph. part. dici Apollonio, &
lib. 2. comp. ph. gen. Serapioni, quibusdam videtur. Scribit ve-
ro Galenus libro 9. comp. ph. part. in splenico Chrysermi,
δανύον σπέρματς ὀξύβαφος ὁ ἐστὶ 50. α. id est, quòd est vncia
vna, nisi mendū sit: aut oxybaphon minore faciat mensurā.

κνύαδς

κνᾶδος fescunciam capit & drachmam & scriptulum, seu cochlearia magna 4. (quæ & ligulæ dicuntur à cavitae simili linguæ contractæ) estq; sextarij pars 12.

μυστρίον est κοχλιάριον magnum, capit drachmas tres & scriptulum vnū, datur diacydonion mediocris mystri modo, in fine lib. 6. fanit. tuendæ.

Cochlearij parui pleni mēsurā in paruis corporibus: maximi, in maximis: in mediis, ad portionem datur diatrion pipercon, lib. 4. fanit. tuendæ.

Li. 7. method.

Hieræ picræ siccæ modus maximus est duorum magnorum cochlearium cum aquæ temperatæ cyathis tribus: minimus parui vnus cochlearis: mediocris est duorum parvorum cochlearium. Quæ loca & alia passim planè, declarant saltem tres fuisse cochlearis differentias.

Quæ pondera, quibus mensuris, quorum liquidorum vel aridorum respondeant, Paulus in fine docet abundè.

Quauis enim libra sit & vncia mensuralis, id est, mensura molem decernens: & ponderalis, id est, rei grauitatem pondere declarans, Galeno lib. 1. 2. & 3. & sequentibus comp. ph. gen. & illa vncias duodecim lineis circularibus in mensura cornea extrinsecus descriptis signatas semper capiat, hæc vncias duodecim semper pendat: tamen rarò libra ponderalis mensurali respondet: & contrà, ob varium rerum, quas metimur, pondus in eadem mensura. Quamuis etiam libra frequentius mensuralis fuit Romanis, tamen etiam fuit ponderalis seu pondus librale, vt mensura libralis: ob id distinguit Galenus addendo τανύμω ponderali, vt μέτρω mensurali.

ROMANAE ARIDORVM MENSURAE.

Modius à modo, id est, mensura dictus, sextarios sexdecim capit, seu libras 26. vncias octo, non autem pendet. Hemodius, eius dimidium. Sesquimodius Varroni vsurpatur. Sextarius capit heminas duas. Schœni & Calami sextarius, Cato cap. 105. Salis & hordei sextarius, Columella lib. 12. cap. 5.

Hemina capit acetabula quatuor seu vncias decem. Iris aridæ contusæ hemina, Cato cap. 107. Hemina salis, Columella lib. 12. cap. 49.

Acetabulum capit sesquicyathū, seu vncias duas cum dimidia.

midia. Acetabulum melanthij, Cato cap. 107. Acetabulum gallæ, feminis coriandri, cnicorum, Celsus lib. 5. cap. 18. Salis acetabulum, Plin. lib. 18. cap. 7.

Cyathus cochlearia seu ligulas quatuor, vel fescunciam, drachmam & scriptulum. Cyathus feminis, Columella lib. 2. cap. 11. Gith cyathos tres, picis vnum, Celsus lib. 5. cap. de curatione papularum.

Ligula capit drach. tres & scriptulū, Columellę vsurpatur.

Ergo mensurę liquidorum tantum Romanis fuerunt, Culeus, Amphora, Vrna, Congius, Quartarius. Aridorum solum Modius, Semimodius, Sesquimodius. Humidorum & siccorum indiscriminatim Sextarius, Hemina, Acetabulum, Cyathus, Ligula. Hæc de mensuris Romanis. Arida autem metimur frumenta, legumina, semina alia, salem: reliqua ut aromata frequentius appendimus quam metimur: metallica solum appenduntur.

Aridorum quæ metimur pondera maximè variant, ob id omisimus, ne prolixitate odiosa displiceamus.

GRAECAE SEV ATTICAE LIQV-
dorum & humidorum mensuræ, quibus maxi-
mè vtuntur Medici, ob id etiam me-
dicæ vocantur.

LIQVIDORVM MENSVRÆ CVM
olei, vini, mellis pondere cuique men-
suræ respondente.

MΕΤΡΗΤΗΣ, siue μέτρος, siue μεράμιον capit choas duodecim, seu congios Romanos duodecim, seu libras mensurales centum & octo, ἀπὸ τοῦ μετρεῖν, id est, à metiēdo: illud alterum ἀπὸ τοῦ χάθειν, id est, capacem esse. Sic metreten Dioscoridis in oleo œnanthino. & μεράμιον eiusdem in vino hyssopite, Plinius cadum vertit. Metreten prætereà Italicam in vino scillitico, & μεράμιον Italicū in vino absinthite Dioscorides vocat pro amphora Romana, quæ non paulò minor est Attica. Cùm autem Atticam amphoram vult significare, vocat simpliciter μετρητὴν vel μεράμιον: contrà Latini amphoram Atticam pro metreta dicunt, vt à Romana separent, quæ ipsis absolutè est amphora. Vtraq; Græcorum medicis in vsu fuit,

fuit, postquàm Romani Græciæ imperare cœperunt. Metretes olei pendit libras Romanas nonaginta, vini centum, mellis centum & quinquaginta.

Χοῦς, sine χέυς, chus seu cōgius, sextarios sex capit, seu cotylas Atticas duodecim, seu libras nouem, ἀπὸ τοῦ χέυς, id est, à fundendo. Plinio ex Dioscoride vertitur semper congius. Chus olei pendet libras septem cum dimidia: vini autem libras 8. & vncias quatuor: mellis lib. duodecim cum dimidia.

Ξίσκος, sextarius, cotylas duas seu librā vnam & dimidiam. Vox à Græcis ex sextarij nomine corrupta Andromacho, Asclepiadi, Heræ, Critoni, Dioscoridi, Galeno, & aliis Græcis, qui scripserunt, postquàm imperium Romanum acceperunt, vetustioribus Atticis scriptoribus incognita. Aceti sextarij tres Critoni apud Gal. & Galeno ipsi sæpe pro liquidi mensura in lib. compositionum. Sextarius olei pendet vncias quindecim, vini autem libram vnā, vncias quatuor, drachmas quinq;, scriptulum vnum: mellis lib. duas, & vnciam vnam.

Κοτύλη quartarios duos, seu vncias mensurales nouem, unde Heras lib. 5. comp. ph. part. Galeni dicit vncias olei Italicas nouem, seu cotylen pendere vncias ponderales septem cum dimidia: aceti cotyle Soranus apud Gal. lib. 1. comp. ph. part. Dicitur etiam ἡμίξισον. et dimidia sextarij pars Gal. lib. 1. c. ph. g. & τρυβλίον Cleopatrar. Hemina dicitur Romanis & item Græcis, Romanas medicamentorum compositiones in suam linguam vertentibus, aliàs autem cotyle vtuntur. Cotyle olei pendet vncias septē & dimidiā: vini autem vnc. octo, drach. duas, scriptula duo: mellis libram vnam & semunciam.

Τέταρτον, siue ἡμικοτύλιον Dioscoridi lib. 5. de thymoxhalme, & Apollonius apud Gal. lib. 1. comp. ph. gen. i. quartarius vel semicotyle, capit acetabula duo, seu vncias quatuor cum dimidia. τέταρτον ξίσσου dicitur Damocrati apud Galen. lib. 8. c. ph. part. Pendet olei vncias tres, semunciam, & drach. duas: vini autem vnc. 4. drach. vnam, & scriptulum vnum: mellis feli-
bram, & drach. duas.

Ἀξύβαρον id est, acetabulum sesquicyathum, seu vncias duas & drachmas duas, τέταρτον κοτύλης dicitur Serapioni apud Gal. lib. 2. c. ph. gen. & Apollonio lib. 1. ph. part. Pendet olei fescunciam & drach. tres, seu drachmas quindecim: vini autem vncias duas, & scriptula duo: mellis vncias tres, & drachmam

mam vnam.

Κύαθος cyathus conchas duas seu mystra quatuor, seu chemas quinque, seu cochlearia decem seu fescunciam. Attici mellis cyathus vnus, aut drachmæ duodecim, Crito lib. 5. c. ph. part. Attici mellis cyathus Philippo Medico dicitur apud Gal. libro 4. ph. p. Pendet olei vnc. & drach. duas, seu drachmas decem. Pondus olei curæ Medicis præcipuæ fuit in emplastris: vini autem vnciam vnam, drach. tres, siliquas quatuor: mellis vnc. duas, & scrip. duo.

Κόχλη mystra duo, seu chemas duas cū dimidia, seu drachmas sex.

Μύστρον. chemen vnam & quartam eius partem, seu cochlearia duo cum dimidio, seu drachmas tres. Mystrum magnum Cleopatrarū capit drach. duas cum dimidia & quartā: paruum drach. duas, scriptula duo, siliquam vnam & vndecimam.

Χήμη cheme, cochlearia duo, seu drachmas duas, scriptulum vnum, grana quatuor, & quatuor quintas grani, Lithargyri chemen aut drachmas tres, lib. 5. comp. pharm. particul. Gal. Crito.

Κοχλιάριον drachmam vnam, scriptulum dimidium, grana duo, & duas quintas grani. Cochlear olei pendet Cleopatrarū drachmam vnam.

Hæc ponderum minorum nomina sunt vsurpanda, ad interpretandam mensurarum capacitatem: & quomodo libræ & vnciæ mensurales non solum ponderales sunt: sic hæc pondera minuta possis mensuralia facere, vel saltem intelligere. Vinum nona parte excedit pondus olei. Galeno. Fannio, & Græcis quibusdam: vt cotyle olei nouem vncias pendet, cotyle vini decem, quod est nona parte esse grauius: sic olei sextarius octodecim vncias, vini viginti pendet. Mela autem tertia parte vino est grauius, ex Fannio, & Dioscoride, & Galeno, & experientia. Mela autem sit purum, è fauis destillatū: despumatum autem est grauius.

MENSURAE ARIDORVM ATTICAE

Medicis maxime in vsu.

Μέδιμνος, medimnus, capit choenicas octo & quadraginta, Suidas: seu centum & octo libras, seu modios sex, nō medicos

medicos quidem, sed georgicos. Medicis tam magna mensura rarior est in vsu.

Χοῖνιξ cotylas tres, vel sesquifextarium, seu libras duas & quadrantem, id est, uncias tres. In vsu est Chryfermo & Erasistrato in Gal. medicamentorum compositionibus. Pro chœnicibus decem Dioscoridis in vino ex dactylis Plinius reddit modium, cū decem chœnices cotylas triginta, seu sextarios quindecim faciant. Romanus autem modius est sextariorum sexdecim: vnum igitur sextarium neglexit Plinius.

Ξίσκος sextarius, cotylas duas, seu unc. octodecim, Galeno sæpe vsurpatur in c. ph.

ἡμιχόινικον vsurpauit Dioscorides in vino elleboritite.

Κοτύλη ozybapha 4. seu uncias nouem, gallæ cotylas duas. Gal. lib. 9. c. ph. p.

ὀξύβαφον, sesquicyathum, seu uncias duas & drachmas duas: piperis albi oxybaphon, Gal. lib. 3. comp. ph. p. & Dioscoridi vsurpatur in thymoxalme.

Κύαθον cochlearia decem seu fescunciam. Salis cyathus Diosc. in vino melitite.

Κοχλιάριον drach. vnam, scriptulum dimidium, grana duo, & duas quintas grani.

NOTAE MENSVRARVM ROMANARVM, ex Volusij Metiani libro de asse.

Culei nota desideratur. Quadrantal, id est, amphora q.

Vrna, q. s. .i. quadrantalis semis. Congij i. Sextarij 3. Heminae 3. s. .i. sextarij semis. Quartarij 2.

Cyathi cy. In aridis verò, Modij μ. Semodij μ. s. Acetabuli & Ligulæ notæ adhuc desiderantur.

NOTAE GRAECARVM MENSVRARVM Medicis frequentes, ex lib. de ponderibus & mensuris, qui Galeno tribuitur.

κκ. ηράμιον. tribus primis cōsonantibus expressum. & χοῦς. ξυ. vel ξ. ξίσκος. κζ. κοτύλη. τρυ. τρυβλίον. ξο. ὀξύβαφον. ηκ. κύαθος. μ. μύτρον. & χήμη. In aridis verò, αλ. μέλιμνος, & χοῖνιξ cum duabus primis consonantibus.

Cū igitur tam varient pondera & mensuræ, in veterum compositionibus diligenter obserua miscendorum & totius misturæ

misturæ vires, vt inde pondera quædā dubia coniectes. Notas etiam in id patriam medici, & si extra patriam, in qua regione, & quo tempore scripsit.

Cùm item pondera medicamentorum mensuris non semper responderint (vt ostendimus) diligenter est aduertenda maiorum scriptura, si iubet nos medicamenta *πλήθεις*, id est, copia seu mensura, & *ὄγκω*, id est mole, vel *σταθμῶ*, id est, pondere metiri, Gal. lib. 6. comp. ph. part. Adhæc felicius pondera & mensuræ, & amborum numerus integrè exprimuntur, quàm notis repræsentantur ob lapsum facilem. Ob id Galenus Andromachum iuniorem & Damocratē laudat, quòd medicamentorum compositiones carmine scripserint, integra hæc omnia recipiente. Idem Galenus lib. 2. comp. phar. part. *ἐκ τὸν, ἐκ δολιχόν, ἐκ νυνήλιον, ἀρχαῖς* aloës in hieræ compositione integra scripsit: & c. libi passim.

Horum de ponderibus & mensuris scriptorū partem plurimam ex Galeni libris de compositione medicamentorum secundum locos & genera collegeram, sed meliora & auctiora reddidi lectione Georgii Agricolæ medici, hac in parte doctissimū & diligentissimū. Neque tamen semper ponderibus aut mensuris utimur in componendis medicamentis aut vtendis, sed herbas manipulis, semina & flores pugillis sæpe metimur.

Terebinthina resina sumitur nucis vnius pōricæ, aliquādo duarum trium'ue magnitudine. Diacnici sumitur duarum trium'ue caricarum modus, pro cuiusque natura magis minus'ue medicamenti obediēte per experiētiā exploranda.

Pulis capitis milui potatur ex aqua, quantus tribus digitis capi potest.

Alia eius generis plurima apud medicos tum Græcos tum Latinos inuenies.

y EXERC

*Lib. 5. sanit.
tuendæ.
Ibidem.*

*Lib. theriaces
ad Pisonem.*

EXERCITATIO

PRAEDICTAE METHODI

IN ALIQVOT VETERVM COM- POSITIS CELEBRIBVS,

LIBER IIII.



ABSOLVTIS vtcunque tribus instituti nostri partibus, iam quarta eaq; postrema superest adiicienda, de medicamentis aliquot compositis, quibus ceu particularibus exemplis exercere traditas prius methodos visum est. Neque enim omnia veterum composita in vnum cogere placuit: id enim operis fuisset infiniti, & parum profuturi: neque item omnia vsu quotidiano celebrata, sed tantum sumenda tanquam praecipua adscribemus: ad-mouenda plenius tradituri in Mesuae antidotario, quod cum canonibus & simplicibus à nobis quanta potuimus maxima cura detersum & politum & clarum redditum propediem emittemus. Non improbo tamen, si quis omnia quae à viris ratione & experientia insignibus scripta sunt, enumerare velit Galeni exemplo, vt ex his quisque illa potissimum praeparare queat, quorum materiae copiam habet, modo diligenter curet, vt quae miscentur, probata sint & vigentia. Mistis quoque & compositis tunc solum vtatur, cum vires expetitas habent summas. Nam multa vetustate exanimata sunt igni absumenda, non vtenda. Quibusdam autem vetustas vires addit, vt theriace: aliis minuit, vt Philonis antidoto, qua tamen ante annum à compositione non vtendum: aliis adimit, quorum maxima turba est in syrupis, catapotiis, & aliis, vt simplicibus, sic compositis. Quapropter syruporum vere & aestate rarus est vsus, si rerum illos constituentium est potestas: frequentior apozematum quae tunc solum pharmacopola componit, cum iubetur à medico, vti etiam eclegmata, exoletis iam Arabum lohot praestantiora, quia recentia. Caetera item quae omni propè hora est componendi facultas composita non habet pharmacopola, vt linimenta, frontalia, embrochas, cataplasmata,

*In lib. de c. ph.
phar. p. & g.*

plafinata, collyria. Sed tempore vtendi parantur, quando facilis & prompta rerum in hæc necessariarum materia est, quæ autem omni parte anni parari nequeunt, rerum tunc vigentium penuria, illa semel in annum totum confici possunt: cura tamen diligenti adhibita, ne etiam ante annum vires eorum elanguerint. At cum vnum medicamentum etiam vni morbo omnium ægrotorum competere non possit ob temporum eius & ægri naturæ varietatem, & alias indicationes, nec medicus tantam varietatem in vnoquoque genere ad manum habere possit, medium aliquod habeat ad mediam naturam compositum, cui addas tempore vtendi quæ voles, pro affectus & ægri natura, vt in diamoro Gal. in comp. ph. part. vel simplicissimum pares, quod vtendi tempore arbitrato tuo intēdas. Ob id syropos omnino simplicissimos ex succis scilicet, vel decoctis simplicibus saccharo aut melli incoctis ad saporis gratiam, sed magis ad conseruationis necessitatē præferimus.

Pauca quædam explicaturus sum, quæ rudi adhuc lectori remoramento esse possint, cuiusmodi hoc est, quæ ratio nos mouerit, vt præter omnium consuetudinē pondera & mensuras, & vtriusque quantitatem integris propè nominibus expresserimus. Id autem quo consilio est à nobis factum libro superiore in poderibus & mensuris docuimus: *ἄνα* quoque & *ἴσσυ* Galeni more & Arabum scribimus. Neque etiā accusandi sumus, si quando pondera aut mensuras, quæ vno numero comprehenduntur, tamen ipso identidem repetito expressimus. Sic enim & Gal. myrti nigræ sextarium vnum, seminis apii sextarium vnum, summitatum ramorum myrti sextarium vnum: & ibidem, adianti sextarium dimidium, ladani τὸ ἴσσυ, id est, tantundem: quum utrobique scribere potuisset, enumeratis his omnibus, *ἀνα* vel *ἴσσυ*, id est, æqualem portionē. Huius ταιῖσ-
ωγίας exempla sunt plurima apud Græcos & Latinos medicos. Præterea quædam compositiones huius libri eiusdem rei multiplicē habent mensuram aut pondus multiplex, ob id quod ex magnis ceu portio tantum aliqua sint diminutæ. Quomodo apud Gal. emplastrum alba ariobarzani integra, recipit lithargyri drach. ducētas, cerussæ drach. octoginta, ceræ drach. quinquaginta, olei veteris heminas tres, terebinthinæ drach. triginta, cineris buccinorum drach. decem, thuris drach. nouem & decē, aquæ cyathos duodecim. Quæ Heras sic ad tertiam

Lib. i. c. ph. p.

partē diminuit, lithargyri drach. 66. obolos 4. & cætera, lib. 1. c. ph. g. & alibi exempla huius rei plurima inuenies. Necte moueat, quòd eiufdem simplicis doses varias secundum scriptores varios in eadem compositione interdum adscribimus, cum nec Galenum id facere piguerit etiam in ponderibus diuersissimis & simplicium validissimorum, vt lib. 3. comp. ph. part. in fine. Mannæ thuris drach. quatuor, alii drach. quindecim, & paulò pòst calcis viuæ drach. octo, alii drach. quadraginta: gypsi tosti drach. quatuor, alii drach. octo. Aromata item nonnunquàm species etiam cum vulgo appellamus, Paulum & Actuarium sequuti, qui *ἰατρὰ* illa pàssim appellant. Adde quòd composita cum *ἰατρὰ* declinàtur secundum terminationem per primam aut secundam declinationem Latinorum, vt per secundam & tertiam Græcorum, Diacalaminthe, thes, thæ, then. Diacydonion, nii, nio. Diamoron, ri ro, & cætera, non autem cum medicorum vulgo, diacydonion, nionis: diaphœnicon, diaphœniconis: diarhodon, diarhodonis, vt anafarca, cæ: hypofarca, cæ, vt ex Galeno. lib. sanitat. tuendæ, & còp. ph. part. colligere est facile. Imperitius idem faciunt in catholico cathartico, quod diacatholicon, conis, etiam qui se aliquid putant, quotidie scribunt. Si verò illa separatim & sine còpositione scribantur, non mutata voce manet in genitiuo singulari vel plurali, quem *ἰατρὰ* tunc postulat, vt diacydoniῶν, dia morῶν, *ἰατρὰ τῶν πεπρωμένων*: sic nos Arabum antidotum *ἰατρὰ τῶν σαυχλῶν* potius, quàm cum vulgo triasandali. Ad horum imitationem ex Græca voce & Latina practici quoque diaprunum, ni, no, composuerūt, vt epitogium Quintilianus, & *ὑδρογόσσιον*, id est, aqua rosarum Simeon, quam *ροσέσαγμα* Actuarius vocare maluit.

In compositionibus quoque vulgi nomēclaturas non paucas immutauī, partim quòd ineptiores viderentur, partim, quòd veterū & in quibusdam recentiorū appellationes tantquàm puriores & magis naturam rei nobis exprimētes, sequi potius placitū est. Nam quæ isti hodie nomina medicamentis tribuunt, confectioes, electuaria, opiatæ, lohot, rob, suffuf, & alia quædā vel Barbara sunt, vel rei dicendæ non conuenientia. Confectio siquidem còpositio est, vt conficere est componere, & in quam significationē hī contrahūt, sibi non còstant: nec minus inepti sunt in re & nomine electuarii, quod electarium,

ctarium, id est, electa quædam simplicia continens medicamentum dicere alii malunt. Sed cum id omnibus compositis commune sit, ut in methodo componendi probauimus, cur quædam horum sic, alia aliter vocarunt? neque omnes rem eandem vocant electarium, sed hic solidam & siccam confectionem sic appellat, alius etiam liquidiores. Opiatas rectius appellarent medicinas, quæ scilicet opium recipiunt, quibus consistentia similes etiam opiatas vocant, quæ nos veterum more in antidotos reiecit. Quas autem appellationes cuique composito medicamento hic declarando aptiores esse putamus, partim docebimus in singulis compositorum formis & differentiis, partim nunc ex Actuario subiiciemus.

Cum causæ salubres sint quatuor summis generibus Gale-
no comprehensæ, sumendorum, admouendorum, educendorum,
faciendorum, duo prima hic docemus, neque hæc tota, sed in
ambobus medicamenta tantum formis & viribus diuersa.
Nam eorum quæ ingeruntur: quædam sumuntur trita solum &
læuigata: alia cõuenienti humore subacta: alia in trochiscos,
id est, circulos cõplanata: alia in catapotia, id est, globulos de-
glutiendos efficta: quædam aqua ad tertias toquuntur, colan-
tur, & decocti iure iam medicamentofo sumuntur, nunc per
se, nunc cum vino, sapa, melle, saccharo: alia cum horum po-
steriorum alterutro cocta, donec concrecant, quod serapion
& *σουλᾶπιον* Barbara voce solemus nominare: alia prius tri-
ta, deinde cum melle subacta, donec in vnitatem coeant, an-
tidota vocamus. Fructus autem aliquot fugaces, aut iam co-
ctos, aut in salgama plana redactos, ex melle aut saccharo tan-
tis per excoquimus, dum iustum crassamentum obtineant, &
in bellariorum formas fingimus.

Actuar.

*σουλᾶπιον etiam
Simeon vocat.*

Ex admouendis verò quædam formantur in vngueta, quæ
solum illita auxiliantur: alia in emplastra, quæ linteis extesa,
vel alutis tenuibus aut pittaciis inducta superponuntur: alia
vocantur epithemata, quæ tæniis vincta hærent non suo len-
tore: quædam velut *τριμυᾶξ*, id est tritura, & *ξήξια*, id est, sic-
ca & pulueres dicuntur, suntque ea vltima & simplicissima o-
rarium quæ sumuntur: quædam ceu collyria fingentes, qui-
busdam liquoribus diluimus, & ad cotem terimus, tanquam
ocularia medicamenta: alia aliter pro ægrorum conditione,
morbi & partis affectæ natura. Quas autem vires medicamen-

*De his Paulus,
lib. 7.*

Actuar. tum quoduis habeat, ex simplicium natura & totius forma suis locis post audies. Antidota ex herbis, succis, lachrymis, seminibus, radicibusque congestis, & operose tritis, & in vnum cum melle coactis fiunt, mistis magna ex parte calidis, frigidis interdum, & etiam sensum stupefacientibus, interdum & purgantibus, quæ etiam serapiis & zulapiis miscentur.

Gal. initio lib. 1. de antidotis. Medicinas quæ non foris admotæ corpori, sed in corpus receptæ affectibus medentur, antidota, ab ἀντὶ τοῦ ἀδωμένου, quasi contra affectus data, & feminino genere antidotos medici appellant. Vnde cephalicæ, stomaticæ, stomachicæ, cardiacæ, splenicæ, hepaticæ, nephriticæ, colicæ, hedricæ, mithridatios, theriacæ. Galeno propè semper dicitur, sæpe substantiuo antidotus adiecto, sæpe non expresso. Eadem ratione apud eundem cephalicum, stomaticum, stomachicum, & cætera sæpe leges, antidotum scilicet. Horum quædam aduersus deleteria & lethalia pharmaca dantur, alia contra feras virulentas, alia affectibus ex prauo victu natis succurrunt. Sunt quæ vsum hunc triplicem promittunt, vt Mithridatios, Theriace, de quibus tanquam præstantissimis primum nobis dicendum.

Celsus lib. 5. cap. 22. Antidota grauissimis casibus opitulantur, maxime autem vitia sunt aduersus venena corporibus nostris inserta morfu, ictu, cibo, potu: rectè etiam dantur in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus, & collisis ictu vel casu ab alto.

Quia antidoti etymon attigimus, subiit nobis in mentem docere, vnde medicamenta composita nomen acceperunt, quæ nominis ratio magni est momenti ad rem intelligendam. Ab actione & effecto in morbum vel corpus totum athanasia, quod immortalis, hoc est, maxime longæuos homines facit. ἰνδωσιφιλὸν Andromachi ex aloës vnc. ii. croci, mastichis ana vnc. vna lib. 7. comp. ph. part. vt aloë eccoproctica, lib. 6. simpl. Sic cephalica, ophthalmica, stomatica, arteriaca, stomachica, hepatica, splenica, colica, & id genus alia medicamenta, harum partium affectibus salubria, quæ etiam à parte vocata videri possunt.

Acopa, quia lassitudinem tollunt.

Ab inuentore.

Philonis antidotus, Philonium vulgò dictum, de qua in Mesue ex Galeno audies.

Mithrid

Mithridatos, à Mithridate Ponti rege. Multa similiter cognominata sunt, vt Theriace Andromachi, ab Andromacho constituta.

Hiera picra Galeni, quòd eam vsu multo celebrauit.

Diarhodon abbatis, Puluis ducis, in horum gratiam à Medicis inuenta & appellata.

ῥὶς medicamentum ad ischiadas, lib. 10. comp. ph. p.

Diospolites seu diospoliticum, Isis emplastrum.

Diadictamnium sacrum, quòd ex sacris Aegypti locis afferuntur, lib. 2. c. ph. gen. Cyphi heliacum & selenicum. Antidotum σωτήρα, Paulus lib. 7.

A medicamento simplici vel præcipuo quæ Basis dicitur, vel copiosiore.

Diacalaminthe. Diacyminum. Dia trion pipereon.

Diaphœnicon Dia margarum.

Opiata antidotus, quòd opium recipit.

Theriace, quòd pastillos theriacos recipit, vel quòd viperæ moribus præter cætera auxiliatur.

Hieradiacolocynthidos. Diaromaton.

A numero simplicium.

Tripharmacum ex lithargyro, oleo, aceto.

Tetrapharmacum. Theriace δια τῶν τεσσάρων.

πεντάμυρον ex quinque, libr. 7. Pauli, cui tamen quædam accesserunt.

δωκάμυρον ex decem. Dodecatheon, ex duodecim & melle.

Hecatôbe Pauli, licet tantum simplicibus octodecim constet.

A qualitate.

Cygnus Galeno, & cygnus albus & ruber Paulo.

Albæ & melinæ & virides emplastri, lib. 1. comp. ph. gen.

ῥωγα, id est, boni coloris. ἡ δὲ ῥωγα μίγμα in theriace.

δίχρωα vel δίχρῳα, id est, bicoloria. ἡν δία. id est, beneolentia.

δυσωδία. id est, maleolentia. πικρὰ δι ἀλόντ. quæ &

hiera picra Galeni dicitur: est tamen ea multiplex, vt in hie-

ris antidotis leges.

A modo vtendi.

Epithema ventriculi, hepatis, lienis, capitis aliarum partium quibus imponitur, quale quod scutum hodie vocant.

Hypoglottides, quæ sub lingua tenentur, vt paulatim liquata sensim deglutiantur. Lib. 7. c. ph. p. instio.

ibidem. Arteriacæ ἐκλεικτῶ 14. Andromachi, lib. 7. comp. ph. part.
ἐκλεικτον φάρμακον, καὶ ἐκλείκτας λιβάμεις, καὶ ἐκλείματα, id
est linctus, quòd lingendo deglutiantur.
ἔφρινα ἢ ῥινέγγυτα. quæ naribus infunduntur.
καταπότια à καταπίνω, id est, deuoro.

A forma compositi.

τροχίσκοι, quòd rotulæ formā habeant: iidem κυκλίσκοι à figu-
ra rotunda, & ἀρτίσκοι à panis exigui forma Galeno dicuntur.

A nota.

Sphragis Lemnia, id est, sigillum ex terra Lemnia, in cuius
locum supponunt terram sigillatam.

A loco, ubi componitur, celebratius.

Oleū Sicyoniū, à Sicyonia regione Pelopónesi Dioscorid. Ga-
leno autē & Paulo à cucumere agresti, vt in Mesue docemus.

*Gal. initio lib.
1. de antid.*

Mithridates Ponti ac Bithyniæ rex omnium propè sim-
plicium pharmacorum experiētiam habere studuit,
quæ lethalibus aduersantur, vires ipsorum in facinorosis ho-
minibus morte damnatis comprobans, vt Galeni tempestate
Pergami rex Attalus. Quædam igitur ipsorum phalangiis pe-
culiariter resistere deprehendit, quædam scorpionibus, alia
viperis, alia contra aconitum valere, alia contra leporem ma-
rinum, alia contra alia deleteria. Quibus omnibus contempe-
ratis, vnum confecit medicamentum Mithridates, nominatū
ab ipso Mithridation, sperans se præsidium aduersus omnia
lethalia habiturū. Nec spes eum fefellit: vsu enim eius quo-
tidiano corpus à deleteriis securum sic effecit, vt cum exitio-
so & violento potius veneno (quo filia eius enectæ sunt) bis
poto interire, quàm viuus in Romanorum potestatem veni-
re statuisset, nullum inuenerit venenū, quod eum interime-
re potuisset, ob id gladio transfixus interiit.

Mithridatios antidotus ab Andromacho sic describitur,
ad deleteria efficax, & internos omnes affectus.

*Gal. 2. lib. an-
tidot.*

Acori, phu pōtici, hyperici, acaciæ, gūmi ana drachmæ duæ.
Scinci drachmæ duæ, oboli duo.

Anisi drachmæ tres.

**νάρδαλον καλτι
κῆς, ἢ ἰνδολκῆς.*

Folii, *nardi Gallicæ & Indicæ, rosarū siccarū, fœniculi semi-
nis, mēu athamantici, cardamomi, gentianæ, ana drachmæ
quatuor, aliis trium, postremorum drachmæ tantum duæ.

Opii

Opii drachmæ quatuor, oboli duo.

Petroselinii drachmæ quatuor, oboli tres.

Cassii, polii, seseleos, costi ana drachmæ quinque, oboli duo.

Gallii drachmæ quinque, oboli tres: aliis drachmæ sex.

Styracis drachmæ quinque, oboli quatuor.

Myrrhæ, castorii, thuris, hypocistidis succi, ana drach. sex.

Spicæ nardi, opopanacis, scœnu anthus, resinæ terebinthinæ, *ναιδοςάχυν*

scordii, cypheos, ana drachmæ sex, oboli duo.

Dauci feminis drachmæ sex, oboli tres.

Opobalsami, thlaspeos, ana drachmæ sex, oboli quatuor.

Galbani drachmæ septem.

Croci, cinnamomi, zingiberis, ana drachmę septē, oboli duo.

Glycyrrhizæ drachmæ septem & dimidia, & oboli quatuor.

Vini chii quod satis est.

Mellis Attici cocti quantum sufficit, hoc est, libram vnā in pulueris vnc. tres, vel si delicatius vis, sed minus efficax, in pul. vnc. duas. Eadem ratio est quantitatis mellis seu sacchari, & puluerum in cæteris antidotis.

Mithridatis theriace, qua semper vsus est Mithridates contra venena lethalia, & qua utebatur Andromachus, scribitur Galeno lib. 2. antid. ab hac diuersa, vt dimidiū theriaces pōt dicendæ videatur.

Mithridatios à Damocrate aliter sic describitur ver-
sibus apud Gal. lib. 2. antidotorum.

Myrrhæ Arabicæ Trogloditidis, croci, agarici, zingiberis, cinnamomi, spicæ nardi, thuris, thlaspeos, ana drachmę decē.

Opobalsami, seseleos, scœnu anthus, stœchados, terebinthinæ, galbani, costi, piperis longi, castorei Pontici, hypocistidis succi, styracis boni, opopanacis, foliorum malabathri noui, ana drachmæ octo.

Cassæ nigræ, polii, piperis albi, scordii, feminis dauci Cretici, carpobalsami, cypheos, bdellii (quod quidā addunt) ana drachmæ septem.

Nardi puræ Celticæ, gummeos, petroselinii, succi papaueris, cardamomi, scœniculi feminis, gentianæ, foliorum rosę, ana drachmę quinque.

Dictamni Cretici paulò amplius, vel equalis portio.

Anisi, arii, acori, phu, sagapeni, ana drachmę tres.

Meu athamantici, acacię, scinci vétris, hyperici feminis ana
y 5 drach.

drach.duæ & dimidia.

Vini mediocrismod^o, & mellis similiter qđ moderatū fuerit.

Cyphæos compositio à Damocrate eodem hæc describitur.

σάφιλον^o, id est, vuæ passæ pinguisimæ (à qua cortex ac semen totum sint exempta) carnis læuigatæ probè, terebinthinæ* vltæ ana drachmæ Atticæ viginti quatuor.

Myrrhæ, schœnu anthus, seu iunci rotundi, ana drachmæ duodecim.

Cinnamomi drachmæ quatuor.

Bdellii lacrymæ, spicæ nardi, cassiæ bonæ & puræ, cyperi, baccarum iuniperi grandium & pinguium, calami odorati ana drachmæ tres.

Aspalathi drachmæ duæ & dimidia. Croci drachma vna.

Mellis & vini modus mediocris. Bdelliū, myrrhā, vinū in

mortario tere ad mellis liquidi crassitiem, melle superaddito

vuā cū aliis tere. Omnia vbi erūt leuia, fac cyclos paruos. His

Aegyptii sacerdotes diis suis propitiandis suffitu vtūtur. Sic

Rufus vir optimus, & in arte exercitus, parandum prodidit.

Permultæ enim eius cōpositiones etiā Dioscoridi, quarum

vnā describit ab hac diuersissimā, tamē quā in antidota quoq;

misceri ait. Paulus quoq; lib. 7. describit cyphi magnū *ἡλια-*

κόνιον, id est, solare dictum, ex rebus triginta sex confectū: & *σε-*

λωιακόνιον, id est, lunare, quod ex rebus viginti octo constat:

utrūq; ab hoc etiā maximè differens: tamē etiam ad concilian-

dos deos odore grato compositum, & naribus nostris admo-

uendum, vt destillationes à capite in partes subiectas conco-

quat, & grauedine obstructioneq; nos liberet, & cerebri ven-

triculos purget, & pestilentibus morbis resistat. Per os etiam

cyphi sumitur tum ad hæc, tum ad ea quæ pectori inhærent

coquenda, necnon ad frigidos hepatis affectus. Miscetur me-

dicamentis præcipuè epithematibus & antidotis, quæ inde

Cyphoidea vocantur, Paulus lib. 7.

Mithridation autē Andromachi à plerisq; Romanorum

imperatoribus probatissimā antidotū ex simplicibus circiter

quadraginta duobus & cyphi constantem, merito prætuleris

farragini nescio cui Nicolai ex simplicibus centum & octo

constatæ. eadē promittenti, sed verbis plurimis, ad capitis, au-

rium, oculorū, dentium, pulmonū, ventriculi, intestinorū affe-

ctus frigidos, hoc est, pituitosos, melancholicos, seu ad stupo-

rem,

*κεκανυμένος
legeram potius
enim Dioscor.
in Cyphi, σάφι-
λον ἀποικια-
θαρμύνης, resi-
na expurgata.

rem, paralyfin, apoplexiã, epilepsiam, spasmũ, tetanũ, cephalæam, hemicraniam, maniam, melancholiam, grauem auditum, oculos lacrymantes, odontalgiam, cynanchen, asthma, sputum sanguinis, peripneumoniam, lienteriam, dysenteriã, siue sumatur, siue admoueat: præterea ad frangendos calculos, menses ciendos, omnia vteri vitia, scirrhus, podagras, morfus & ictus venenatos, morsum canis rabidi, ad febres quotidianas & quartanas initio accessionum, cocta iam materia, in modum auellanæ cum vino vel aqua, cui saluia vel menta sit incocta. In aliis autem vespere sumpta & admota, quæ omnia per internos omnes affectus intelligit Andromachus.

Mithridation autem priorem theriace descripsimus, quod hac prior tempore fuerit, & quod ex ipsa theriacen excerpserit Andromachus, ut mox audies: adde quod ad pleraque deleteria est efficacior quam theriace: qua tamen inferior est in morsu viperæ curatione, Gal. initio lib. 1. & 2. antidotor. Populis autem septentrionalibus Gallis, Germanis, Anglis, Scottis cum rarissima sint venefica, & malefica animalia, contra hæc mithridatio aut theriace non egent, sed contra alios affectus nuper dictos, quos magnopere antidoti istæ profligant, ut paulo post audies. Ad theriacam antidoton transeamus, in qua ut cæteris medicamentis nosse misturam, facultatem, vtendi tempus, & mensuram oportet. Quapropter de his est nobis nunc dicendum.

Theriaca autem dicta est, quod ferarum & viperarum mor-
sibus medetur, & quod viperas recipiat. Eam verò ex optimis & plurimis medicamentis composuerunt contra morsus venenosos & pharmaca deleteria (quæ duo sunt mala in tota vita grauissima) & cum perpenderent hominum naturas permultum inuicem differre, & aliud alii medicamentum esse idoneum, merito exactam ipsius & variam fecerunt misturam, ut omnibus prodesset. At cum tantus sit *θυσίων*, id est, ferarum numerus, vipera, basiliscus, hæmorrhoides, dipsas, scorpius, aspis, cerasastes, phalangiū, hydrus & aliæ permultæ: sola tamē ex his vipera eligitur, quod ceteræ maximam vim noxiā in suis corporibus totis habeant, ut docet Galenus lib. de theriaca ad Pisonem, vipera eam vim noxiam in capite & cauda solum habet, carne reliqua nativam habet virtutem ad salutem, ut animalia pleraque, de quibus in his quæ agunt à tota substant

*Libr. theriaces
ad Pisonem.*

subſtātia fuſiùs egimus lib. 2. Porro viperarum in theriacam paratarum viſtabifica & corruptrix largiortollitur cauda & capite amputatis. Quæ ſiqua in carnibus remanet, obrunditur coctione, ſale, anetho, reliquis præſtantiffimis medicamentis, ac diſſoluitur: ſic veſicæ per ſe noxia cantharis, & ſuccus papaveris per ſe potus lethalis: miſta verò aliis, ex præparatione plurimum virtutis auxiliatricis acquirūt illa ad vrinas innoxie mouendas, hic ad ſomnum conciliandum & vires inſomnia deiectas reſciendas.

Theriace antidotus ab Andromacho Cretēſi Medico Ne-ronis primario ratione & experientia abſolutiſſimo, ex Mithridatio decerpta eſt, quibuſdam ademptis, quibuſdam adiectis, potiſſimū carne viperarum nō exigua, ob quam appellata eſt theriace ἀπὸ τοῦ θηγίου, id eſt, à fera omnium ſæuiſſima ἡχιδνῆ, hoc eſt, vipera, ad cuius morſus eſt præſtantior mithridatio, quam ob id ex hominum uſu magna ex parte deiecit. Porro Theriace ob ſimplicium probitatem, & horum virtutis inter ſe proportionem fit præſtantiſſima, vt cætera medicamenta compoſita: tamen qui Philonium antidotum aut aliud quoddam exiguum cōponit, non adeo ſummè bonis medicamētis eget, vt qui Mithridation aut Theriacen, aut aliud multæ miſturæ & cinnamomum recipiens, conficit: hic enim omnium præſtantiſſimis eget: qualium copia Romæ Cæſaribus faciliùs quàm alibi gentium ſuppeditabatur. Ob id in ea non Medici ſoli, ſed etiam myropolæ præfertim diuites præſtantiſſima hæc medicamenta componebant. In quibus tamen ſæpe (quia inuentu difficilia omitebant) non leuiter peccabant. Cæſariani verò Medici nullo deſtituti ad probam compoſitionē, ſoli perfectiſſimè talia conficiebant. Quæ res profeſſò facilis potentiſſimo Regi noſtro Franciſco fuerit nauigationibus: ſuorum quidem, Alexandria: Venetorum verò, ex rota propè Aſia: Luſitanorum autem, ex Aphrica & India, optima quæque conſequi medicamenta. Demus igitur operam, vt ſingula his compoſitiōibus neceſſaria habeamus optima ab integræ fidei amicis ex regionibus, in quibus ſunt præſtantiſſima: quæ libris nouiſſe non ſatis eſt, ſed horum notas omnes oculis aliisq̃ ſenſibus, ter, quater, frequētius accuratè explorabis, ne re fallant inſtitores tam callidè omnia adulterantes, & veris aſſimilantes, vt
etiam

etiā exercitatissimis imponant. Tamen vt ad explorandū venias instructior, paucis notas optimorum quorundā simpliciiū ad Theriacen necessariorū perstringā, vt cognitis optimorū notis quisq; deligat optima, quæ apud suos, aut vicinos, aut alias gētes existūt, vt primū habito singulorū defectu, deinde preparatis quibusdā, legitimè tādē ipsam Theriacē cōponas.

Quoniam alia aliis locis & abundant & meliora sunt simplicia, ex quauis regione præstātissima eligantur, quibusdam his indicationibus adhibitis.

Lib. 3. c. ph. p.

Radices sint cortice intento, non rugoso aut rancido: id enim macræ radicis est indicium.

Fructus sint optimi, multi cum furculis & germinibus, & aliis, quæ ipsis inhærent foliis, inuolucris, floribus.

Semina, vt radices, sint bene nutrita, hoc est, procera, & plena, quod intentus cortex indicat.

ὄπους & χυλούς non siccatos tempore, nec suis qualitatibus, & viribus inualidos gustatus & olfactus indicabunt.

Herbæ autem in Theriacam recipiendæ sunt, scordium, nepita, prasion, stœchas, dictamnus, polium, chamædrys, chamæpitys, hypericum, centaurium tenue.

Radices, zingiberis, ireos, rhei, pentaphylli, costi, nardi Indicæ, nardi Gallicæ, gētianæ, mei, acori, phu, aristoloch. tenuis.

Semina buniadis, id est, napi, Ruell. in Actuar. petroselinii, thlaspeos, ameos, anethi, fœniculi, dauci, cardamomi.

Chamæpityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, hypericū, poliū, & alia eiusmodi florētia accipies, nō sole æstiuo siccata, neq; dum fructus horum adhuc crudi sunt & imperfecti.

Mel theriacæ idoneum sit dulcissimū, & acerrimum sapore, pallidum colore, aut flauum, odoratissimū, substantia nec crassum & grumosum, nec impensè liquidum, sitque totum sibi vnitum & lentum, vt digito si tollatur, visci modo longissimè seruet continuitatem, quale est Hymettium, vel Thasium, vel Atticum, vel aliud simile, sed mediocriter coctum sit, vt terreum & flatulentum coctione separetur. Mel item binum vetustiore & recentiore est melius, modò non sit amarum, aut vinosam aliquam qualitatem odore & sapore referens, siue vetustate, siue coctione & despumatione longa vtrunque contingat, id quod sola experientia probatur.

Vinum quoq; sit phalernum, acre, laudatissimum, vel simile: non

le: non phalerum faustianum dulce, non imbecillum aut recens, & crudum adhuc ob nouitatem. Melius enim est vetus, nondum tamen amarum: sit etiam tenue substantia, perlucidum *κίρρον*, id est, fuluum, nō album, non rubrum, non nigrū: sitque odoratissimum, & suauissimum, non quod id theriacis aut mithridatij virtutem reddat meliorem, sed quia has antidotos alioqui ob multa amara (nā amara sunt omnia medicamenta, quæ lōgo vsu virulentis bestiis aduersari sunt iudicata) ingratas, gratiores efficit. In omnibus enim medicamentis, quæ deglutiuntur, ratio est habenda & sollicitudo de saporis gratia, vt in methodo medicamenti componendi abundè probauimus. Vinum ergo misce firmissimum, & validum imprimis, & quod pluribus annis non amplius mutari probaris: vitabis autem valde imbecillum, aquosius, valde austerum, facilè accescens, vetustate amarum.

Opiū Thebaicum, vel illi bonitate proximum. Marum sit valde amarum, minùs acre, odoratius amaraco acri & minùs amaro. Vtraque sint Cretica.

Rosæ præstantissimæ sint omnium suauissimæ, & aliis rubicundiores.

Scordium Creticum optimum: tamen non malum in aliis regionibus potest inueniri.

Napi seu rapæ sylvestris semen Creticum.

Iris Illyrica, & ex ea vt cæteris medicamentis, odoratior: vnumquodque enim est præstantissimum, quod proprium generis sui odorem, vt & saporem habet valentissimum: non Libyca, quæ ab Illyrica tantum abest, quantum corpus mortuum à viuo.

Agaricum leuissimum est laudatissimum: densum, graue, lignosum est deterrimum.

Cinnamomum sit odoratissimum, seu indicibilem quandam odoris gratiam super alia omnia referat, gustanti calidum admodum percipiat, non tamen vt moleste rodat. Colore autem tale, ac si quis lacteum colorem cum *φάτω*, id est, fusco & modicè cyaneo misceat.

Succus glycyrrhizæ Creticus præstantissimus, vt Cretica glycyrrhiza.

Opobalsami Iudaici, id est, optimi, notas omnes repete ex simplicibus. In quibus etiam fusiùs horum singulorum proborum,

borum indicia legas licet.

Myrrha optima opocalpaso aut liquore aliquo non vitia-
ta: fit autem Troglodytis aut Minæa, à regionibus, vbi præ-
stantissima gignitur.

Crocus fit Corycius, à Corycio antro, in quo nascitur: vel
potius alius odoratissimus, & longo tempore in vigore suo
persistens, ac flauissimus. Nam robore odoris præsentanei,
& diuturnitate, & flauitie optimus est iudicandus, non proce-
ritate Corycio præcipua.

Zingiber non pertusum, sed siccum & acre esto.

Rheon densum contractumque substantia validè astrin-
gens, si viget ac integrum est: nam citò perforatur. Quod au-
tem coctum est, rarius est, ac nihil aut minimùm astringens:
huius loco rha barbarum Auicenna substituit.

Pentaphyllum siue fit tormentilla vulgaris, siue aliud, in-
terea tamen dum lis dirimitur, cape tormentillam.

Calaminthe Cretica montana melior.

Praesium album & Creticum, vel ex editis locis.

Petroselinum fit Macedonicum: idem amarissimum est
atque acerrimum.

Stœchas Cretica, vel ex Stœchadibus insulis: sic enim lego
in Galeno, non Cycladibus.

Costus fit, qualem ex Diosc. in simplicibus pinximus.

Piper longum natium, ob id in aqua insolubile, album in
simplicibus.

Distāni herbæ Cretēsis folia, nō cū vulgo radices fictitiæ.

Iuncus odoratus fit Arabicus. Flos melior, sed rarus adue-
hitur, quòd eum in viis Arabiæ frequentissimum iucundis-
simè pascant cameli: solo odoris vigore discernitur. Illius e-
nim odoris gratia citò vanescit.

Thus fit *ἀμύρον* masculumque.

Casia optima, que furculis, & corticis tenuitate, gustu, odo-
re fit cinnamomo simillima.

Indica nardus radix est, quæ tamen à spicæ similitudine
spica nardi dicitur.

Poliū, chamædrys, chamæpitys, hypericū, gētiana, thlaspi,
nigrū veratrū, & alia quædā Cretica paulò præstantiora sunt
Italicis. Si tamē ver totū siccum fuerit ætatis modo, Creten-
sibus Italica nō multò sunt inferiora. Sefeli Mafsiliense

Styrax

Styrax fit, qui in arundinibus ex Pamphylia affertur, & paucissimus gignitur, tamq̃; diuersus ab hoc copioso styrace, quàm falernum vinum ab eo quod in tabernis venditur. Capite calidissimum, odore & sapore valentissimum.

Thlaspi Creticum, colore *ὠχροῦ ἐνδοῦ*, figura rotundum, multò minus milio. Præstat verò ex Cappadocia alterum, multò nigrius, & maius prædicto, non exactè rotundum.

Ami Creticum, vel ex regionibus siccis & altis.

Hypocisthis }
Malabathri foliū } Vtrumq; quale Dioscoridi describitur.

Terebinthina sit Chia potiùs, quàm cū Andromacho Libya: aut cum aliis Pontica. Chia enim omnibus aliis odore & sapore præcellit.

*Viperarum delectus, & ex his ritè paratis pastillorum
theriacorum compositio, ex Galeni libris.*

Viperæ deligantur magnæ, bene nutritæ, corpore toto & ventre crassiore, subflauæ, collo valde prominenti, capite latiore, oculis rutilis ac subrubentibus, interritis, truibus, ac ferino aspectu, præsertim irritatæ, meatu magis ad extrema caudæ vergente, cauda non inuoluta sed potiùs conuersa, validæ, bene mobiles, tamen incessu quieto & tardo. Hac enim re fœmina differt à masculo: & quòd ea caninos & acutos dentes habet, plures duobus masculo propriis in capite acuminato: ad delectum præter hæc tempus venationis harum, & quædam in his enecandis apparentia, de quibus mox dicam, pertinent. *Ἰνγία*, id est, viperas Crito vult capi in fine veris, aut trygeto, id est, autumnii medio: cauendam verò ætatem ab initio ad canis ortum, & huic succedētis operæ tempus, cū fructus fugaces eduntur, & bilis hominibus copiosissima suboritur. Galenus quoque viperas venatur exacta hyeme, veris initio, vbi latebris relictis in apricū prodierint, & nemora petunt, ac subdiales semitas, & semine marathri oculos recreant, suntq̃; iam audaces & celeres, nec virus tam maleficum retinent. Nam delitescētes maligniorē vim tabificam in se contrahunt, quia nulla ex parte digeruntur, tuncq̃; serpens omnis solet vocatum *γύγας*, id est, senium & exuium colligere, quod est crassissimum quoddam tegumentum tempore quo delituit contractum magis quàm ætate anim

*Nicander in
theriacis.*

*Galenus in fi.
lib. 1. antidot.*

te animalis. Non statim igitur ubi latebras egressæ sunt, capiendæ, sed permittendæ aliquandiu & aëre frui, & consueto vesci cibo, hoc est, herbis quibusdam & animalibus, ut buprestibus, cantharidibus, pityocampis: hæc enim idonea ipsarum sunt alimenta. Nec te moueat, quod Crito in fine veris capit, Galenus initio veris: lib. autem simplicium vndecimo, ineunte æstate optimam viperarum carnem prodit. Nam hæc tempora sunt finitima, & parui momenti est horum differentia, si cæteras conditiones ante venatum necessarias, quas nuper dixi, obseruatis. Ne autem capiantur æstate media, quia tunc caro earum sitim efficit, ut semper earum, quæ in locis maritimis, aut aqua salsa. Neque capiantur mox, ubi latebras reliquerunt, quod tunc earum caro frigida est & sicca, ac malè nutrita, sed tempore inter hæc medio, desinente scilicet vere, nondum verò inchoata æstate: vel si ver admodum hyemale extiterit, æstatis initio non longè à Pleiadum ortu. Non capiendæ item prægnantes, quia emaciatæ sunt. Capiendæ autem sunt notandæ magnitudinis viginti, aut paulò plures. Hæc enim quantitas medicamento non erit nimia, ut ad totius confecturæ copiam sufficiat, vel pro quantitate compositionis accipiendæ sunt. Capita & caudas recens captarum & adhuc viuientium præcide, ut cum sanguine virus effluat. Præcides verò in magnis viperis ad digitos quatuor: Damocrates autem capita ad tres digitos prius, postea caudam ad paulò maiorem quantitatem præcidit apud Galenum, quod hæ partes sunt virulentæ magis & duræ, & modicæ carnis. At Galenus lib. vndecimo simplicium caudam negat præcidendam, quod quæ ad hanc excrementa tam liquida quàm sicca esse possunt, exenteratis viperis faciliè eluantur: quod autem in ore est venenum, ineluibile est. Idem verò in libro de Theriaca ad Pisonem aliorum sententiam sequutus caudam tollit, quod sordidiorem (inquit) substantiæ portionem pars hæc magis exercita plenius trahit, ut quæ piscium caudis proximæ sunt partes, ob frequentem motum magis nutritæ sunt. Quod si post amputationem dictarum partium protinus exangues ac immobiles & mortuæ fiant, tanquàm theriacæ inutiles reiiciantur. Contrà quæ aliquandiu post præcisionem motum aliquem retinēt, & sanguinem diutius fundunt, præstantissimæ, quia virtutem habent πρὸς τὸ σώζειν, id est,

est, ad seruandum non ignauam sed validam.

Partibus his reſectis, inteſtina exime, quia ſunt excrementorum receptacula. Cute deinde vt anguillis detracta, & tota pinguedine ceu inutili exempta, corpus reliquum aqua pura probè lotum in fiſtile vas elegantiffimè conſtructum, vel ollam, vel cacabum, vel lebetem probè exterſum & ſpléndidum immitte cum aqua fontis pura, anethoq; viridi, tunc enim vi-
ret. Faſciculum verò mediocrem anethi ſicci Damocrates imponit. Coque mox igni ex carbonibus peruſtis, aut lignis ob ſiccitatem ἀλῦπῳς, id eſt, ſine fumo, aut potius ex vitium ſarmētis, cum pauco ſalis recentis, ſi apto tempore cepiſti viperas: ſin æſtate, ſine ſale. Hunc autē ſalem ſtatim initio imponit Galen. lib. 11. ſimpl. dum coquitur verò, miſcet lib. 2. ad Glauconem, quæ tenui diſcrimine diſtant. Id autē fit ad com-
poſiti ſuauiatē, qua etiam cauſa paſtillis theriacis ad læuorē tuſis & cribratis vtendi tempore ſalem miſcet, lib. 11. ſimpl.

Vbi iam percoctæ ſunt, vt caro oſſa & ſpinas promptè relinquat, & edi poſſet, depone ab igni, aqua exime, carnes à ſpinis virus olentibus & abiiciēdis, accuratè ſecretas, ac probè tritas cum pane friato miſce, & paſtillos forma. Panis ſit puriſſimus ex puriſſima ſemidali, id eſt, ſimilagine & flore farinæ, ſaluſ, fermētatus, non hipnites, id eſt, coctus ſub teſta, ſed clibanites, id eſt, coctus diligenter in clibano, alioqui medicamentum facilè aceſceret. In ſicca domo tam bene ſit ſiccatus, vt in mortario ad læuorem tundi poſſit. Panis momentum miſcet Andromachus, id eſt, partem dimidiam, vel tertiam, vel quartam, interdum quintam, quantū ſcilicet paſtillis formandis ſufficiat. Panis vnciam vnā carnibus viperarum ſexdecim accumulatis miſcet Crito. Panem triticeum purum æquali pondere miſcent Damocrates & Magnus. Eum panem maximè friatum & læuiſſimè in mortario tritum miſce cum carnibus accuratè, & ſubige, vt nulla viperinæ carnis portio non læuigata maneat. His probè tritis affundūt parum iuſculi decocti plerique, & Galenus in Theriaca ad Piſonem, & Actuarius: libro autem ſimplicium vndecimo panem requirit ſiccum, vt cōtundi in mortario poſſit: tamen tundendo non miſcetur carnī, ſed decocto viperarum maceratur, & caro in mortario coquorū teritur, donec ſit læuis, tuncq; pani miſcetur, ſic ex pane non ſicco, ſed per
viperarum

viperarum decoctum irrigato, diu se, & Cæsarianos ante se medicos præparasse Galenus scribit: sed quia ægrè siccescebant, & caro putrescebat, panis verò acescebat, cognitum errorem Galenus emendauit, & iusculū miscere desiit. Quum ex pane sicco facilius siccentur pastilli, quàm irrigato, & panis per se in læuorē tritus carni viperinæ etiam per se prius exactè læuigatæ melius miscetur, & fiunt cycli vel cyclisci, id est, orbiculi, vel ἀγίσκοι, id est, pastilli, (quæ alio diminutiuo ἀνθήσνια καὶ ἀγρίσνια vocat Damocrates) vel τροχίσκοι, id est, rotulæ tenues mel mediocres opobalsamo modico subacti. Nam crassi, vt qui cum iure sunt facti, antequàm siccescant, carnem viperarum putrescere, & panem acescere permittunt. Mox ubi erunt formati trochisci, siccentur in domo calida sicca, & in eadem reponantur. Sit autem domus hæc sublimis, & meridiem spectet, aut saltem non septentrionem, vt bona diei parte domus accipiat solis radios, sic tamen vt pastillos in vmbra locatos solis splendor & radius non attingat. Sic enim faciliè siccabuntur, & si continenter verteris, vtraque parte æqualiter. Nisi autem vertantur, parte superna plus iusto siccantur, inferna humidiores, dum diutius manēt, putrescere periclitantur. Siccati in eadem domo etiam extra solis radios condantur, continuè vertendo aliis diebus plurimis vt quindecim: post donec theriacen sis præparaturus, reponere vase vitreo, vel aureo potius quàm stanneo, vt quod plumbi mistura adulteratur. Quod autē ex argento non purgato fit, celerrimè huic ærugo obnascitur. Ob id ex vtroque metallo, stanno inquam, & argento non purgato, vasa non in hac solum, sed in cæteris quoque antidotis vitabis. Præstaret tamen non multo post his pastillis vti: tamen efficaces adhuc sunt post annum, & post tempus etiam longius. Nam probè initio siccati & repositi annis tribus & quatuor in vigore permanent, si modò puluerem ipsis obductum linteis puris aliquoties abstergas. Cuius diu adhærescentis occasione perforantur, tuncq; inutiles euadunt, alioqui vtilis, etiam si plurimum inueterentur.

Lib. II. simpl.

Lib. I. antidot.

Pastillorum scilliticorum confectio.

Pastilli scillini

S Cillam bonæ magnitudinis (non tamen admodum magnam & enormem) bene habitam & nutritam, albam, recentem

lib. I. antid. & lib. de th. ad Pis.

centē ex terra fumes, cū folia eius & caulis exactē inaruerit, seu vt Crito iubet, quando triticum metunt: tunc enim potissimum viget. Corticosa eius parte & radice lignosa omni adempta, corpus reliquum maza seu farina tritici optimi, recentis, fermētata & subacta circumline (quidam etiam cum cortice maza circumdant) non autē gypso aut luto cū Critone: id enim sordidum est. Deinde in calido cinere copioso vel clibano calido, si quis adest, cum panibus coque, vel *ιωρῶ*, id est, testa furnacea, vel cacabis, vel patinis, quibus panes coquuntur. Coques autem æqualiter, & donec maza bene siccata in crustum omnino dure scat & abrumptur, ac festuca in scillæ corpus per rimas demissa promptē recipiatur.

Crusto abiecto scillæ medullam cum Critone, id est, scillæ ipsius partes interiores tenerrimas, exactē tritam misce cum farina erui candidi (non album enim est vehementer amarum) parum torrefacti. Farina autem hæc sit optima, recentissima, adamussim læuigata, tenui cribro creta, vt sit vna farinæ pars, scillæ duplum cum Critone & Damocrate & Magno: vel cum Andromacho minore, duæ partes farinæ, vt drach. nonaginta: scillæ verò tres, vt drach. centum viginti. Sed largior hæc farina, vt parciore est dimidia cum Damocrate & aliis. Portio autem farinæ & scillæ æqualis Galeno magis placet, ceu fingendis pastillis aptior.

Quidam huius farinæ penuria micam panis friatam, vt in pastillis theriacis addunt. Forinantur autem trochisci mediocres, & siccantur ac reponuntur vt theriaci.

Hedychroon magma sic conficit Andromachus.

Mari, amaraci ana drach. duas.

Asari, aspalatxi, schœnu anthus, calami aromatici, phu Pontici, xylobalsami, opobalsami, costi, cinnamomi } ana drach. tres.

Myrrhē, folii malabathri, costi, casti, nardi Indicē, ana dr. sex.

Amomi duplum. Mastiches Chiæ drachmam vnam.

Omnia vino falerno sparge, fac magma.

Hedychroi magnetis compositio alia ex Magno Galeni.

Aspalathi radice corticis, calami aromatici, schœnu anthus, phu, costi, asari, xylobalsami, castiæ mastiches, foliorū malabathri } ana drach. sex.

Nardi

Nardi Indicæ drach. sexdecim. Croci drach. nouendecim. Amaraci drach. viginti. Cinnamomi, amomi, myrrhæ ana drach. vigintiquatuor vino falerno excipe, & opobalsami contactu. Pastillos finge, sicca in umbra. Pastillos Hedy-chroos iisdē propē cōponit bis Actuar. sed pōderibus, vt hic quoque, mutatis, & quibusdam omisis, quibusdam additis.

THERIACES COMPOSITIO.

Pastillorum scilliticorū drachmæ quadraginta octo Andromachus, & cum eo cæteri: sed Demetrius tempore Galeni factus etiam archiatros, tantum drachmas quadraginta sex miscebat.

Pastillorum theriacorum
Magma sicci hedichroi
*Piperis nigri Damocrat. } ana drachmæ viginti quatuor.

Opii
Rosarum siccarum foliorum
Scordii Cretenfis
" Bunialdis dulcis seminis,
gongilidis agrestioris seminis alii
Iridis Illyricæ odoræ
Agarici albi Pontici
Cinnamomi. Hæc duo omittit Andromachus pater, addunt filius & Damocrates.

Succi glycyrrhizæ, sicci addit Damoc.

Opobalsami Iudaici boni

Myrrhæ Trogloditidis

Croci Corycii, vel potioris

Zingiberis sicci & acris

" Rhei Pontici integri

Pentaphylli radices

Calaminthes siccæ, hoc est, nepithæ Romanis dictæ.

Prælii seminis, vel cum Damocrate,

σφαγιών, id est, verticillorum marrubii

Petroselini Macedonici mōtani, tenuis seminis

Stæchados Creticæ, vel à Stæchadibus insulis

Costi candidi

Singulorū drachmæ duodecim.

Singulorū drach. sex.

*Piperis longi
drac. 24. ponit
And. pater: cui
credēdū magis
quàm filio po-
nēti tāū drac.
sex. Illius enim
pondera carmi-
ne elegiaco scri-
pta deprauari
non potuerūt:
filij proja scri-
bētis potuerūt.

"Napi Ruel.
Act. Auic. Ra-
pe, Nic.

"Rhabarbari
Auicēn.

Piperis albi & longi. Cyanei Andro. pater.
 Dictamni herbę Cretensis.

* ἀμύτου.
 masculi alij.

σχοίνου ἄνδρ. ♂ Damocrates: καρφίωρ alii, id est,
 iunci odore floris, σχοίνου ἐνώδους alii

Thuris* infecti,
 Casię fistulę nigre corticis
 Nardi Indicę

Polii Cretensis comę
 Seseleos

* Liquidę Ani
 cen. Calamitę
 Nic.

* Styrcis Pamphylii
 * Thlaspeos tenuis Cre-
 tensis, vel potiùs Cappa-
 docis magni

* θάσσω ♂
 λιπῆς.

Ameos

Chamędryos } cāpestreis
 Chamępityos } Cretęs.

Hypocistidos succi flauen-
 tes

Malabathri foliorum

Terebinthinę

Nardi Gallicę purę

Gentianę radicis

Anisi seminis torrefacti

Mei Athamantini

Lachrymę
 alij.

Succi acacię adhuc humi-
 dę Damo.

Fęniculi Cretensis semi-
 nis

Terrę Lemnię

Chalcitidis tostę

Amomi vuę

Acori

Phu pontici

Carpobalsami

Hyperici Cretensis semi-
 nis

Cardami, id Gummeos
 est, nasturtij. Cardamomi

Singulorum drachmę quatuor
 Andromach. drachmę duę Da-
 mocrates.

Dauci puri Cretici feminis
 Galbani, χαλβάνης χαλβάνιδος
 Andromachus senior.
 Sagapeni recentis & veri
 Opopanacis
 Bituminis Iudaici
 Castorei seu castoris testiculorum
 Comæ centaurii Cretici tenuis
 non recentis
 Radicis tenuis aristolochiæ pro-
 bè ficcatae

Singulorū drachmæ
 duę Androm. drachma
 vna Damocrates præ-
 stantiss. Medicus, in lib.
 de antidotorum compo-
 sitione versibus scripto.
 Cætera Andromacho
 consentit.

Anic. & Nicol.
Mumia Nicol.
Belzeard. Anic.
cen. addit.

Aristot. longæ
Nicol. rotundæ
Anic.

Mellis Attici drachmas centum quinquaginta, seu libras de-
 cem Andromach. vini falerni, quod sufficit. Aliam ordine
 contrario scribit Galenus, incipiens vbi alii desinunt: à mini-
 mis enim ponderibus incipit, & desinit in maxima, à qui-
 bus alii incipiunt. Incipit enim Dauci fructus, opopanacis,
 &c. ana drachmas duas. Polii comæ, seseleos &c. ana duplū,
 id est, drachmas quatuor. Myrrhæ, croci &c. ana drach. sex.
 vbi etiam καλαμὴ additur: reliqua eodem ordine, dupla ta-
 men proportionem.

Ex his patet Andromacho per omnia consentire Damo-
 cratem, præterquàm in duobus dictis ponderibus. Xenocra-
 tes etiam studiosè in componendis medicamentis versatus,
 per omnia Andromacho consensit, præterquàm quòd saga-
 peni drach. tantum duas miscet. Magnus tempore Galeni
 etiam Imperatoris archiatros sagapeni etiam drachmas tan-
 tum duas, & chalciteos miscet. Cinnamomum autem dupli-
 cat, & duos vini falerni sextarios infundit. Alii autem quali-
 cunque vini mēsurā vtuntur, vt postulat vsus. Cætera omnes
 Andromacho consentiunt.

Modus componendi Theriacen.

Pastilli theriaci, scillini, magma hedichroi dicta prius tria
 genera, scilicet, herbæ, radices, femina. Piper* album & lon-
 gum, rosæ ficcæ, agaricum, crocus si ficcus fuerit, sphragis
 Lemnia, chalcitis tosta, amomum, cinnamomum, casia fistula,
 opobalsamum, acacia (præterquàm si mollis sit & liquida)
 castoreum.* aspalathus, sicca hæc terantur in pila Aegyptia,
 vel alia quoque durissima, ne aliqua huius substantia inter
 tundendum extrita, cum his prædictis remisceatur. Lævigata
 hæc

Ad verbū hæc
omnia ex Gal.
mutuatur
Actuar.
**nigrum addit*
Act.
**ασφαλθ*
Act.

hæc cribro tenuissimo incernantur, vt in corpus promptius penetrent. Myrrha autem & crocus si non sit siccus, vino macerata læuigentur, si tibi ita fieri tutius videbitur, vt crocus natura humidus non teratur. Omnes item opi, vt sagapenum, opopanax, opium, acacia (si liquidior est, & tuendi contumax) succus hypocisthidis, succus glycyrrhizæ, vino perflu si soluantur, & ad leuigationem fiant idonei.

Sed thlaspi & gongilidos semen satius est per se in pila tundere (quia cum aliis tusa mortario hærent) deinde vinum affundere, quoad exactè dissoluatur, tunc misce his quæ vino macerata & leuigata fuerunt. Sic thus per se in mortario terere præstat, sed leuiter ne late scat: & cretum in promptu habere, vt inspergas his quæ vino leuigata sunt. Gummi vino infusum macerari potest, ac ipsum vel per se vel cum thure leuigare. Sic quædam ex vino, alia per se leuiganda. Cum hæc omnia vniendi tempus erit, in vase duplici liquetur cum melle, prima resina terebinthina, post hanc styrax & galbanum prius confracta & cõtusa in pila pistillis aut vestibus ferreis, paucissimo mellis crudi addito. Vbi hæc nostris digitis dilatata fuerint, iam liquata in melle resinæ excipiantur, & operculo vasi aquæ insidenti imposito dissolue & coque. His enim vasi iniectis satius est mel non amplius commouere his liquefcentibus, arida immitte his quæ leuigata ex vino fuerunt, & misce denuò, dum abundè crassescant. Atque ita paulò post his quæ in mortario sunt, cochleari magno quæ liquefacta sunt paulatim affunde tepida, & vir aliquis robustus ipsa in vnitatem cogat.

Vbi probè coierint, & crassamenta adepta fuerint, crassamq; massam ostenderint, mellis cocti mediocriter & desputati nonnihil iniice: mox aliquam tritorum & cretorum portionem: deinde rursus mellis quippiam: postea liquefacta misce tepida, & omnia in mortario grandi, cochleari magno valenter contere, & adiice quæ ex aridis supersunt, & mel. Vbi omnia in mortario per cochlear vnita fuerint, omnia è mortario tunc in pilam coniicere oportet, ac vestibus ferreis omnino puris & nihil æruginis habentibus, continenter tundere, illinendo vestes extremos opobalsamo, donec totâ eius portionem absumpseris: sic enim promptè opus absolues: siquidem lentore medicamenti vestes detinentur,

& egrè

*δυῖα

*ὀλμον

& ægrè à tundentibus leuantur. Præstat autem in sole tondere: sic enim citius omnia in vnitatem coguntur. Postea pilam quæ medicamentum continet, tege, & post quatuor aut quinque dies similiter in sole contunde, atque id iterum & iterum post sex aut septem dies, vsque ad duos menses, aut omnino ad quadraginta dies feceris. Tunc manu opobalsamo pauco intincta in vasa pretiosa reponatur: sic tamè vt illa non repleantur, sed spatium aliquod relinquendum, quo perspiret. Adhæc operculum sæpe detrahendum est, vt liberius exhalet, & maturior ipsius vsus tibi contingat: longo enim tempore ad coctionem sui antidotus indiget, vt postea dicetur.

Color eius quia virtutem non mutat, parui faciendus est: nigricat autem nisi propter chalcitidem malè vltam, flauum aut fuscum fiet, quæ quanuis pauca sit (nam drach. quatuor) aliorum tamen colorem superat.

Sic autem componit Damocrates: Succos, lacrymas, metallica ex vino terit, ad mellis crassitiem arida cætera tusa & creta tenui cribro protinus iniicit, & miscet probè melle adiecto. Postea bis ter'ue feruefactum, vbi rursus rigauit, imponit vasi vitreo, argenteo, aureo, stanneo, corneo: vel ollæ densæ, non vasi ligneo.

Omnia ad theriaces compositionem necessaria sunt abundè exposita. Tamen temerarius fuerit, qui ex sola lectione theriacen cõponere aggredietur: semel enim compositionem spectare omnino est necessarium. Descriptiones verò theriaces ab Andromacho patre, Damocrate, Critone versibus expressæ magis recipiendæ sunt, quòd memoria facilius tenetur, & quòd mensuræ & pondera in eis adulterari nequeant.

Vires antidoti Theriacæ ex Andromacho seniore primo lib. antid. Galen. & Damocrate.

Efficacissima est Theriaca contra potum papaueris, cicuta, hyoscyami, aconitû, Medæ pharmaca, cantharidas, morsum viperæ, ceraستن. dipladem, dryadem, hæmorrhoon, phalangia, hydrium, epichersum, amphibænam, rubetam, chersydrum, canis rabidi morsum, potionem veneni. Valida etiã est ad stomachum æstuantem flatus stomachi, colicum dolorem à flatibus, phthisin incipientem, asthma, pleuritidè, empyema, icterum, hydropem, spasmû, tetanum, opisthotonon,

emprosthotonon, vesicæ vlcus dolens, ischuriam, satyriasin, renum dolorem. Pestem, & alia propè innumerabilia, quæ scribuntur in lib. de commodis theriaces.

V S V S T H E R I A C E S.

Datur Theriace vt Mithridatios, & cæteræ antidoti, ad præcautionem quidem fabæ Aegyptiæ magnitudine semel cum tribus aquæ calidæ cyathis.

Lib. I. antid. Ad curationem verò sumpti iam veneni quotidie bis datur quadruplo vel quintuplo aucta. Capitur autem hora somni, vel manè, vel utroque tempore. Manè quidem his, qui die ægrotant: vespere verò his, quibus nox est molestior.

Damocrates. Da autem potui nec recens nimis, nec vetustate peraridum, quale si fuerit, cum pauco melle iterum seruefac, & diutere, tandem habebis vtile, quod valebat nihil, sed inualidius, eò quòd semel tantum miscuisti. Recens verò præpollentem adhuc habet opii frigiditatem, eoq; stupefacit, nec præstat quidpiam promissarum prius virium, quoad fuerit percocta. Tempore autem longo, plurimum annis duodecim ad coctionem eget antidotus: vigentior autem validiorq; est ab anno quinto, sexto, septimo, præsertim in his, qui à virulentis feris, aut cane rabido morfi sunt, & pharmacis lethali-
bus petiti. Hi enim omnes cum grauem noxam ab his venenis acceperint, potètiore theriace indigent. In aliis verò affectibus vbi tanta noxæ causa non est, sufficit vel sexagenaria theriace. Potens enim est ad annos triginta.

Valida autem & vigena iudicatur, si data post medicamentum aliquod purgatorium, sua virtute, medicamento purgantis efficaciam euincat, & medicamentum purgare prohibeat. Quòd si purget, perinde ac si homo theriacem non sumpsisset, liquidò constat adulterinam esse, ac vires eius inualidas, aut vetustate confectas esse, vt ne medicamento quidem virtutem superare potuerit. Quam tamè Marco Antonino Imperatori ex recente cinnamomo primi generis parauit Galenus, sumpsit statim Imperator, non præteritis adhuc mensibus duobus integris, non expectata medicamento coctione, Gal. I. antidotorum.

Theriace vt Mithridatios singulis diebus sumpta, omnino à deleteriis & lethalibus pharmacis securos reddit: sumitur autem ad fabæ Aegyptiæ quantitatem ex aqua, aut vino,
aut

aut melle, aut per se. Huius quotidiano usu Aurelius Antoninus Romanorum Imperator (cui etiam medicus fuit Galenus) à graui sopore, quo in actionibus suis cum premebatur, sanatus est, adempta papaueris lacryma. Cum autè postea bonam noctis partem duceret infomnem, tum ob siccitatem naturalem (erat enim siccioris temperamenti natura) & ex longo usu medicamenti siccantis acquisititiam, tum ob omis- sum consueti & soporiferi medicamenti usum, coactus est etiam theriacam cum papaueris lacryma compositam, sed inueteratam adiciere. Nam in huiusmodi medicamentis opium vetustate mitescit.

Morsus ab animali venenato sumpta theriaca omnino euadit, & hac præsumpta si post mordetur, non moritur. Quod sæpe prætores in noxiis hominibus probarunt, Galenus in aliis animalibus. Quotidie tota vita sanis salubriter sumitur Theriace, siue venenum metuant, siue ut diuus Marcus Imperator, corporis iuuandi gratia, hoc usus etiam affatim, & veluti alimento quodam. Vnde initium magnæ æstimationis Theriaces, & vires actionis eius hominibus innotuerunt, & sub illius seculi maximis Imperatoribus in publicum usus eius prodiit.

Antidotus Efdre (quisquis is fuerit) eadem propè pollicetur, quæ Theriace, sed hac multò est ad omnia imbecillior, ob id obscurata euiluit quouis modo parata. Nã Actuarius ex 27. componitur: Aëtio & Paulo ex 47. nec iis omnino iisdem, nec eodem pondere: Nicolao ex centum quadraginta quatuor.

Ambrosiam & Athanasiam à iunioribus Medicis nominatas esse antidotos, docet Gal. libro 8. meth. hasque calfacere & ficcare, ut Theriacen. Has quoque tres antidotos, Ambrosiam, Athanasiam, Theriacen, sumptuosas esse dicit lib. 14. meth. et salubriter sumi contra internos abscessus, præsertim viscerum, ut collectum humorem in halitum resoluant, & digerant: & in lib. sanit. tuendæ harum meminit.

Antidotum Mithridatis Athanasium triplex, lib. 2. antidotorum. Est & Athanasia hepatica Alexandri Tralliani, & Athanasia Oribasij apud Paulum, & Ambrosia Philippi Macedonis, lib. 2. antidot. quarum nulla est hodie in usu, aut non admodum frequenti, quòd harum loco Mithridatios aut Theriace recipiantur, adeò magna omnium fide & summis suc-
cessibus

cessibus probata, vt myropolæ quidā circumforanei in Gal-
lia quæstum vicatim faciant suis nescio quibus compositioni-
bus, quas tamen Mithridatij & Theriaces nomine diuen-
dunt. Hæ igitur Athanasia, Ambrosia, Acharisti, Hadria-
ni, Hæmagogi, & aliarum quarundam Arabibus celebrata-
rum compositionum loco fuerint, vt velut postliminij iure
in vsum redeant, cum eadem omnia præsent, multoque feli-
cius, quàm Arabum compositiones ex istis excerptæ, additis
aut ablatiis quibusdam, neque his magni momenti.

AVREA ALEXANDRI ANTIDOTVS.

Recipit asari
Carpobalsami
Seminis hyoscyami

} Ana drach. duas & dimidiā. 55. Had.

Caryophyllorum

* *μύρρα*, id est, * Myrrhæ oēs legunt,

baccas myrti
Actuar.

Ciperi

} Ana drach. duas. 36. Had.

Opij Thebaici

Opobalsami

Cinnamomi

Folij

Zedoariae

Zingiberis

Costi

Corallij rubri

Cassia lignæ

Euphorbij

Tragacanthi

Thuris

Styracis

Nardi Celticæ

Mei

Cardamomi

Sesileos

Napeos, seu semi-

Sarxiphagi Act. ra

dicis saxifragiæ alij

Anethi

Anisi

} Ana drachmam vnam. 18. Had.

nis sinapi. Ei^o loco selino. i. apiū Actua.

Hoc Actuarius omittit.

Xylo

Xylaloës

Rhei Actuarii. Rha barbari &
Rhei Pontici Arnaldus.

Luphiæ cōpositæ Actua. Aliptæ
moscata, quod idē est, alij.

Castorij

Spicæ nardi

Galangæ Act. & cæteri.

Opopanacts

Anacardij

Mastiches

Sulfuris viui, omnes.

Pœoniæ radicis

Eryngij

Rosarum. Actuar. omittit.

Thymi

Acori

Pulegij. Eius loco habet Actua-
rius Halicacabi.

Aristolochiæ longæ Actuarius
vtriusque alij.

Gentianæ

Corticis radicis mandragoræ

Chamædryos

Phu. Act. radicis Valerianæ alij.

Baccarum lauri

Dauci Cretici

Ameos

Macropiperis

Leucopiperis, oēs præter Actua.

Xylobalsami

Carui, omittit Act.

Amomi

Petroselinii seminis

Libystici seminis, Act. leuistici

Seminis rutæ (alij.)

Seminis sinonis. Eius loco hyf
sopi habet Actuarius, & addit
electri, id est, succini

Ana exagium dimidium,
Actua. drach. dimidium,
sed drach. vnam & dimi-
diam, Arnaldus.

Auri

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Auri | } | { | Limaturæ | } | Ana exagia duo & dimidium, Actuarij: alij singulorum gra na quatuordecim tantum. |
| Argenti | | | tenuissimæ | | |
| Margaritarum, Act. ambarum | } | { | margaritarū non pertu- farum & pertusarū alij. | | |
| βράττον, Act. i. onychis | | | | | |
| Osis cordis ceruini | } | { | | | |
| Eboris | | | | | |
| Calami odorati | } | { | Ana ℥. 5. seu drach. sex, Actuar. alij tantum | | } |
| Pyretri | | | grana nouem vel octo. | | |
| Mellis quātitatem sufficientem: mellis despumati libras tres, Arnald. Mel racet Act. | | | | | |

Hæc antidotus aurea, vel ab auro quod recipit, vel à pretio & virium præstantia dicitur. Cuius autem Alexandri an Philosophi an Medici, vel alterius, compertum non habeo.

Efficax est contra defluxiones capitis frigore conceptas, oculorum lacrymas exsiccat, dentium dolores lenit, & capitis omnes cruciatus à frigido vel humido illita fronti. Comitiales, insanos, vertiginosos, paralyticos, apoplecticos, mulcet. Tabidis, tussiculosis, asthmaticis, sanguinem screantibus, cardiacis, ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuriæ, stranguriæ, ischuriæ præsentem est auxilio. Calculos renum & vesicæ comminuit. Quotidianis & tertianis febribus circa accessions initium cū decocto stœchados eximie medetur. Has eius vires ab Actuario celebratas fusiùs explicat Arnaldus in lib. de antidotis: sed si ad Mithridation & Theriacen spectes, vsu plurimo maiorum nostrorum probatissimas antidotos, & omnia hæc ac multò plura felicissimè præstātes, nihil est, quod Arabum Auream, Hadrianum, &c. antidotos laudes.

Initio, stupefacit vt theriace, inueterata, coctis simul omnibus calida euadit, affectibus ob id frigidis, salutaris hæc aurea. Aurum, argentum, ebur album tenuissimè limatum vult Arnaldus, Balsamum melle modico dissolutum miscetur.

Dosis est quantitas auellanæ.

Adscripseram quoque his alias antidotos διὰ νόσων βαρύνων, διὰ μύσχου, διὰ ρομάτων, διὰ νομίστων, διὰ μαγγάρεως, διὰ ἄνδρων, διὰ ἀνὰ γαστρίδος, arteriacas, thoracicas, stomachicas, catharticas, hieras, trypheras, & alias reliquas vsurpari hodie consuetas.

Catapo

Catapotia quoque mitiora, valentiora, mediocria. Throchiscos item atque condita & syrupos, in quibus fumendorum materia ferè continetur. Sed cùm mihi Mesuæ antidotarium esset in manibus, plurimæque iam dictorum ex Mesuæ ipso descripsissem, æquius putavi ea omnia ad Mesuem referre, ne dictum dicerem.

DE SVCCIS MELLE AVT SAC-
CHARO CONDITIS.

QUoniam facilius est impleri potu quàm cibo, tam sanis quàm ægris, & potus ob liquiditatem linguam promptius & altius afficit, ac os ventriculi cæterasque partes, quas celeriter permeat, maxime foliciti fuerunt maiores nostri de potu ægris iucundo & salubri: partim ad sitim extinguendam & partes principes roborandas: partim ad liberandas obstructions, finiendamque alterando putredinem: partim ad tenuandum crassa excrementa, incidendum, & tergendum lenta: partim ad ea vi naturæ iam secreta vacuandum per vrinas aut sudores, interim per vomitum & deiectionem, si præsertim eo natura vergebat. Quam rem indicant potio ptisanæ, vinum ex aqua, hydromeli, oxymeli Hippocratis, lib. 3. rat. vi etus in morbis acutis. Idem declarat Galenus suo oxymelite in sanitate tuenda, & methodo medendi, & suo hydromelite, cui interdum ad crassa tenuandum, & lenta incidendum, tergendum, vt promptius purgaretur, incoquebat hyssopum vel thymum, vel pulegium, vel calaminthen, vel origanum, vel saturæam, vel aliquam ex his similibus. Idem Oribasijs, Aëtij, Pauli. Tralliani, *ἡδὲ καὶ ὁφέλιμα, πόματα, πρὸς πόματα ἀποζυματα*, id est, suaues, vtilis potiones, propinationes, deferuefacta ex herbis vel radicibus, & decocta moluntur. Idem Actuarius potiones febricitantium inscriptæ. Idem recentiorum præcipuè Arabum promittunt, & præstant syrupi, vel quasi ex Syria delati primùm *δρωί*, id est, succi conditi, vt Hermolaus videtur, vel *συροῦντες δρωί*, id est, trahentes succi, quanquam pauci facultate trahendi sint præditi: vel corrupto nomine pro *σύνσωσι*, vel pro *σιγάωσι*, qua voce Actuarius & Simeon vtuntur. De quibus & aliis ægrorum potionibus cur hic fusiùs non scribam, paulò antè docui: mihi nunc satis est, pauca quædam stomatica & stomachica ex Galeno adscribere, quæ
syrupo

*Aph. 24. lib. 1.
& lib. quos
purgare oportet.*

sympliciorum typus quidam fuerint.

Lib. 8. c. ph. p. Diacydoni^ω Galeni appetētiā languentem excitat, cōtentionem ciborum iuuat, iecur & ventrē totum roborat, ventriculi dispositiones propē omnes, exceptis quæ ab æstu vehementi fiunt, modicē iuuat. Recipit carnis malorum cydoniorum, mellis, aceti albi, ana lib. tres. Piperis, zingiberis ana vnc. tres. Petroselini Macedonici vnc. vnam. Paulò aliter in fine lib. 6. saniti. tuendæ. Succī malorum cotoneorum, struthiorum (quæ maiora sunt & dulciora) mellis boni Attici ana sextarios Romanos duos, aceti sextariū vnum & semissem, aut si abundē sit acre, satis est sextarius vnus. Vbi modicē super prunas coxeris ad mellis Attici spissitudinem, & despumaueris, adde zingiberis vnc. tres, piperis albi vnc. duas. vnc. j. lib. 8. f. partes: deinde igni simili recoques, ad mellis crassitudinem. Si id astringere magis voles, fac ex cotoneorū succo. In calido autem ventriculo aut bilioso aufer piper & zingiber: in frigido & pituitoso zingiberis vnc. quatuor, piperis vnc. tres, vel duas & dimidiam. In mediis temperamentis dimidium misce. i. zingiberis vnc. vnam & semis, piperis vnc. vnam, lib. 6. saniti. tuend. vnum aut duo cochlearia sunt danda, lib. 8. meth.

Diacydonion medicamentosius est apud Nicolaum tale.

Carnis cydoniorum excorticatorum, exenteratorum, in aqua elixorum lib. tres tere, cerne: deinde in mellis despumati lib. quatuor & semisse coque, semper mouendo rudicula, donec crassescat, nec digitos inquinet. Ab igne deposito misce paulatim rudicula semper ducendo cinnamomi vnc. vnā & semiss. zingiberis vnc. vnā, piperis, galangæ ana semunc. caryophyllorū, nucis moschatæ ana drach. tres, spicæ nardi, xylaloës, macis, cardamomi ana drach. duas, zeduaris drach. vnam. Est apud Mesuen eius descriptio triplex inusitata. Dia cydoni^ω ^{μύλον}, catharticum Alexander ad podagrā describit. Hodie succum & carnem cydoniorum saccharo condimus sine aromatibus, ad mensæ dona secundæ præcipuum, & aluum cohibendum.

Nicolaus ex succi mororum hortensium lib. semiss. succi batinorum libra vna, mellis lib. semiss. sapæ vnc. trib. coquit donec marmori affusum ipsi inhæreat, & digito tactum parum sequatur, mox in se resiliat, ad palati excoriationes, ardorem

rem faucium & gulæ, ac initium synanches.

Mesues amborum mororum succi ana lib. i. semiss. & sapæ & mellis ana lib. vnam, coquit ad mellis spissitudinem. Compositius fit addendo aluminis, myrrhæ, croci, omphacii ana, si opus est. Succus per se initio est efficacior, etiam aliis astringentibus, rho, balauftio, rosis: mistus post principium cum melle est melior succus.

Dia moron Galeni stomaticum seu ad partes oris inflammatas dum affluit materia. Succi mororum libras quinque coque per se ad sordium consistentiam, postea cum mellis libra vna. Id medium est, ac plurimis admodum placet, ut neque de mellis dulcedine, nec de succi austeritate conquerantur. Salubre initio phlegmonarum oris: quas si valentius vis repellere, succi rhois vel omphacii vnc. vnam, vel duas, vel tres toti symmetriæ miscebis, vel florem rosarum, vel rosas ipsas, balauftium, cytinum, malicorium, gallam immaturam, piceæ aut thuris corticem, succum hypocistidis, aut lentiscai, & alia astringentia non corrupticia, qualia sunt misy, fori, chalcitis, chalcanthum: nisi quod huius drachma vna toti medicamento miscetur, vbi in ore, gula, stomacho, ventriculo ulcerosa est dispositio: plus autem chalcanthi ad vlcus malignum & putridum distarum partium. Vbi autem constitit fluxio, misce toti compositioni croci, myrrhæ ana sesquidrachmam ad phlegmonem coquendam. Crocus enim astringendo myrrham multo se tenuiorem & calidiorem intrò in altum impellit, vbi succos tenuat, & à croco foras citius efferri prohibita digerit. Addit Andromachus croci, myrrhæ, aluminis scissi ana drach. vnam, alii huius drach. duas. Idem probè addit glycyrrhizæ drach. viginti, quæ asperitatem ex austeris ori innatam mitiget. Eiusdem succus stomaticis omnibus antidotis mistus præstantiores eas reddit. Coquant eandem gargarismata ex ficis pinguibus, ex mulsâ aquosa, ex calêti sapa, oleo lentiscino in vase duplici calfacto, vel ex aqua calente. Coquentibus autem his in statu vtendum, in declinatione valenter digerentibus.

Cocta phlegmone vel etiam scirrhusa digerens aliquid toti medicamento incoque, ut nitri vel spumæ nitri vnc. β. vel sulfuris viui sextantem, vel sapa, cui incoctum sit origanum, hyssopum, pulegium, saturæa, thymus, calamintha sylvestris

A

& dom

*Lib. 6. c. pl. p.
Heras etiã suc-
cũ per se præ-
coquit, statim
cum melle.
Sapã ne adde-
cum Arabibus
diamoro, etiã
falsò astringat
sapa Dioscori-
di: nec additur
à Gal. Aëtio,
Paulo, Trallia-
no.*

& domestica, seu mentha odorata, quam à grato odore Græci veteres hedyosmon vocarunt. Medium facultate hoc remedium mediocribus phlegmonis & maiorum statui confert. Crocus autem & myrrha, & si qua alia aromata miscenda sint, adde in fine coctionis, & cum ab igne es medicamentum sublaturus, agitando, donec omnia pulchrè cogan-
tur. Nam largior ipforum coctio vires eis adimit.

Multiplex igitur est diamori compositio, quia affectus per tempora varius est, cui medetur, & ob id quòd non omnes eadem miltionis inensura delectat.

Diabatinon, id est, ex succo mororum bati seu rubi est valentius diamoro, infirmius diacaryo. Ob id Mesues & Nicolaus ambos succos miscent, succi mororū domesticorū lib.β. succi mororū batinorū lib. vnam, mellis lib.β. sapæ vnc tres.

Si verò simplicem illam habeat medicus, sufficit in omne tempus phlegmones, additis tunc quæ vnumquodque postulare videbitur. Multiplex etiam est Alexandro: cui etiam & Actuarius diacaryon describitur, sed Galenum sequimur.

Dia *ναγύωρ* stomaticon suaue, paratu facillimum, omnium efficacissimum ad oris phlegmonas ob essentiae tenuitatem, Galeno inuentum & consuetissimum.

Cortices exteriores nucum virentium & vigentium finita ætate tere in pila, succum per linteum cola, cum melle coque, despumando ad melleam crassitiem: hoc in partes quatuor diuide, vt Galenus semper diuisit, primam serua synceram, pueris, mulieribus, viris delicatis vtendam, ob eius dulcedinem. Id etiam solum mediocres phlegmonas interdum persanat celerrimè. Secundæ parti astringentium aliquid misce, ad repellendum affluentem adhuc initio phlegmones sanguinem. Tertiæ croci & myrrhæ portionē ad coquendum vigenrem iam phlegmonem, cum scilicet fluxio cessauerit. Quartæ sulfur viuum, aut nitrum, & acria quædam ad digerendum, quod ex humore phlegmonē faciente fuerit impactū: quoniam ea quæ affluerunt, vacationē postulant.

Cum autem pauper medicus has quatuor compositiones propter sumptum parare nequeat, nec qui iter agit, has secum circumferre, satius est facere compositionem vnam mediam, ex succo mole aut mēsurā quintuplo ad mel, quale diamoron fecimus, & tempore vtendi pro varia indicatione à morbi

morbi tempore, & ægri natura hæc prædicta adiungere.

Similia his stomatica sunt, sed viribus inferiora *Διὰ γλύν-*
πιν, id est, ex musto & sapa, *Διὰ ροίον*, id est, ex granatorum
 succo, *Διὰ ἀχράδων*, id est ex pyris sylvestribus, *Διὰ μέλων*, id
 est, ex cydoniis. Et ex cestianis, mespilis, cornis, & aliis fructi-
 bus astringentibus tritis, pressis, residendo depuratis, colatis,
 cum melle coctis. Sunt autem hæc omnia non modò sto-
 matica, sed etiam stomachica & eustomacha, id est, quæ de-
 glutita iuuant stomachum. Diacarion autē caco stomachum
 est, ac stomacho noxium, plurimo melle eget: post id Diaba-
 rinon, Diamoron, sed *Διὰ μέλων*, *Διὰ ροίον*, *Διὰ ἀχράδων* parcio-
 re. In horum medio est succus mespilorum, cornorum, bra-
 byl^ω, prunorum. Succo igitur cydoniorū & pyrorum syl-
 uestrium, & plurimorum fructuum misce æqualem mellis
 portionem. Succus autem astringentium insigniter, vt cor-
 norum duplicatum, & interdum triplicatum mel requirit,
 Gal. lib. 6. & 8. comp. phar. part.

Διὰ γλύνπιν fit ex mensura quavis musti austeri, quod ex
 uvis amineis postremum fluxerit (nam quod primum fluxit,
 est liquidius & aquosius) & melle, additis his, quæ diamoro
 & diacaryo misceri posse diximus astringentibus, coquenti-
 bus, digerentibus eadem proportionem. *Διὰ γλύνπιν* Critonis
 etiam ad aurium & sedis vitia utilis compositio est, Gal. lib.
 6. c. ph. p. Si autem ex musto dulci fiat, mitigat quidem, sed
 minus repellit: ex musto autem austeri & dulcis medio, vim
 mediam obtinet. Coquit id Andromachus ad quartæ partis
 consumptionem: alii ad melleam crassitiem, deinde colant,
 & mel simul coquunt, præsertim vbi succus est liquidior: vbi
 verò crassus, mel ei statim coctionis initio miscent: & valet
 phlegmonarum oris initio, incremento, & statui: ad declina-
 tionem verò tedas pingues tufas incoque. Si sumptuosius vis
 medicamentum aliquod ex his, adde casia corticem, vel nar-
 dum Indicam, vel folium malabathri, vel singulorum trium
 ana drachmani vnam vel sesquidrach. pro libra vna mellis. Si
 diuitibus paras, amomum misce quantum crocum, aut myr-
 rham, aut alumen: percolato stomachico mastichen Chiam
 interdum miscuit Galenus. Hæc stomatica vel gargarizan-
 tur, vel illinuntur, vel ore sæpe & diu continentur vel etiam
 horum quædam prædicta deuorantur, & stomachica fiunt.

Stomatice *Ἀνὰ πόινον*, id est, granatis austeris, acidis, dulcibus, maturis & integris æquali portione tritis cum corticibus, coctis cum melle, stomacho resolutis & cibos auerfanti idonea est.

**νιλαυπερίων.* Crito autem aliter granatorum dulcium cum corticibus tritorum & expressorum sextarios sex, mellis boni sextarium vnum coquit ad mellis crassitiem, deinde addit aluminis scissi vnc. vnam, myrrhæ semunciam. Alia eiusdem ad vlcera oris & aphthas, id est, oris pustulas, succi granatorum dulcium heminas sex coque igni lento in vase æreo ad tertias, deinde adde cinnamomi, casia, myrrhæ, ana drachmas vnam, omphacii, croci, nardi Indicæ ana drachmam semissem, mellis heminam. Vtrique suo tempore præstantissima. Paulò diuersius Andromachus apud Galenum stomachicè hanc componit, sed viribus propè iisdem.

Medicamenta stomatica ex succo mororum, batinorum, granatorum, cydoneorum, cornorum, corticum nucum multa, vt vides, medici scripserunt, ponderibus & mensuris variantes: alii enim omnia vel astringentia, vel digerentia, vel vtrique iniiciunt, nonnulli adimunt, alii aliud. Item hi plus illi minus indunt. In quibus considerandum est, quod copiosius est inditum, an astringens ac repellens est, an lenit, & coquit, an digerit: ita nanque licebit ipsis probè vti.

His affines sunt & succi per se siccati sole vel igne, vel cum melle, aut saccharo, aut vtroque cocti:

hiq; tam herbarum quàm fructuum, quos iure meritissimo syrupis multis nulla sæpe ratione compositissimis prætulerimus.

*

F I N I S.

INDEX RERVM

OMNIVM QVAE HOC

OPERE CONTI-

NENTVR.

*



| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
| Bortum prohiben- | di modus | 341 | |
| tia | 107 | Adulteria simplicium à quibus | |
| Abrotanum | 30 | fiunt | 275 |
| Abscessus coquen | Aer quando causa salubris | 192 | |
| tia | 14.100 | Aeromeli | 71 |
| Absinthium | 28 | Aerugo | 92 |
| Absinthij facultas | 237 | Aes vstum | 91 |
| Absinthium Ponticum videtur esse | | Aetites | 99 |
| Romanum Mesues | 29 | Affectus species à quibus indica- | |
| Absinthium nostrum | 29 | tur | 268 |
| Acacia | 73.81 | Affectus parvus, recens, superfi- | |
| Acacia vulgò dicta nullo errore | | ciarius, mitiora postulat medica- | |
| vsurpatur pro veterum | 73 | menta: in contrario, contra | 217 |
| Acantha | 30.47 | Affectibus applicanda medicamen | |
| Acer sapor | 149 | ta equalia viribus | 217 |
| Acerbus sapor | 148 | Affectus quando plures sunt im- | |
| Acetabulum | 332 | plexi, vrgentiori maior vis reme- | |
| Acetum | 70 | diorum in cõposito opponenda | 218 |
| Achorus curantia | 22.51 | Affectus prater naturam quomo- | |
| Acidus sapor | 149 | do facilius pelluntur | 239 |
| Acorus | 13 | Affectus in ore ex fluxione curan | |
| Acorus verus, galanga maior ho- | | tia | 59 |
| die dicitur | 13 | in Affectibus compositis vrgentio- | |
| Acorus palustris | 13 | ris est habenda ratio | 117 |
| Acorus verus vnde aduehatur | 13 | in Affectibus cõpositis eiusdem na- | |
| Arorus videtur quibusdam cala- | | turae minus necesse est composito | |
| mus aromaticus | 13 | medicamento vti | 118 |
| Actiones secundas et tertias ex pri- | | Agallochum | 63 |
| mis et simplicibus colligimus | 141 | Agaricus | 13 |
| Adeps omnis | 102 | Agarici facultas | 14 |
| Adiantum | 30 | Agarici dosi | 14.234 |
| Ad. i. q. | 54 | Agaricus dictus ab Agaricia Sar- | |
| Admouendorum varius applican- | | matia regione | 14 |
| | | A 3 | Agat |

I N D E X.

| | | | |
|---|-------------|---|----------|
| <i>Agaricus quomodo corrigitur</i> | 14 | <i>Amygdala</i> | 93 |
| <i>Agaricus ſervatur quinque annis</i> | | <i>Anacardus</i> | 53 |
| 14 | | <i>Anaſarce auxiliatur</i> | 165 |
| ἀγγέρον δάκρυον | 320 | <i>Anaſtomaticum quod</i> | 143 |
| Αγνϙ | 30 | <i>Anethum</i> | 31 |
| <i>Agrimonia</i> | 33 | <i>Angius que profunt</i> | 42. 107. |
| <i>Allium magnetis vim obtundit</i> | | 162 | |
| 161 | | <i>Animalia & eorum partes</i> | 100 |
| <i>Aloë</i> | 73 | <i>Aniſi ſemen</i> | 47 |
| <i>Aloë's doſis</i> | 234 | <i>Anodynum quod</i> | 145 |
| <i>Alopecie quomodo admonetur me-</i> | | <i>Anthera</i> | 44 |
| <i>dicamenta</i> | 267 | <i>Αντιβαλλόμενα ſimplicia ordine</i> | |
| <i>Alopeciam difficilem quomodo cu-</i> | | <i>alphabeti</i> | 286 |
| <i>ramus</i> | 192 | <i>Antidoton quid</i> | 342 |
| <i>Alopecius ſanantia</i> | 44. 76. 99. | <i>Antidotus Eſdræ</i> | 363 |
| 102. 161. & 211. 259 | | <i>Antidota ante ſine poſt delceteria</i> | |
| <i>Alphos ſanantia</i> | 19. 26. 44. | <i>quomodo ſumenda</i> | 237 |
| 48. 97 | | <i>Apiatrum</i> | 36 |
| <i>Alterci ſuccus</i> | 72 | <i>Apium ſatiuum</i> | 14 |
| <i>Althæa</i> | 14 | <i>Apium vulgare eſt Eleoſelinon</i> | 15 |
| <i>Althææ facultas</i> | 14 | <i>Apiorum genera omnia idem pol-</i> | |
| <i>Althæa vnde dicatur</i> | 14 | <i>lent</i> | 15 |
| <i>Alumen</i> | 95 | <i>Aphthas curantia</i> | 59 |
| <i>Aluum emollientia</i> | 30 | <i>Appetitum excitantia</i> | 17. 54. |
| <i>Aluum ſubducentia</i> | 60. 73. | 82. 368 | |
| 80. 95 | | <i>Arabiſtarum componendi medica-</i> | |
| <i>Alyſſos</i> | 31 | <i>menta ratio damnatur</i> | 112 |
| <i>Amaracus</i> | 36 | <i>Arancium malum</i> | 56 |
| <i>Amaracinum vnguentum</i> | 35 | <i>Argentum</i> | 88 |
| <i>Amaracinum vnguentū diverſum</i> | | <i>Argentum vivum</i> | 88 |
| <i>à ſampſychino</i> | 36 | <i>Ari radix</i> | 35 |
| <i>Amarus ſapor</i> | 149 | <i>Ari maſculi ſuccus</i> | 72 |
| <i>Ambroſia antidotus</i> | 363 | <i>Ariſtolochia</i> | 15 |
| <i>Ameos ſemen</i> | 47 | <i>Ariſtolochie triplex radicis figura</i> | |
| <i>Amianthus lapis</i> | 99 | <i>Gal. diſtincta</i> | 15 |
| <i>Amomum</i> | 46 | <i>Ariſtolochia quādo effodienda, &</i> | |
| Αμωρ | 86 | <i>quomodo ſervanda</i> | 15 |
| Αμωλ & λυμν | 16 | <i>Armenia terra</i> | 100 |
| <i>Amphisbena</i> | 161 | <i>Armenius lapis</i> | 97 |
| <i>Amphora</i> | 330 | <i>Arnogloſſian</i> | 37 |
| | | <i>Atom</i> | |

I N D E X.

| | | | |
|---|---------|---|-------------|
| <i>Aromata que sunt</i> | 108 | <i>Auribus purulentis conuenientia</i> | |
| <i>Aromatica medicamenta</i> | 64 | 40.165 | |
| <i>Aromata tenuis essentia facillè exa-</i> | | <i>Auribus quomodo medicamēta in-</i> | |
| <i>nimantur</i> | 108 | <i>funduntur</i> | 259 |
| <i>Aromata sunt miscenda ad finem</i> | | <i>Aurium dolorem sedantia</i> | 162. |
| <i>coctionis</i> | 211 | 259 | |
| <i>Arrhenicon</i> | 90 | <i>Aurum</i> | 88 |
| <i>Arthritis in plethorico corpore quo</i> | | <i>Austerus sapor</i> | 149 |
| <i>modo curanda</i> | 257 | <i>Autoris ratio in vtendis nomini-</i> | |
| <i>Arthritica</i> | 155.165 | <i>bus medicamentorum, & ponde-</i> | |
| <i>Arthriticis quæ prosunt</i> | 21.102 | <i>rum scribendis</i> | 339 |
| <i>Asarum</i> | 16 | B | |
| <i>Asarum quando fodienda</i> | 16 | <i>Balanus myrepfica</i> | 17.53 |
| <i>Aselli</i> | 106 | <i>Balaustium</i> | 41 |
| <i>Asparagus</i> | 16 | <i>Balsamum</i> | 57 |
| <i>Asparagus Regius & Helius</i> | 16 | <i>Basiliscus</i> | 161 |
| <i>Asparagus Petreus</i> | 16 | <i>Βασιδιοναγωδς</i> | 48 |
| <i>Asperæ arteriæ affectus & la-</i> | | <i>Basis medicamenti quomodo deli-</i> | |
| <i>ryngis quomodo curantur</i> | 261 | <i>gatur</i> | 176 |
| <i>Asperitates arteriæ lenientia</i> | 20. | <i>Basis & radix medicamenti quid</i> | |
| 82.87. | | 177 | |
| <i>Asphaltos</i> | 100 | <i>Basis vt rectè constituitur quid</i> | |
| <i>Asphodelus</i> | 16 | <i>sciendum</i> | 177 |
| <i>Asphodelus autumnio legitur</i> | 16 | <i>Basis ipsius coctio, assatio, tritura,</i> | |
| <i>Asphodelus muribus venenum ibid.</i> | | <i>vsctio, lotio, & c. etiam rationem</i> | |
| <i>Assando quomodo medicamēta pre-</i> | | <i>Sine quo obtinent</i> | 198 |
| <i>parantur</i> | 299 | <i>Basi adduntur quæ toti parti sunt</i> | |
| <i>Asthmaticis quæ prosunt</i> | 48.82. | <i>familiaria</i> | 195 |
| 104.106 | | <i>Basi adduntur quæ ipsam in partes</i> | |
| <i>Asthmaticis quæ obsunt</i> | 50 | <i>remotissimæ conuehant</i> | 195 |
| <i>Astrorum ortum & occasum negli-</i> | | <i>Basis ob quatuor ad particulam ali-</i> | |
| <i>git Galenus in vsu medicamen-</i> | | <i>quam deducitur</i> | 195 |
| <i>torum</i> | 250 | <i>Basi adduntur quæ ipsam deductā</i> | |
| <i>Astrorum ratio in quibusdam plan-</i> | | <i>ad partem ei affigant</i> | 196 |
| <i>tis colligendis observatur</i> | 12.175 | <i>Basis sine quibus affectum profliga-</i> | |
| <i>Athanasia antidotus</i> | 263 | <i>re non potest</i> | 195 |
| <i>Attrahens quod</i> | 143 | <i>Bases congeneres miscentur, nempe</i> | |
| <i>Aurea Alexandrina antidotus</i> | | <i>mite aliquod vehementi, vt ha-</i> | |
| 364 | | <i>beatyr medium</i> | 179 |
| <i>Aureæ Alexandrinæ vires</i> | 366 | <i>Bases diuersa quare miscentur</i> | 178 |
| | | A 4. | <i>Basi</i> |

I N D E X.

| | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------|-----|
| <i>Basi adduntur medicamenta, quæ in suo vigore consistunt</i> | 197 | C | <i>Abaret Gallorum est Asa-</i> | |
| <i>Basibus admiscenda non solum quæ ipsam ad partem familiarem ducant, sed etiam quæ in ea retineant</i> | 212 | <i>rum</i> | | 16 |
| <i>Bát & id æ &</i> | 61 | <i>Cacochyma quæ</i> | | 147 |
| <i>Bdellium</i> | 85 | <i>Cadmia</i> | | 93 |
| <i>Bechica quæ</i> | 147 | <i>Κάλη &</i> | | 333 |
| <i>Behen</i> | 16 | <i>Calaminthe</i> | | 32 |
| <i>Ben</i> | 53 | <i>Calami aromaticus</i> | | 17 |
| <i>Bersilium lignum</i> | 63 | <i>Calami aromatici electio</i> | | 17 |
| <i>Besamum, Besasa</i> | 38 | <i>Calculos renum confringentia</i> | 26. | |
| <i>Beta</i> | 31 | <i>31. 48. 58. 85. 98</i> | | |
| <i>Betonica</i> | 31 | <i>Calculos frangentia</i> | 17. 20. 30. | |
| <i>Bilem atram purgantia</i> | 53. 62. | <i>82. 83. 100</i> | | |
| <i>97. 158</i> | | <i>Calculos vesicæ diminuentia</i> | 39 | |
| <i>Bilem atram facientia</i> | 70 | <i>Calor quas actiones edat</i> | 126 | |
| <i>Bilem flauam ducentia</i> | 25. 53. 54. | <i>Calx viua</i> | 97 | |
| <i>55. 56. 60. 74. 78</i> | | <i>Cancanum</i> | 82 | |
| <i>Bilis flaua coquenda</i> | 157 | <i>Cancris quæ prosunt</i> | 93. 94. | |
| <i>Bilem vtranque vacuantia</i> | 19. 24. | <i>97</i> | | |
| <i>43. 159</i> | | <i>Cancrorum cinis</i> | 106 | |
| <i>Bilem vtranque & pituitam ducentia</i> | 159 | <i>Caniella nostra quid</i> | 66 | |
| <i>Bilem & pituitam ducentia</i> | 159 | <i>Cantharides</i> | 106. 161 | |
| <i>Biliosis conuenientia</i> | 55. 70 | <i>Caphura</i> | 82 | |
| <i>Biliosis contraria</i> | 71. 74 | <i>Capillos tollentia</i> | 83. 90 | |
| <i>Βλάττ & βύσσαν &</i> | 107 | <i>Capillos reddentia</i> | 30. 54. 76 | |
| <i>Blitum</i> | 31 | <i>Caput quæ roborant</i> | 86 | |
| <i>Borago</i> | 31 | <i>Capitis dolorem facientia</i> | 161 | |
| <i>Bombacis semen</i> | 47 | <i>Capitis dolori ab æstu quæ prosunt</i> | | |
| <i>Branchios sanantia</i> | 85 | <i>190. 253</i> | | |
| <i>Brassica</i> | 31 | <i>Capiti quomodo adiuuemus medicamenta</i> | 252 | |
| <i>Brassicæ succus</i> | 72 | <i>Capiti quales cucuphæ applicentur</i> | | |
| <i>Brassica marina</i> | 31 | <i>252</i> | | |
| <i>Bryoniæ radix</i> | 16 | <i>Capparis radices cortex</i> | 17 | |
| <i>Bubonas coquentia</i> | 101 | <i>Capparis flos & fructus</i> | 17 | |
| <i>Buglossus</i> | 31 | <i>Carbunculos perrumpentia</i> | 40 | |
| <i>Buphthalmi flos</i> | 41 | <i>Cardamum</i> | 48 | |
| | | <i>Cardamomum</i> | 49 | |
| | | <i>Cardiaca</i> | 151 | |
| | | <i>Carduus benedictus</i> | 32 | |
| | | <i>Cari</i> | | |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| Cari semen | 48 | Calcanthus | 92 |
| Carice | 58 | Chalcitis | 92 |
| Carpesium | 57 | Χαλκοῦς | 322 |
| Carpobalsamum | 56 | Χαμαῖάτ | 61 |
| Καρυοβασιλικόν | 59 | Chamedrys | 33 |
| Caryophyllum | 41 | Chamepitys | 33 |
| Casia | 66 | Chermes | 107 |
| Cassia fistula | 57 | Χήμη | 335 |
| Cassie fistula dosis | 236 | Chæradas sanantia | 17.51.78 |
| Castorium | 104 | Χοϊνίξ | 336 |
| Catharrhos sanantia | 51.85. | Cholagoga | 158 |
| 100 | | Chondrilla | 32 |
| Cathartica quæ | 146 | Χοῦς | 334 |
| Catharetica quæ | 145 | Χρυσοβάλαν | 54 |
| Catharetica quomodo adhibenda | | Chrysocolla | 96 |
| 256 | | Χυλὸς | 68 |
| Cautistica | 31.48.77.79. | Χυλὸς ῥό | 72 |
| 90 | | Χυλὸς δ'αἰνυοῦ, ὡς Græcis con- | |
| Cautistica quomodo adhibenda | | funduntur | 75 |
| 256 | | Cicatricem quæ inducunt | 91 |
| Κεχρῆμιδες | 46 | Cichorium | 32 |
| Centaurij magni radix | 17 | Cicuta | 33 |
| Centaurium minus | 17 | Cimoliaterra | 99 |
| Cephalica | 149 | Cinnamomum | 65 |
| Cephalalgicis prosunt | 18.40.54. | Cinnamomi atlas | 65 |
| 86.106 | | Cinus hirundinum | 107 |
| Cera | 72 | Cinnabaris | 101 |
| Cera liquabilibus vt materia mi- | | Cirsium | 32 |
| scetur | 210 | Citrago | 36 |
| Κεράμιον | 333 | Citrum | 56 |
| Cerasi gummi | 82 | Clarificatio succorum quomodo fit | |
| Cerati Galeni vsus | 264 | 295 | |
| Cerebella passerum | 102 | Clyster largior siue parciior quibus | |
| Cerebrum roborantia | 20.76 | infunditur | 253 |
| Cerebri menyngum vulnera glutin- | | Cnici semen | 49 |
| antia | 33 | Cnici seminis dosis | 235 |
| Cerussa | 94 | Coccali | 55 |
| Cessatio à vacuationibus alijs cau- | | Κόκκ | 15 |
| sa est saepe per accidens huius vel | | Coccus baphica | 49 |
| huius vacuationis | 198 | Χοχλιάριον | 335.336 |

I N D E X.

| | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------|-----|
| <i>Basi adduntur medicamenta, quæ in suo vigore consistunt</i> | 197 | C | <i>Abaret Gallorum est Asa-</i> | |
| <i>Basibus admiscenda non solum quæ ipsam ad partem familiarem du-</i> | | <i>rum</i> | | 16 |
| <i>cant, sed etiam quæ in ea reti-</i> | | <i>Cacochyma quæ</i> | | 147 |
| <i>neant</i> | 212 | <i>Cadmia</i> | | 93 |
| <i>Βάτ & ἰδῶν</i> | 61 | <i>Κάλ</i> | | 333 |
| <i>Bdellium</i> | 85 | <i>Calaminthe</i> | | 32 |
| <i>Beechica quæ</i> | 147 | <i>Calamus aromaticus</i> | | 17 |
| <i>Behen</i> | 16 | <i>Calami aromatici electio</i> | | 17 |
| <i>Ben</i> | 53 | <i>Calculos renium confringentia</i> | 26. | |
| <i>Bersilium lignum</i> | 63 | <i>31. 48. 58. 85. 98</i> | | |
| <i>Besanium, Besasa</i> | 38 | <i>Calculos frangentia</i> | 17. 20. 30. | |
| <i>Beta</i> | 31 | <i>82. 83. 100</i> | | |
| <i>Betonica</i> | 31 | <i>Calculos vesicæ diminuentia</i> | 39 | |
| <i>Bilem atram purgantia</i> | 53. 62. | <i>Calor quas actiones edat</i> | 126 | |
| <i>97. 158</i> | | <i>Calx viua</i> | 97 | |
| <i>Bilem atram facientia</i> | 70 | <i>Cancanum</i> | 82 | |
| <i>Bilem flauam ducentia</i> | 25. 53. 54. | <i>Cancer quæ prosunt</i> | 93. 94. | |
| <i>55. 56. 60. 74. 78</i> | | <i>97</i> | | |
| <i>Bilis flaua coquenda</i> | 157 | <i>Cancrorum cinis</i> | 106 | |
| <i>Bilem vtranque vacuantia</i> | 19. 24. | <i>Canella nostra quid</i> | 66 | |
| <i>43. 159</i> | | <i>Cantharides</i> | 106. 161 | |
| <i>Bilem vtranque & pituitam du-</i> | | <i>Caphura</i> | 82 | |
| <i>centia</i> | 159 | <i>Capillos tollentia</i> | 83. 90 | |
| <i>Bilem & pituitam ducentia</i> | 159 | <i>Capillos reddentia</i> | 30. 54. 76 | |
| <i>Biliosis conuenientia</i> | 55. 70 | <i>Caput quæ roborant</i> | 86 | |
| <i>Biliosis contraria</i> | 71. 74 | <i>Capitis dolorem facientia</i> | 161 | |
| <i>Βλάτ & βύαντ</i> | 107 | <i>Capitis dolori ab æstu quæ prosunt</i> | | |
| <i>Blitum</i> | 31 | <i>190. 253</i> | | |
| <i>Borago</i> | 31 | <i>Capiti quomodo admouemus medi-</i> | | |
| <i>Bombacis semen</i> | 47 | <i>camenta</i> | 252 | |
| <i>Branchos sanantia</i> | 85 | <i>Capiti quales cucuphæ applicentur</i> | | |
| <i>Brassica</i> | 31 | <i>252</i> | | |
| <i>Brassicæ succus</i> | 72 | <i>Capparis radici cortex</i> | 17 | |
| <i>Brassica marina</i> | 31 | <i>Capparis flos & fructus</i> | 17 | |
| <i>Bryonie radix</i> | 16 | <i>Carbunculos perrumpentia</i> | 40 | |
| <i>Bubonas coquentia</i> | 101 | <i>Cardamum</i> | 48 | |
| <i>Buglossus</i> | 31 | <i>Cardamomum</i> | 49 | |
| <i>Buphthalmi flos</i> | 41 | <i>Cardicca</i> | 151 | |
| | | <i>Carduus benedictus</i> | 32 | |
| | | <i>Cari</i> | | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| Cari semen | 48 | Calcanthus | 92 |
| Caricæ | 58 | Chalcitis | 92 |
| Carpesium | 57 | Χαλκοῦς | 322 |
| Carpobalsamum | 56 | Χαμαίβατον | 62 |
| Κάρυον βασιλικόν | 59 | Chamedrys | 33 |
| Caryophyllum | 41 | Chamaepitys | 33 |
| Casia | 66 | Chermes | 107 |
| Cassia fistula | 57 | Χήμα | 335 |
| Cassie fistula dosis | 236 | Chæradas sanantia | 17.51.78 |
| Castorium | 104 | Χοϊνίξ | 336 |
| Catharticos sanantia | 51.85. | Cholagoga | 158 |
| 100 | | Chondrilla | 32 |
| Cathartica quæ | 146 | Χοῦς | 334 |
| Cathartica quæ | 145 | Χρυσοβάλαν | 54 |
| Cathartica quomodo adhibenda | | Chrysocolla | 96 |
| 256 | | Χυλὸς | 68 |
| Cautistica | 31.48.77.79. | Χυλὸς ῥόδου Ponticæ | 72 |
| 90 | | Χυλὸς δάκτυλον ὁπὸς Græcis con- | |
| Cautistica quomodo adhibenda | | funduntur | 75 |
| 256 | | Cicatricem quæ inducunt | 91 |
| Κιχράμιδες | 46 | Cichorium | 32 |
| Centaurij magni radix | 17 | Cicuta | 33 |
| Centaurium minus | 17 | Cimolia terra | 99 |
| Cephalica | 149 | Cinnamomum | 65 |
| Cephalalgicis prosunt | 18.40.54. | Cinnamomi atlas | 65 |
| 86.106 | | Cinis hirundinum | 107 |
| Cera | 72 | Cinnabaris | 101 |
| Cera liquabilibus vt materia mi- | | Cirsium | 32 |
| scetur | 210 | Citrargo | 36 |
| Κεράμιον | 333 | Citrium | 56 |
| Cerasi gummi | 82 | Clarificatio succorum quomodo fit | |
| Cerati Galeni vsus | 264 | 295 | |
| Cerebella passerian | 102 | Clyster largior siue parciior quibus | |
| Cerebrum roborantia | 20.76 | infunditur | 253 |
| Cerebri menyngum vulnera glut- | | Cnici semen | 49 |
| nantia | 33 | Cnici seminis dosis | 235 |
| Cerussa | 94 | Coccali | 55 |
| Cessatio à vacationibus alijs cau- | | Κόκκον Orientis | 15 |
| sa est sape per accidens huius vel | | Coccus baphica | 49 |
| huius vacationis | 198 | Χοχλιάζωρ | 335-336 |

INDEX.

| | | | |
|---|-----------|---|--------------|
| Coctio propriè quid | 145 | Compositi forma ad quid utilis | |
| Coctionis signa unde sumantur | | | 224 |
| 157 | | Compositi forma variatur interdum, ut sit efficacius medicamentum | 225 |
| Coctio expellendorum humorum abusu suè apud practicos dicitur | 156 | Compositi forma ad quos scopos constituitur | 225 |
| Coctionem iuvantia | 20.54.67. | Compositorum vires tempore mutantur | 232 |
| 368 | | Compositionem mediam unam habebit, qui alius parare non potest, aut circumferre | 370 |
| Coctiones medicamentorum quomodo sunt | 296 | Compositiones particulares faciendæ, quæ in nuiiores recipiuntur | 328 |
| Cæliacis quæ prosunt | 64.70 | Congius | 330 |
| 74.101 | | Coni | 55 |
| Κόγχη | 335 | Conservatio medicamentorum | 214 |
| Cognatio quedam est in sonis corporibus sonoris | 167 | Conservationi medicamentorum locus idoneus eligendus | 215 |
| Cognatio quedam inest rebus, naturarumq; similitudo, ob quam alia trahant, alia auerantur | 160. | Conservant omnia quæ siccant, et humiditatem excrementosam absumunt | 215 |
| 161. Ibidem adduntur exempla plurima. | | Consistentia non solum ad gratiam, sed ad melius agendum, facit | 208 |
| Colicum affectum sanantia | 54. | Contraria in compositione quæ dicantur | 178 |
| 164 | | Contraria contrariorum remedia | 120 |
| Colletica quæ | 146 | Convulsioni quæ remedio sunt | 162. |
| Colocynthe | 56 | 165 | |
| Colocynthidis dosis | 235 | Cor roborantia | 41.48.49.86. |
| Color medicamentum gratius reddens | 202 | 103.106.107 | |
| Colorem commendantia | 82 | Cordis palpitationi conferentia | 19. |
| Colophonia | 81 | 20.86 | |
| Communia de proprio cuique medicamentorum usu | 233 | Corallus | 99 |
| Composita medicamenta quæ | 113 | Coriandrum | 48 |
| Composita medicamenta unde nomina sumpserunt | 342 | Cornu cervi et capræ | 103 |
| Composita non cognosci distinctè, nisi simplicia noscantur | 123 | Cornu rhinocerotis | 103 |
| Composita si nobis satisfaciunt, quò simpliciora, eò meliora | 214 | | |
| Composita veterum noscuntur cognita simplicium facultate et qualitate | 125 | | |

Corrus

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Corruda | 16 | Cystica | 154.164 |
| Cortices | 64 | | |
| Cortices radicum meliores sunt ea- | | D | |
| tum medullis | 174 | D Asypodium | 43 |
| Coryzæ sanantia | 85 | Daucus | 18 |
| Κόρυς & Κοκκίνιον ἰατρικόν | | Deleteria quantitate sola | 85 |
| 320 | | Denarij partes | 328 |
| Costus | 18 | Densans quod | 143 |
| Κότυλη | 334 | Dentes puros efficientia | 98.103 |
| Κότυλη etiam videtur dimidium | | Dentes firmantia | 161.163 |
| sextarij significare | 331.336 | Dentalis lapis | 97 |
| Κουλιός | 330 | Dentientes pucros inuuantia | 101. |
| Crassa & lenta ex pectore ducen- | | | |
| centia | 19.22.24.30.34.40. | | |
| 48.49.52.55. | | Dentium dolori idonea | 40.82 |
| Crassantia | 142 | Destillatio quid, & eius diuersi | |
| Crassos & lentos humores purgan- | | modi | 306 |
| tia | 19.34.38 | Diabatimon | 370 |
| Crocus | 41 | Dia καρπῶν stomachicum | 370 |
| Croci electio | 42 | Diacydonion Galeni | 368 |
| Crocus quomodo seruandus | 42 | Diacydonion Nicolai | ibid. |
| Cretica terra | 99 | Diacydonion quibus detur, & qua | |
| Cruſta facientia | 90.92.97 | mensura | 251 |
| Cubebe | 57 | Diacnici dosis | 237 |
| Cucumeris semen | 48 | Diacodij dosis | ibid. |
| Cucumeris fructus | 56 | Διὰ γλῶκκος & compositio | 371 |
| Cucumeris agrestis radix | 18 | Diamoron Galeni, & eius vsus | |
| Cumini semen | 49 | 369 | |
| Cupressi pilule | 55 | Διὰ πόρων stomachice | 372 |
| Curcuma | 17 | Diarrhoeas sanantia | 35.39 |
| Cyanus | 97 | Dia trion pipereon ad que sumi- | |
| Κύανθ & | 332.333.335. | tur | 251 |
| 336 | | Dictamni radix | 18 |
| Cyclamini radix | 18 | Dictamni radix vulgaris est pseu- | |
| Cydonia | 56 | dodictamni | 18 |
| Cynanchis illuminatur | 18 | Διορισμός quid, & ad que à Gale | |
| Cyperis | 17 | no refertur | 267 |
| Cyperus Indicus | 17 | Diospolitici pulvis quomodo sumi- | |
| Cyperus Babylonicus | 18.20 | tur | 251 |
| Cypheos compositio | 346 | Diphryges | 91 |
| | | Dissoluedo quomodo, & que pre- | |
| | | paramur | 292 |
| | | Διτάν | |

INDEX.

| | | | |
|--|----------|---|--------|
| Διτάλαντον . . . | 322 | ἡμικτύλιον | 334 |
| Diuitibus sumptuosiora remedia | | ἡμίλιτρον | 323 |
| miscemus quàm pauperibus | | ἡμιμναῖα | 322 |
| 193 | | ἡμιούγγιον | 324 |
| Δοῖδύξ | 319 | ἡμιόβολον | 322 |
| Doli & adulteria medicamentorum | 274 | ἡμιτάλαντον | 322 |
| Dolores sedantia | 31.33.86 | Empetris facultas | 237 |
| Doronicum | 19 | Emplastica quæ | 144 |
| Δραχμή | 322 | Emplaston medicamentum | 116 |
| Drachma | 325 | Emplasticum quod | 144 |
| Drachmæ partes | 324 | Emplastrum diachalciteos quomodo componendum, & eius usus | |
| Dracunculi radix | 19 | 263 | |
| Ducere pistillo medicamenta quid | | Endiuiæ | 32 |
| 313 | | Enterocælis sanantia | 56.98 |
| Duella | 324 | Epicerastica quæ | 147 |
| Dulcis sapor | 149 | Epilepsiam excitantia | 106 |
| Dupondius | 324 | Epilepsiam curantia | 24.31. |
| Durum | 142 | 51.82.102.161.165. | |
| Durum, molle quotupliciter dicatur corpus | Ibidem | Epilepsiam ex atra bile curantia | 97 |
| Durum corpus, id est, se ipso dum sanum erat, durius, quot modis fiat, & quomodo mollescat | Ibidem | Epithymum | 42 |
| Ibidem | | Epithymi dosis | 235 |
| Dysenterijs conferentia | 25.35. | ἑψήμα | 69 |
| 37.39.40. 43.64. 74.100.101.103. 162.163. | | Epuloticum quod | 146 |
| | | Epyssopium | 42 |
| | | Eranius lapillus | 99 |
| | | Errhina | 18.31. |
| | | Erica | 42 |
| E | | Eruca | 49 |
| Ebrietatem facientia | 86 | Eruum | 49 |
| Ebrietati resistentia | 161 | Erysimi semen | Ibidem |
| Ebur | 103 | Eryngij radix | 19 |
| Eccartharticum quod | 144 | Escharoticum quod | 145 |
| Ecphrastica quæ | Ibidem | Esula | 19 |
| Ecstatica quæ | 147 | Euchyma quæ | 147 |
| Elaterium | 18.74 | Eufragia | 34 |
| Elenij radix | 19 | Eupatorios herba | 163 |
| Elephantiam curantia | 97.165 | Eupatorium | 33 |
| Elleborus duplex | 19 | Eupatorium etiam Pentaphyllum | |
| ἡμιχοίνικον | 336 | dicitur Galeno | 34 |
| | | Euphor | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| Ephorbium | 77 | Fluxionum in inguina, pedes, arti- | |
| Euphrosynon Græcis Buglossus di- | | culos &c. et phlegmonarum in- | |
| citur | 31 | cipientium remedium | 94 |
| Exasperantia quæ | 147 | Fœcunditatem facientia | 38.102 |
| F | | Fœniculus | 19 |
| Faba Græca | 330 | Fœnunigræcan | 49 |
| Facultas prima medicamenti | | Foliatum vnguentum | 35 |
| est reliquarum veluti basis com- | | Fomenta ventriculo quomodo im- | |
| munis | 123 | ponenda | 265 |
| Facultatibus primis noscendis quid | | Frigida calidis obtundimus | 117 |
| satis fuerit | Ibidem | Frigus quis actiones edat | 133 |
| Facultas secunda quæ | 125 | & deinde. | |
| Facultates simplicium corrumpi in | | Fructus quid | 52 |
| compositione quibusdam visum | | Fructus plantarum quomodo deli- | |
| est | 232 | gendi | 174 |
| Facultates particulares à partibus | | Fumaria | 34 |
| vocate | 148 | Furfures emendantia | 22 |
| Facultates particulares quatenus | | G | |
| singulis partis affectibus conue- | | G Agates | 98 |
| niant | 149 | G Gaiacum lignum | 63 |
| Febres biliosas sanantia ex densi- | | 165 | |
| tate cutis | 41 | Galanga | 20 |
| Februm omnium vnicum reme- | | Galbanum | 77 |
| dium | 41 | Galenus simplicia quomodo explo- | |
| Febriles astus cohibentia | 37 | rabat | 276 |
| Fella animalium | 105 | Galeopsis | 33 |
| Ficus | 58 | Galla | 58 |
| Ficum succus | 72 | Gallitrichum | 34 |
| Filici radix | 20 | Gastrica | 152 |
| Fistulis axi quæ remedio sunt | 100 | Gentiana | 20 |
| Flatus dissipantia | 19.20.24. | Γένια | 46 |
| 28.30.38.47.48.49. | | Gingivis mollitie fluidis quæ ter- | |
| Flos aris | 91 | gent | 103 |
| Flores quando legendi | 40 | Glaucium | 74 |
| Fluxiones capitis siccantia | 22 | Glycyrrhiza | 20.74 |
| Fluxiones biliosas cohibentia | 37. | Gramen | 20 |
| 61.101 | | Γράμμα | 322 |
| Fluxiones thoracis siccantia | 22. | Grana paradisi | 49 |
| 58.100 | | Gulielmus Pelisserius Episcopus | |
| Fluxiones intestinorū siccantia | 22 | Monpeffulanus de simplicibus | |
| | | incog | |

I N D E X.

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| incognitis scripsit | 61 | Hepati indurato que illinuntur | |
| Gummi | 81 | 53 | |
| Gypsum | 96 | Hepatica | 85.104. |
| H | | 152.163 | |
| H Acmatites | 98 | Hepaticis qua ratione miscentur | |
| H Hemodiani ab acerbis | 37. | valde refrigerantia | 187 |
| acidis natam sanantia | 162 | Hepaticis que prosunt | 69. |
| | | 163 | |
| Hæmorrhagiam sistentia | 36. | Hepatorium, Hepatitis | 33 |
| 40 | | Hermodaetylus | 20 |
| Hæmorrhagiam à naribus que si- | 74 | Hermodaetyli dosis | 236 |
| stunt | 54. | Hermodaetylus naotericorū est ve- | |
| Hæmorrhoides curantia | 97 | teribus indictus | 21 |
| | | Hernias sanantia | 85 |
| Hæmorrhoides que aperiunt | 105 | Hippolapathum | 35 |
| | | Humiditas quas actiones edat | 140 |
| Herbæ | 28 | Humores omnes ducentia | 57 |
| Herbæ quomodo siccande | 28 | Humores crudos coquentia | 31. |
| Herbæ quadam siccate calidiores | 28 | 62 | |
| | | Hydragoga | 159 |
| Herbarum que partes ad medica- | 175 | Hydromelitos facultas | 237 |
| menta accipiende | 77 | Hydropicos iuvantia | 15.24. |
| Hammoniacum | 38 | 42.54.104.163.165 | |
| Harmola | 16 | Hypercathartica que | 147 |
| Hastula regia | 83 | Hyper sarcosin que tollunt | 90.92. |
| Hedere lacryma | | 96.97 | |
| Hedychroi magmatis confectio | | Hypocisthis | 74 |
| 356 | | Hyoscyamus | 34 |
| Hemicrania frigida quibus cura- | 267 | Hyssopum | 34 |
| tur | 191 | Hysterica | 155 |
| Hemicranica remedia qualia esse | | I | |
| debent | 331.332 | I Asspis | 98. |
| Hemina | 26.31. | 163 | |
| Hepar expurgantia | 40.51.52.53.80 | Ichoras pruritum excitantes que | |
| | | digerunt | 95 |
| Hepatis intemperiem calidam iu- | 32 | Ictericis que prosunt | 18.33 |
| uantia | 32 | 38.163 | |
| Hepati que tollunt intemperiem à | 32 | Iecur roborantia | 22.33.34. |
| corruptis humoribus | 253 | 62.64.79.80.85.264.368 | |
| Hepati que foris imponantur | | Iecur lupi | 104 |
| | | Impe | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| Impetigines quæ tollunt | 82 | Lassitudo internæ tunicæ asperæ | |
| Incantationibus non est habenda | | arteriæ ex vociferatione quomo- | |
| fides | 168 | do curanda | 191 |
| Infusione quomodo & quæ præpa- | | Laterum dolores tollentia | 31 |
| rantur | 293 | Lavatione quomodo medicamenta | |
| Instrumenta præcipua pharmaco- | | preparantur | 303 |
| polarum | 318 | Laurifolia & fructus | 35 |
| Intemperiem frigidam coquentia | | Lenientia asperatas cavitates quæ | |
| 22.24.63.70 | | | 147 |
| Intemperies calidas sanantia | 76 | Lens | 51 |
| Intemperies frigidas humiditas sa- | | Lentes expurgantia | 53 |
| nantia | 71 | Lepram sanantia | 16.19. |
| Intertriginem curantia | 90 | 22.31.51.53.94 | |
| Intestina roborantia | 79 | Λεῖτονάγουρ | 59 |
| Intestina puerorum purgantia | | Λεπῆρ | 322 |
| 98 | | Lepus marinus | 161 |
| Intybum olus | 32 | Λευνοῖον | 43 |
| Ἰόν | 43 | Libræ partes | 324 |
| Iridis radix | 21 | Lichenis sanantia | 19.83.94 |
| Iris Illyrica est optima | 21 | Lienem absumentia | 27.39. |
| Isatidis radix | 22 | 164 | |
| Ischiadicis quæ prosunt | 14.19. | Lienem expurgantia | 26.51.53.80 |
| 31.33.42.267 | | Lienes induratos liquantia | 16. |
| Iua | 33 | 27.53.78.267 | |
| Iuniperifructus | 58 | Ligna | 63 |
| Iuniperi gummi | 83 | Ligula | 333 |
| Juglans | 59 | Lugusticum | 50 |
| Juibæ | 58 | Lily radix | 22 |
| Juris galli ueteris facultas | 237 | Limitatio unica sæpe sufficit ad or- | |
| K | | dinationem medicamenti | 267 |
| Keiri | 43 | Limitationes generales & particu- | |
| L | | lares non integræ non sufficient | |
| Acgignentia | 19.146 | 270 | |
| Lacrymæ | 79 | Limitationes etiam necessarie ad | |
| Lapathum | 35 | rectam remediorum compositio- | |
| Lapis calaminaris | 93 | nem | 272 |
| Lapis Iudaicus | 98 | Limitationes necessarie ad rectum | |
| Lapides | 98 | medicamentorum usum | 168 |
| Lassitudo motoria & phlegmonu- | | Limones | 56 |
| de quomodo curatur | 190 | Linauche | 42 |
| | | Λινούριον | |

I N D E X.

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Λιποσπερμον | 50 | Μανδύον | 76 |
| Liquando fit preparatio | 292 | Medicamentum quid | 112 |
| Liquores | 75 | Medicamenti significatio | 112 |
| Lithargyros | 89 | Medicamentum simplex | Ibidem |
| Lithargyros vt materia miscetur | | Medicamentorum compositio | |
| valentioribus | 210 | | 113 |
| Lithospermon | 50 | Medicamentum vnum simplex in- | |
| Λίτγα | 323 | terdum quatuor habet scopos | |
| Λωτορίνμα | 64 | | 170 |
| Lumbricos latos necantia | 20 | Medicamentorum vtendi modus | |
| Lumbricos que necant | 29-48. | | 252 |
| 51.103 | | Medicamentorum vsus finis | |
| Lumbricos rotundos que educunt | | | 238 |
| 163 | | Medicamenta vsum expectatum | |
| Lupinus | 50 | non præstant, nisi sint actu quod | |
| Lutra | 105 | dicuntur | 197 |
| Lycium | 74 | Medicamenta à quibus sumantur | |
| | | | 9.10 |
| | | Medicamentis quibus & quando | |
| | 67 | vtendum | 230 |
| | 67 | | |
| | 98 | Medicamentum vsum expecta- | |
| | 36 | tum non præstans quomodo cor- | |
| | 35 | rigitur | 198 |
| | 58 | Medicamenti sumendi vel admo- | |
| | | uendi tempus & occasio | 238 |
| | | Medicamenti exhibendi quanti- | |
| | 72 | tas & qualitas ex vñsem sumun- | |
| | 22 | tur scopi | 233 |
| | 87 | Medicamentum eius saporis pro- | |
| | 236 | pinandum, quo delectetur ager | |
| | 35 | | 191 |
| | | Medicamenta clementiora initio | |
| | | offerenda | 257 |
| | | Medicamenta valentiora que in- | |
| | | dicant sumenda | 192 |
| | 35 | Medicamenti consuetam nobis for- | |
| | 79 | mam facilius toleramus, quam | |
| | | non consuetam | 255 |
| | 36 | Medicamenti præbendi tempus | |
| | 107 | quando Galen. negligit | 232 |
| | | Medica | |

M Acer
Malacis

Magnes

Maiana

Malabathrum

Malum granatum

Mammæarum durities discutientia

33

Mandragoræ radicis succus

Mandragoræ maris radicis cor-

tex

Mammæathuris

Mammææ dosis

Maron

Maron esse herbam mastice vul-

gò dictam suspicio est

35

Marrubium

Mastice

Matricariam esse maioranæ su-

spicatur Hermolaus

Μίαφα ὀπω

I N D E X.

| | | | |
|--|---------|--|-----------------------------------|
| <i>Medicamenta facultate quadā natura convenientem sibi succum trahunt</i> | 160 | <i>scenda</i> | 120.122 |
| <i>Medicamenta sumpta & admota non habent vires easdem</i> | 167 | <i>Medicamenta composita quomodo fiant prestantissima</i> | 170 |
| <i>Medicamenta quando Deorū manūs</i> | 228 | <i>Medicamenta optima ex contrarijs maiores miscuerunt</i> | 116. |
| <i>Medicamenta que curiosè terenda</i> | 211 | | 178 |
| <i>Medicamenta ad temperaturā mediam aptanda</i> | 116 | <i>Medicamentorum componendorum necessitas</i> | 114. |
| <i>Medicamenta polychresta neque multum obsunt, neque prosunt, si perpetuo us vtamur</i> | 257 | <i>Medicamenta quedam componuntur, vt quod secundum naturam est seruemus</i> | 188 |
| <i>Medicamentis valentibus cum magna prameditatione vtendum</i> | 233 | <i>Medicamenta que gratius faciunt, quomodo augenda vel minuenda</i> | 221 |
| <i>Medicamen purgans vnum non perpetuò vsurpandum</i> | 234 | <i>Medicamenti vehementiam que remittit, eius actionem non aboleant</i> | 200 |
| <i>Medicamentorum purgantium delectus secundum Mesuem</i> | 171 | <i>Medicamenti virtutem imbecillam que augent aut excitant</i> | 201 |
| <i>Medicamenta purgantia quomodo reponenda</i> | 173 | <i>Medicamenta non coaugmentanda, cum paucioribus fieri potest</i> | 112.214 |
| <i>Medicamenta per que melius fiunt</i> | 199 | <i>Medicatio in quibus consistit</i> | 229 |
| <i>Medicamenta probata ad compositionem à quibus deliguntur</i> | 176 | <i>Medicus prudens & peritus que nouisse debeat</i> | 124 |
| <i>Medicamenta deligenda in suo vigore & bene habita</i> | 173 | <i>Mēdium</i> | 335 |
| <i>Medicamenti deligendi indicatio sumitur à partis natura & vsu</i> | 188.191 | <i>Medulla</i> | 102 |
| <i>Medicamenta que gratiora reddunt</i> | 202 | <i>Mel</i> | 70 |
| <i>Medicamenti componendi indicatio à quibus sumatur, & quorum respectu varietur</i> | 181. | <i>Mel quod valentissimum</i> | 173 |
| <i>& deinde.</i> | | <i>Melancholicum succum purgantia</i> | 97 |
| <i>Medicamenta composituro que no-</i> | | <i>Melanthium</i> | 51 |
| | | <i>Melilotum</i> | 43 |
| | | <i>Melissophyllon</i> | 36 |
| | | <i>Menses mouentia</i> | 17.18.19.20. |
| | | | 22.24. 26. 31.33.35. 38.40.45.51. |
| | | | 56.82.85.146 |
| | | <i>Mensura Romanorum & Græcorum</i> | B |

I N D E X.

| | | | |
|---|-----|--|---------|
| <i>rum</i> | 330 | <i>tur</i> | 166 |
| <i>Mensurae Romanae aridorum</i> | 332 | <i>Morus</i> | 59 |
| <i>Mensura liquidorum Graeca</i> | 333 | <i>Moschus</i> | 105 |
| <i>Mensurarum Romanarum nota</i> | | <i>Μοσχολιάγουρ</i> | 55 |
| 336 | | <i>Μυά</i> | 322 |
| <i>Mensurarum Graecarum nota</i> | | <i>Μυά ιατρική</i> | 323 |
| 336 | | <i>Mumia</i> | 103 |
| <i>Mentem turbantia</i> | 48 | <i>Muliebri profluio que profunt</i> | |
| <i>Metalla</i> | 87 | 44.64.74 | |
| <i>Metallorum facultates diu vi-</i> | | <i>Muccilagines quomodo extrahan-</i> | |
| <i>gent</i> | 174 | <i>tur</i> | 294 |
| <i>Methodus componendi in quatuor</i> | | <i>Myrica fructus</i> | 59 |
| <i>consistit</i> | 169 | <i>Myriophyllum</i> | 36 |
| <i>Mitgūtūs</i> | 333 | <i>Myrobalanus</i> | 53 |
| <i>Mleum</i> | 22 | <i>Myrobalanorum quinque genera</i> | |
| <i>MleZereon</i> | 27 | 53 | |
| <i>Mleconium</i> | 51 | <i>Μυροβαλάνου κρίσμα</i> | 53 |
| <i>Misy</i> | 92 | <i>Myrrha</i> | 83 |
| <i>Mistis & compositis quando uten-</i> | | <i>Myrrha stacte</i> | 84 |
| <i>dum</i> | 338 | <i>Myrti germina</i> | 59 |
| <i>Mithridatios ad quae utilis</i> | | <i>Μύρρον</i> | 332-335 |
| 346 | | <i>Nyxæ</i> | 59 |
| <i>Mithridates</i> | 344 | | |
| <i>Mithridatij descriptio ab Andro-</i> | | N | |
| <i>macho</i> | 344 | <i>Narcotica quatenus profunt</i> | |
| <i>Mithridatij descriptio à Damo-</i> | | 185 | |
| <i>crate</i> | 345 | <i>Narcoticis quando utendum ibid.</i> | |
| <i>Modius</i> | 332 | <i>Narcoticorum compositionis scopus</i> | |
| <i>Molle</i> | 142 | <i>quis est</i> | 186 |
| <i>Molybdema</i> | 94 | <i>Nardus prestantissima</i> | 22 |
| <i>Morbus quilibet qualia remedia</i> | | <i>Nardus Gallica</i> | 23 |
| <i>postulat</i> | 254 | <i>Nardus Syriaca</i> | ibidem |
| <i>in Morbi vigore à medicamentis</i> | | <i>Nardi electio</i> | ibidem |
| <i>purgantibus abstinentum</i> | | <i>Nardi spica & radix</i> | 22 |
| 242 | | <i>Natura partis comprehendit natu-</i> | |
| <i>Morbillis & variolis salubria</i> | | <i>ram totius</i> | 193 |
| 61 | | <i>Naturæ propriet. us assumptis me-</i> | |
| <i>Morsibus canum quæ medentur</i> | | <i>dicamen est inspicienda</i> | 194 |
| 165 | | <i>Nauseam arcet</i> | 86 |
| <i>Morsibus canis rabidi quæ meden-</i> | | <i>Nephritica</i> | 154-164 |
| | | <i>Nephritis</i> | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| Nephriticos curantia | 165 | Oculorum vulnera sanantia | |
| Nepitha | 32 | | 98 |
| Nervus vulneratis aqua calida ini- | | Oculorum obstructions liberan- | |
| mica | 165 | tia | 80 |
| Nervorum vulnera glutinantia | | Oculorum cicatrices purgantia | |
| 165 | | | 78 |
| Nervorum affectibus frigidis quæ | | Ocymum | 51 |
| profunt | 24.53 | Odor medicamentum gratius red- | |
| Nutriendo fit præparatio | 292 | dens | 204 |
| Nux vomica | 55 | Odora stomachicis miscenda | |
| Nymphæa | 43 | | 204 |
| O | | Odyneron quod | 145 |
| Ὠλ | 322 | Oenanthes radix | 23 |
| Obstructiones lienum soluen- | | Oesypus | 105 |
| tia | 35.39.52 | Clea factitia | 69 |
| Obstructionibus hepatis quæ sub- | | Cleum | 69 |
| veniant | 16.20.24.32.33. | Cleum succini vim hebetat | 161 |
| 35.37.52.60.163 | | Oleosus sapor | 149 |
| Obstructiones thoracis & pulmo- | | Cline | 59 |
| nis liberantia | 69 | Ὠλ | 318 |
| Obstructiones liberantia | 38. | Empnaciun | 70 |
| 49.58. | | Opium | 51.76 |
| Obstructionibus renium quæ subue- | | Opio quando utimur | 186 |
| niant | 16.24.37.52 | Opobalsanum | 57 |
| Ὠλ | 318 | Opocarpus | 84 |
| Oculi dolentis affectus signa unde | | Opopanax | 76 |
| sumantur | 268 | Ὠλς Cyrenicus, Medicus, & | |
| Oculi pallor ex ictero quomodo | | Syriacus | 75 |
| amouetur | 267 | Ophthalmie quomodo paranda me- | |
| Oculis gratiam addunt | 96 | dicamenta | 188 |
| Oculis cruentatis conuenientia | | Crao huius libri | 7 |
| 40 | | Origanum | 36 |
| Oculorum claritati conferentia | 34. | Cris halitum commendantia | 17 |
| 35.38.78.82.162 | | | 20.63 |
| Oculorum remedia quomodo appli- | | Cris affectus quibus curandi | |
| cantur | 260 | | 189 |
| Oculorum ulcera quibus curan- | | Orobanche | 42 |
| da | 189 | Orthopnceæ quæ profunt | 44 |
| Oculorum fluxiones inhibentia | | | 51.52 |
| 85.103 | | Orthopnceæ & asthma à crasso | |

I N D E X.

| | | |
|---|---|--|
| <p> <i>Et lento humore quali consistentia medicamentum requirunt</i> 208 <i>Os à corde cerui</i> <i>Os sepie</i> <i>Ossa</i> <i>Oxyacanthæ succus</i> <i>Oxyacanthæ bacculæ</i> <i>Οξύβαφ</i> <i>Οξύφοινίξ</i> <i>Ούγγυα</i> <p style="text-align: center;">P</p> <i>Paeonia radix</i> <i>Papaveris genera</i> <i>Parotidis curantia</i> <i>Pars una organi interdum subit</i> <i>usum duorum, trium, vel quatuor rationem.</i> <i>Partem roborantia medicamentis miscentur</i> <i>Partibus natura frigidis qualia admo- nuemus</i> <i>Partibus canis quomodo medicamur</i> <i>Partibus non adhibenda topica, nisi corpore prius toto vacuato</i> <i>Partum mortuum eijcientia</i> 20 <i>Partum gravidis continentia</i> 99 <i>Parturientibus convenientia</i> 15. 18.98.99.103 <i>Pauperibus remedia ex viliori materia danda</i> <i>Pediculos occidunt</i> <i>Pentaphylli radix</i> <i>Percolatio medicamentorum</i> 313 <i>Pemelymetum</i> </p> | <p> 208 103 103 102 72 59 331.334.336 55 324 24 51 52.101 170 201 252 253 258 20 99 15. 153 52.83 24 44 </p> | <p> <i>Pesti resistentia</i> 107 <i>Pestilentibus putribusq; affectibus resistentia</i> 32.56.65 <i>Petroselinum verum unde petatur</i> 15 <i>Petroselinum Macedonicum est Hipposelinon</i> 15 <i>Petroselinon Macedonicum Etreaticum</i> 23 <i>Peucedani radix</i> 24 <i>Pharmacis lethalibus resistentia</i> 65 <i>Phlegmone quæ remedia iuxta morbi tempora postulat</i> 191 <i>Phlegmones curatio</i> 247 <i>Phlegmonis oris, sedis, pudendi, et aliarum humidarum partium sanantia</i> 73.74.101 <i>Phlegmonis digerentia</i> 31.50 <i>Phlegmone convenientia</i> 14.56. 70.86.94.166 <i>Phlegmonis gutturis sine venæ sectione quæ sanant</i> 162 <i>Phlegmonis gargareonis curantia</i> 75.93.96.162 <i>Phlegmonarum oris remedia, et quomodo applicanda</i> 369.371 <i>Phlegmonis oculorum et oris oleum non infunditur</i> 265 <i>Phlegmonis hepatis curantia</i> 82. 189 <i>Phlegmone stomachi et ventriculi quomodo curatur</i> 189 <i>Phlegmonis artuum quæ imponuntur initio</i> 264 <i>Phlegmagoga</i> 14.19.27.49.54. 56.74.78.158 <i>Φοινίξ</i> 54 <i>Φοινίξ palma fructus</i> 54 <i>Φεινίλι</i> </p> |
|---|---|--|

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|--------|
| Φόινις Ἰνδὸς | 54 | Πόμμε | 54 |
| Φοινύς βαλάνος | 54 | Pompholyx | 93 |
| Phthificis quæ profunt | 42. | Pondo | 323 |
| 104 | | Ponderum notis vulgus medicorum | |
| Phu | 24 | iniquius vititur | 329 |
| Φυλλίτις | 39 | Pondera & mensura medicamen- | |
| Phymata curantia | 51.52 | torum & sitatiores Galeno, & no- | |
| Pilos quomodo auferimus | 256 | stra atatis medicis | 321 |
| Piper | 60 | Ponderum Romanorum nota ex | |
| Piperitis | 18 | diuersis autoribus | 329 |
| Pisces quomodo manu capiantur | | Ponderum Græcorum nota & At- | |
| 55 | | ticorum | 329 |
| Pistacium | 60 | Populus duplex | 37 |
| Pituitam & aquas ducentia | 159 | Populeum vnguentum | 38 |
| Pituitam crassam ducentia | 21. | Portulaca | 37 |
| 27.56 | | Poterium rubrum | 61 |
| Pituitam crassam à iuncturis du- | | Præparatio quorundam medicamen- | |
| centia | 21 | torum quomodo fiat | 298 |
| Pitymon | 81 | Pruna | 60 |
| Pyxides medicamentorum sicco- | | Pruni gummi | 83 |
| rum | 320 | Pseudocasia | 66 |
| Plantago | 36 | Pseudomelanthium | 51 |
| Plantaginis succus | 72 | Pseudocinnamomum | 66 |
| Plantæ quid cum animalibus ha- | | Psora | 40 |
| beant commune | 11 | Psoras detergentia | 19.22. |
| Plantæ omnes legendæ, quædo sum- | | 50.53.94 | |
| marum sunt virium | 12 | Psyllium | 51 |
| Plantæ singulæ ex quo loco peten- | | Pterygia oculorum leuantia | |
| dæ | 12 | 20 | |
| Plantæ diuersimodè efferruntur, mo- | | Pueri & senes medicamenta va- | |
| do in masculino, modo fæminino, | | lentia non ferunt | 191 |
| aut etiam neutro genere | 13 | Pulmo vulpis | 104 |
| Pleuretica | 150 | Pulmonum cauernulis vel arteriæ | |
| Plumbum | 93 | asphæ pus impactum, quali con- | |
| Pneumonica | 150 | sistentia medicamentum requi- | |
| Podagræ quæ profunt | 15. | rit | 108 |
| 21.60 | | Pumex | 97 |
| Polypodij radix | 24 | Purgandum quando initio, quando | |
| Polypodij dosi | 235 | sub finem morborum | 243 |
| Poznorum succus | 72 | Purgantia medicamenta qua ho- | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| ra danda | 248 | dem postulat | 218 |
| Purgantia vomitu quando danda | | Quantitas remediorum est maior, | |
| 246 | | si partis affecta temperatura & | |
| Purgatio seu mundatio medicamen- | | corporis totius est eadem | |
| torum | 316 | 219 | |
| Purgatio | 156 | Quantitas euacuationis à quibus su- | |
| Purgationes sunt interdum ad præ- | | matur | 242 |
| cautionem morborum | 247 | Quantitas curantia | 30-97 |
| Purgationis tempus | 241 | Quartarius | 331 |
| Purgationis idoneum tempus que | | Quid pro quo | 286 |
| ostendunt | 241 | | |
| Purgantia quomodo dantur | | R | |
| 262 | | Radices quando euellende | 11 |
| Purgatoriorum vis malefica quomo- | | de | |
| do mitigetur | 109 | Radices integra euellende, & qua- | 11 |
| Purgatoria medicamenta | 108 | les | |
| Purgatorio medicamento sumpto | | Radices quomodo reponende & | 11 |
| ptissane cremor sorbendus | | siccande | 11 |
| 245 | | Radices quo loco siccande | 12 |
| Pus mouentia | 86 | Radices sibi alimentum peculiare | |
| Putredinem arcentia | 45-70. | trahunt, in solo, & sub cælo con- | |
| 80 | | uenienti | 11 |
| Pyropus | 99 | Rarefaciens quod | 143 |
| Pyrethrum | 24 | Raued Seni | 26 |
| Pyrites | 98 | Remedia efficacissima que sunt | |
| | | 175 | |
| Q | | Remedia mitiora postulat sensus | |
| Quæ anni parte qui humores | | acrior, valentiora obtusior | |
| purgandi | 250 | 211 | |
| Qualitates primæ quomodo se- | | Remedia varianda pro morborum | |
| cundæ sequantur facultates | | temporibus | 258 |
| 147 | | Remediorum quantitas interdum à | |
| Quantitatum primarum facultatem | | maioribus scrupulosius ascripta | |
| quomodo deprehendimus | 141 | 223 | |
| Quantitas simplicium (dosin vocat) | | Remediorum genera ipsi affectus | |
| in composito | 217 | indicant | 219 |
| Quantitas simplicium in composit- | | Remedy mensuram, & simplicium | |
| to, à quibus indicationibus suma- | | differentiam indicantia | 219 |
| tur | 217 | Remedy paratu facilibus præsen- | |
| Quantitas remediorum maior est, | | tibus, superfluum est exotica que- | |
| quando affectus cuius causa ea- | | rere | 193 |

Remed

INDEX.

| | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------|
| Remediorum facultas in duris au- | | Sanguinem reſcientibus que pro- | |
| getur corporibus | 221 | sunt | 17. 25. 64. 74. 82. 98. |
| Renes ſcincorum | 104 | | 99. 100 |
| Renes expurgantia | 80 | Sanguinem & ſpiritum purgan- | |
| Repercutiens quod | 143 | tia | 107 |
| Reſina | 79 | Sanguinem per urinis euocant- | |
| Reſina mitiſſima | 80 | tia | 49 |
| Reſinarum humidiſſima | 81 | Sanguinis fluorem colibentia | 73 |
| Rha, Rhaon, Rheon, Rhion radix | | | 96. 99. 166 |
| 25 | | Santalum | 64 |
| Rha barbarum in hortis vulgò ſa- | | Sapor cuique iucundus quis dici- | |
| tum quid ſit | 26 | tur | 207 |
| Rha barbari doſis | 236 | Sapor cuique iucundus quoad ſic- | |
| Rheu Ponticum | 26 | ri poteſt ſeruatis medicamenti vi | |
| Rhus | 60 | ribus apparetur | 207 |
| Rhyptica que | 144 | Sapor medicamentum gratius red- | |
| Ribes | 61 | dens | 205 |
| Rofa | 44 | Sapphyrus | 98 |
| Rofmarinus | 38 | Sarcocolla | 85 |
| Rubie ſatue radix | 26 | Sarcotica que | 145 |
| Rubus | 61 | Sanguotica | 76. 86. 93. |
| Ructibus acidis que proſunt | | | 97. 115 |
| 31 | | Σαρξίφαγορ | 26 |
| Ruta | 38 | Scabiem & pruritum ſanantia | |
| | | | 34. 53 |
| S | | Scabies Hiſpana | 165 |
| Sacchar | 71 | Scammonia | 78 |
| Saccharum rubrum | 71 | Scammonij doſis | 235 |
| Sagapenum | 78 | Scariola | 32 |
| Sal | 96 | Scheda Galeni pharmacorum pu- | |
| Sal Armeniacus | 96 | re & veterum more ſcribuntur | |
| Sal Hammomiacus | 96 | | |
| Salfus ſapor | 149 | XII | |
| Salvia | 38 | Schiſtus Lapis | 98 |
| Samphyſchus | 36 | Σχοιν | 44 |
| Sandaracha | 90 | Scilla | 26 |
| Sanguis hirci | 100 | Scille ſuccus | 72 |
| Sanguis draconis | 101 | Scilliticorum paſtillorum conſectio | |
| Sanguinem purgantia | 159 | | 355 |
| Sanguinem in ventriculum coagu- | | Scirrhus hepatis que admouenda | |
| latum diſſoluentia | 101 | | 190 |

I N D E X.

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| <i>Scirrhus emendantia</i> | 18.65.76. | <i>Simplicia natura & tempore com-</i> | |
| 102.104 | | <i>positis priora</i> | 121 |
| <i>Scolopendrium</i> | 39 | <i>Simplicis vnus vitium saepe totum</i> | |
| <i>Scopus methodi componendi medi-</i> | | <i>compositum corrumpit</i> | 174 |
| <i>camenta</i> | 111 | <i>Simplicis alicuius cur maior aut mi-</i> | |
| <i>Scopus quo medicamenti tendi-</i> | | <i>nor quantitas miscetur compo-</i> | |
| <i>mus, quis sit</i> | 229 | <i>to</i> | 219 |
| <i>Scopi componendorum medicamen-</i> | | <i>Simplicis quātitas maior miscetur,</i> | |
| <i>torum quo dirigendi</i> | 169 | <i>cuius facultas magis aduersatur</i> | |
| <i>Scordium</i> | 38 | <i>morbo</i> | 220 |
| <i>Scoria</i> | 91 | <i>Simplicium omnium quodcumque</i> | |
| <i>Scorpionum ictibus que prosunt</i> | | <i>sui generis odorem habet valen-</i> | |
| 98 | | <i>tissimum, est probatissimum</i> | |
| <i>Semen quomodo à fructu differat</i> | | | 21 |
| 46 | | <i>Simplicium quorundam quantitas</i> | |
| <i>Semina quando legenda</i> | 46 | <i>variatur pro temporis ratione</i> | |
| <i>Semina quatuor frigida</i> | 48 | 222 | |
| <i>Semen extinguentia que</i> | 146 | <i>Simplicium quantitatem immutata</i> | |
| <i>Semen supprimentia que</i> | 146 | <i>rerum miscendarum natura</i> | |
| <i>Semen gignentia que</i> | 146 | 222 | |
| <i>Senna</i> | 62 | <i>Simplicium quantitas quomodo li-</i> | |
| <i>Sennæ dosis</i> | 236 | <i>mitanda</i> | 221 |
| <i>Septica que</i> | 145 | <i>Simplicium numerus ad quantita-</i> | |
| <i>Sereos species</i> | 32 | <i>tem refertur</i> | 224 |
| <i>Sericum crudum</i> | 107 | <i>Simplicium quantitas ipsis auto-</i> | |
| <i>Seseli</i> | 51 | <i>ribus interdum incerta</i> | 224 |
| <i>Sextarius</i> | 330.332 | <i>Simplicium medicamentorum adul-</i> | |
| <i>Sextula</i> | 325 | <i>teria ordine alphabeti: ubi re-</i> | |
| <i>Siccitas quas edat actiones</i> | 139 | <i>quire singula</i> | 277. & deinde. |
| <i>Sicilicus</i> | 325 | <i>Simplicium medicamentorum ele-</i> | |
| <i>Sigillum Lemnium</i> | 99 | <i>ctio ordine alphabeti, quod præ-</i> | |
| <i>Simplex in suo genere quod præ-</i> | | <i>stantius in suo genere, aut</i> | |
| <i>stantissimum</i> | 170. | <i>que eius pars valentior</i> | 282 |
| 173 | | <i>Siliquastrum</i> | 18 |
| <i>Simplicia medicamenta que</i> | 113 | <i>Simapi</i> | 52 |
| <i>Simplicia que in singulis regioni-</i> | | <i>Singultus curantia</i> | 54.55 |
| <i>bus inueniantur præstantissima</i> | | <i>Sinus glutinantia</i> | 73.266 |
| 171 | | <i>Sigrop</i> | 69 |
| <i>Simplicia medicamenta noscenda</i> | | <i>Sitim sedantia</i> | 20.56.61 |
| 121 | | <i>Smiris</i> | 98 |
| | | <i>Smyr</i> | |

INDEX.

| | |
|--|--|
| <i>Smyrniun</i> (id est vulgare <i>Leu-</i> <i>sticum</i>) ὀλίσσατον <i>Romæ</i> vo- cari Gal. scribit 15 | <i>Stomachicis</i> quæ miscentur 76. 86 |
| <i>Somnum</i> conciliantia 31. | <i>Stomachicis</i> qua ratione miscentur valde refrigerantia 187 |
| 76 | <i>Stomatica</i> medicamenta debet esse boni saporis pro cuiusque palato |
| <i>Sonchus</i> 32 | 206 |
| <i>Soporifera</i> 22. 51. | <i>Stomaticæ</i> compositiones aliquot 371 |
| 76 | <i>Stomaticis</i> quando mel miscendum 211 |
| <i>Sordes</i> gymnasiorum 105 | <i>Stomaticis</i> quomodo vitimur 261 |
| <i>Sori</i> 92 | <i>Stomaticorum</i> consistentia 208 |
| <i>Sparagus</i> 16 | <i>Stomaticorum</i> vtendi modi 371 |
| Σπάρδα 320 | <i>Strobilina</i> resina 81 |
| <i>Spica</i> vulgaris est <i>pseudonardus</i> 23 | <i>Strumis</i> conferentia . 30. 40 |
| <i>Spicula</i> extrahentia 59. 165. 166 | <i>Stupefacientia</i> 51. 76 |
| <i>Splenicis</i> conuenientia 15. 17. | <i>Stupefacientia</i> quare remedijs ad- duntur 185 |
| 27. 39. 44. 82. 104 | <i>Styrax</i> rubra 84 |
| <i>Splenica</i> 153. 164 | <i>Styrax</i> 85 |
| <i>Spodium</i> 93 | <i>Succus</i> , lacryma, liquor saepe confun- duntur 75 |
| <i>Spuma</i> nitri 95 | <i>Succi</i> melle aut saccharo conditi 367 |
| <i>Squama</i> aris 91 | <i>Succi</i> 68 |
| <i>Staphis</i> agria 52 | <i>Succorum</i> repositio 68 |
| <i>Stellio</i> 161 | <i>Succinum</i> 86 |
| <i>Stenoticum</i> quod 143 | <i>Sudores</i> mouentia 18 |
| <i>Sternutamenta</i> prouocantia 21 | <i>Suffusis</i> quæ prosunt 18. 78. |
| <i>Stercus</i> canis osibus nutriti 162 | 84. 162 |
| <i>Stercus</i> pueri lupinis dulcibus nu- triti 162 | <i>Suggillata</i> curantia 74 |
| <i>Stercus</i> lupi osibus nutriti 164 | <i>Sulfur</i> 94 |
| <i>Stercus</i> canum et luporum 105 | <i>Sumenda</i> manè quæ faciunt ad dis- tributionem alimenti in corpus 252 |
| <i>Stimmi</i> 96 | <i>Sumendorum</i> varius sumendi mo- dus 341 |
| <i>Stæbe</i> herba 39 | |
| Στοιχὰς 45 | |
| <i>Stomachum</i> roborantia 22. 56. 60. 61. 63. 70. 71. 73. 79. 86. 98. 152 | |
| <i>Stomacho</i> aduersa 21. 27. 56. 70. 95 | |
| <i>Stomachi</i> ardores curantia 54 | |

INDEX.

| | | | |
|---|---------|--|----------------|
| <i>Summa dicendorum in his libris</i> | | <i>Theriace vsus</i> | 362 |
| 114 | | <i>Theriace probatio</i> | 362 |
| <i>Suppurantia que</i> | 145 | <i>Theriaci pastilli quomodo & in</i> | |
| <i>Sycomorius</i> | 59 | <i>quo loco siccandi</i> | 355 |
| <i>Σύγγρηγς τῆς κασίτης</i> | 67 | <i>Thoracem & pulmonem purgantia</i> | 31.35.40.54.80 |
| T | | | |
| T <i>Ἀλαντορ</i> | 312 | <i>Thoracica</i> | 150 |
| <i>Tamar Indus</i> | 55 | <i>Thus</i> | 86 |
| <i>Tamar Indorum dosis</i> | 136 | <i>Thuris cortex</i> | 87 |
| <i>Tamarix</i> | 27 | <i>Θύεα</i> | 318 |
| <i>Tapsus barbatus</i> | 40 | <i>Thymum</i> | 40 |
| <i>Tele flammis iniecia ardentes non</i> | | <i>Thymelea</i> | 27 |
| <i>consumuntur</i> | 99 | <i>Tlaspī</i> | 52 |
| <i>Temperamenti proprietates obseruanda in medicamentis vt in alimentis, & expendendum quomodo se habeant ad hæc aut illa</i> | 102 | <i>Tophos articulorum dissoluentia</i> | 78.101 |
| <i>Tensio articulorum quot modis fiat, & quomodo laxetur</i> | 143 | <i>Tota per tota miscere solius Dei minus est</i> | 113 |
| <i>Tenuantia</i> | 142 | <i>Tragacanthos</i> | 87 |
| <i>Tenuitas & crassities essentia actionem suam & aliorum interdum inuicant</i> | 210 | <i>Tragorigarum</i> | 36 |
| <i>Terebinthina</i> | 80 | <i>Tria in simplicibus obseruanda</i> | 12 |
| <i>Terebinthine resine dosis</i> | 237 | <i>Tripolium</i> | 27 |
| <i>Tergentia</i> | 33 | <i>Τετραλαντορ</i> | 322 |
| 34.93.144 | | <i>Turbith</i> | 27 |
| <i>Terminus pugnantis generose contra morbum quis fit</i> | 265 | <i>Turbith dosis</i> | 236 |
| <i>Teruntur & tunduntur medicamenta quibus modis</i> | 312.313 | <i>Tunica interior ventriculi gallinarum</i> | 103.163 |
| <i>Teruntur medicamenta propter quas causas</i> | 313 | <i>Tussim antiquam tollentia</i> | 82 |
| <i>Τετραστορ</i> | 334 | <i>Tussim ex faucium asperitate coquentia</i> | 31 |
| <i>Thapsia</i> | 79 | <i>Tusses coquentia</i> | 85 |
| <i>Theriaca</i> | 347 | F | |
| <i>Theriace compositio</i> | 357 | V <i>Aleriana</i> | 24 |
| <i>Theriace decerpta ex Mithridatiao</i> | 348 | <i>Vasa latioris oris in genere pharmacopolarum</i> | 320 |
| <i>Theriace vires</i> | 361 | <i>Vena & arteria quomodo dicantur simplicia</i> | 113 |
| | | <i>Venarum angustos meatus tergentia</i> | 80 |
| | | <i>Venenis resistentia</i> | 47.56. |
| | | 67.84.103 | |

Veneno

I N D E X.

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| <i>Venenosæ feræ moribus à se factis suis corporibus subueniunt</i> | 160 | <i>Vitalem virtutem roborantia</i> | 107 |
| <i>Venenatis moribus conuenientia</i> | 18. 19. 15. 28. 31. 38. 65. 94. 167. 363 | <i>Vitiliginis tergentia</i> | 19. |
| <i>Venerem excitantia</i> | 20. 49. | | 22 50. 53 |
| 104. 106. 165 | | <i>Vlcerantia</i> | 33. |
| <i>Venerem cohibentia</i> | 30. | | 53 |
| 38. 94 | | <i>Vlcera purgantia</i> | 91 |
| <i>Ventrem purgantia illitu</i> | 18 | <i>Vlcera siccantia</i> | 20. |
| <i>Ventrem subducentia</i> | 34. | | 31. 74 |
| 54 | | <i>Vlcera glutinantia</i> | 17. 19. |
| <i>Ventriculo vacuato quæ extrinsecus admouenda</i> | 246 | | 24. 31. 33. 36. 55. 73. 76. 85 |
| <i>Ventriculi meatus aperientia</i> | 65 | <i>Vlcerationes intestinis emendantia</i> | 98 |
| <i>Ventriculi os confortantia</i> | 163 | | |
| <i>Ventriculo calidiore qui sunt à quibus læduntur</i> | 230 | <i>Vlcera sedis & vuluæ curantia</i> | 105. 265 |
| <i>Ventriculum roborantia</i> | 34. 54. | | |
| 67. 79. 98 264. 368 372 | | <i>Vlcera præhumida pudendorum curantia</i> | 31. 56 |
| <i>Ventriculus mergi</i> | 163 | <i>Vlceribus putridis congruentia</i> | 92. 96 |
| <i>Veratrum</i> | 161 | <i>Vlceribus putribus oris quæ remedio sunt</i> | 100. 262 |
| <i>Veratri dosis</i> | 235 | | |
| <i>Verbascum</i> | 40 | <i>Vlceribus gule quæ adhibentur</i> | 262 |
| <i>Verbenaca recta</i> | ibidem | | |
| <i>Vernix</i> | 83 | <i>Vlceribus summè inueteratis quæ prosunt</i> | 162 |
| <i>Verrucas tollentia</i> | 53 | <i>Vlcera cacoëthesantia</i> | 51. 80. |
| <i>Vigilias quomodo per refrigerantia & humectantia expugnamus</i> | 188 | | 91. 93 |
| <i>Vim medicamenti corpori noxiam emendamus quomodo</i> | 201 | <i>Vlcus cauum quomodo curamus</i> | 115 |
| <i>Vinum</i> | 69 | | |
| <i>Vinum ne acefcat, conseruantia</i> | 39 | <i>Viciæ partes</i> | 324 |
| <i>Viperarium caro</i> | 108 | <i>Visiones</i> | 107 |
| <i>Viperarium præparatio ad pastillos theriacos parandos</i> | 353 | <i>Vnguentorum, linimentorum, ceratorum consistentia</i> | 209 |
| <i>Vires easdem non habent sumpta & admota</i> | 73 | <i>Vomitum cohibentia</i> | 28. 54 |
| <i>Viscera refrigerantia</i> | 54 | | 61. 86 |
| | | <i>Vomitum prouocantia</i> | 53. 55 |
| | | <i>Vomitiorum consistentia</i> | 209 |
| | | <i>Vretica quæ</i> | 146 |
| | | <i>Vrinæ ducentia</i> | 16. 17. |
| | | | 19. 20. 22. 24. 33. 38. 40. 45. 47. |
| | | | 48. 49. 50. 58. 70. 107 |
| | | <i>Vrinæ</i> | |

E & P

INDEX.

| | | | |
|---|--------|-------------------------|-------|
| <i>Urinis bilioſis ducentia</i> | 34 | <i>Xylobalsamum</i> | 57.64 |
| <i>Urinis craſſas & cruentas ducen-</i> | | <i>Xylaloe</i> | 63 |
| <i>tia</i> | 26.44 | <i>Xylocinixamomum</i> | 66 |
| <i>Urna</i> | 330 | <i>Xylocafia</i> | 67 |
| <i>Urtica fructus</i> | 52 | | Y |
| <i>Uſione quomodo medicamenta pra-</i> | | <i>Ywigos</i> | 318 |
| <i>parantur</i> | 301 | | Z |
| <i>Uſus rectus medicamentorum vin-</i> | | | |
| <i>deſumatur</i> | 229 | | |
| <i>Vina</i> | 62 | Z <i>Edoaria</i> | 28 |
| <i>Vulnera glutinuntia</i> | 21.33. | <i>Zingiber</i> | 27 |
| 38.42.71 | | <i>Zizipha</i> | 58 |
| <i>Vulpes</i> | 106 | <i>Zuchara</i> | 71 |
| | | <i>Zurumbet</i> | 28 |
| | | | |
| X ^{Egns} | 336 | | |
| | | | |

FINIS.



CASTIGATIONES, QV ARVM

numerus prior paginam, posterior lineam denotat.

Pag. 17. lin. penul. Plinio dicitur. 22. 3. adde, vel potius spatulæ fœtide vulgò dictæ, flore & reliquo habitu iridē omnino referentis. 24. 5. inijcias. 17. æmula, adde primo, post rotundatur. 28. 2. excrementosam. 6. zurumbeth. 32. 22. bibantur. 33. 12. chamædryes. 38. 4. Populi nigræ seu non bicoloris flores. 7. pro licet, quod. 41. 17. Chamæmelum ab odore mali dictum seu anthemis, lineam incipiat. 43. 11. cæruleo. 43. 23. quasito. Si qua sunt alia leuicula, per te emendabis.

[Faint, illegible handwritten marks]

[Faint, illegible handwritten marks]

[Faint, illegible handwritten marks]

48

C

Q

